تأثیر آموزش مراقبت از خود برکیفیت زندگی و مشکلات جسمی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده

شهرام براز پردنجانی، ٔ دکتر عیسی محمدی ٔ، دکتر بهروز برومند ٔ

- 1- كارشناس ارشد پرستاري، گرايش داخلي جراحي، دانشگاه تربيت مدرس، عضو هيئت علمي دانشكده پرستاري مامايي جندي شاپور اهواز
 - ۳ استادیار گروه پرستاری، دانشگاه تربیت مدرس (مؤلف مسئول) mohamade@modares.ac.ir
 - ٣ فوق تخصص بيماريهاي كليه، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران

چکیده

زمینه و هدف: در بیمارانی که بیماری مزمن مثل نارسایی مزمن پیشرفتهٔ کلیه دارند، افرایش عملکرد و سلامتی باید هدف اصلی مراقبت و درمان باشد. با این حال وضعیتهای عملکردی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده اغلب پائین تر از حد نرمال میباشد. هدف این پژوهش تعیین میزان تأثیر آموزش مراقبت از خود در کاهش مشکلات جسمی و بهبود کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده میباشد.

روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که در یک گروه به صورت پیش آزمون - پس آزمون در بیمارستانهای آموزشی منتخب شهر تهران در سال ۸۴ – ۸۳ انجام گرفته است. بدین منظور ۳۲ بیمار تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده بصورت غیر تصادفی و مبتنی بر هدف با توجه به ویژگیهای واحدهای مورد مطالعه انتخاب گردید. پس از انتخاب نمونه، واحدهای مورد پژوهش در دو نوبت به فاصله دو هفته قبل از شروع دیالیز با استفاده از پرسشنامههای تعیین نیازهای آموزشی، پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی و چک لیست مورد بررسی قرار گرفتند. سپس یک برنامه آموزشی بر اساس مشکلات تعیین شده و ویژگیهای افراد تحت مطالعه تدوین گردید و در طی دو جلسه، آموزشهای لازم توسط پژوهشگر و اساتید راهنما و مشاور به آنها ارائه گردید. بعد از پایان آموزش شاخصهای آزمایشگاهی بصورت میانگین دو ماهه بعد از آموزش، کیفیت زندگی دو ماه بعد از آموزش و چک لیستها در دو نوبت به فاصله دو هفته (هفتههای سوم و پنجم) مورد بررسی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری Spss و آزمونهای آماری T جفت و مک نمار استفاده شد.

یافته ها نشان دهندهٔ کاهش قابل توجهی در مشکلاتی همانند: بالا بودن اوره ($p=\cdot/\cdot\cdot\cdot$)، اسید اوریک ($p=\cdot/\cdot\cdot\cdot$)، فسفر و باستول ($p=\cdot/\cdot\cdot\cdot$)، پتاسیم ($p=\cdot/\cdot\cdot\cdot$)، اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز ($p=\cdot/\cdot\cdot\cdot$)، فشار خون سیستول ($p=\cdot/\cdot\cdot\cdot$) و دیاستول ($p=\cdot/\cdot\cdot\cdot$)، ادم ($p=\cdot/\cdot\cdot\cdot$)، خارش پوست ($p=\cdot/\cdot\cdot\cdot$)، مشکلات موضعی مسیر عروقی ($p=\cdot/\cdot\cdot\cdot$) و افزایش کیفیت زندگی ($p=\cdot/\cdot\cdot\cdot$) می باشد.

نتیجه گیری: اجرای برنامه آموزشی مراقبت از خود در بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده می تواند در کاهش مشکلات و افزایش کیفیت زندگی مؤثر باشد.

کلید واژهها: آموزش، مراقبت از خود، کیفیت زندگی، همودیالیز

وصول مقاله: ۸۴/۳/۳۱ اصلاح نهایی: ۸۵/۳/۳۱ پذیرش مقاله: ۸۵/۴/۴

مقدمه

میزان شیوع نارسایی مزمن کلیه در جهان ۲۴۲ مورد در یک میلیون جمعیت است و تا سال ۱۹۹۵ حدود ۶٪ جمعیت بزرگسال ایالت متحده مبتلا به این بیماری مبتلا بودهاند (۱). به استناد آمار مرکز بیماریهای خاص ایران و انجمن حمایت از بیماران کلیوی، تعداد ۲۶۷ مرکز دیالیز در ایران (۵۲ مرکز در تهران و ۲۱۵ مرکز در شهرستانها) وجود دارد، تا پایان سال ۱۳۸۲ حدود ۲۰۱۳۴ بیمار مبتلا به نارسایی مزمن پیشرفته کلیه وجود داشته که ۱۰۲۷۶ نفر از آنها در این مراکز تحت درمان با همودیالیز بودهاند. بطور سالانه آمار بيماران تحت درمان با همودیالیز در ایران حدود ۱۵٪ افزایش می یابد (۲). نارسایی مزمن پیشرفتهٔ کلیه یک اختلال پیشرونده و غیر قابل برگشت است که در این حالت توانایی کلیه در دفع مواد زائد متابولیک و حفظ مایع و الکترولیتها از بین می رود و منجر به اورمی می گردد (۳). اورمی یک نشانگان بالینی است که پیامد آزار و آسیب بیش از ۷۵٪ نفرونهای کلیه است که در این مرحله از نارسایی کلیه نشانههای بالینی مانند بیاشتهایی، تهوع، استفراغ، خونریزی، اختلال حواس و شعور و در پایان تشنج و پریکاردیت روی داده، همزمان افزایش میزان پتاسیم خون، افزایش فشار خون، افزایش حجم مایعات، نارسایی احتقانی قلب، کم خونی، بیماریهای استخوان و كلسيفيكاسيون متاستاتيك در نتيجه احتباس فسفر، کاهش کلسیم سرم، متابولیسم غیرطبیعی ویتامین D و افزایش سطح آلومینیم نیز رخ می دهد (۱). هم اکنون میزان مرگ و میر در این بیماران در آمریکا ۱۸٪ می باشد (۱). همو دیالیز عوارض زیادی به همراه دارد: پرفشاری خون شریانی (۱) کم خونی (۴) بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، بوی نامطبوع آمونیاک، التهاب معده و

روده (۱) عدم قدرت تمركز حواس براي مدت طولاني، احساس سوزش در بدن، سندرم بیقراری پاها، افتادگی پاها و حتى فلج كامل، اختلالات استخواني ـ عضلاني (۵)، تغییر در عادت ماهانه و یا قطع آن به طور کامل در خانمها و ناتوانی جنسی و عقیم شدن در مردان (۶) ادم حاد ریه به علت افزایش حجم مایعات بدن و تجمع آب در ریه، عفونت پرده جنب و ریه، رنگ پریدگی، خراش، تغییر رنگ، کاهش قوام و شکنندگی پوست (۴) همچنین خارش پوستی و عفونت مسیر عروقی که همه این عوامل کیفیت زندگی بیمار را به هم زده و می توانند باعث افسردگی و گاهی خودکشی در بیمار گردند (۸ و۷). مطالعات نشان داده که وجود ناخوشی های زیاد، سطح همو گلوبين پائين، عملكرد پائين باقيمانده كليه، مهمترین عاملهای پائین بودن کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده میباشند (۹). مطالعات متعددی در جوامع مختلف نشان داده که بیماران تحت درمان با همودیالیز بطور چشمگیری در مقایسه با جمعیت عمومی نمرات کمتری از کیفیت زندگی برخوردارند (۱۱ و ۱۰). کنترل مشکلات و عوارض و بهبود کیفیت زندگی نیاز به مشارکت بیمار در روند درمان و مراقبت دارد و لازمه این کار نیز افزایش آگاهی افراد میباشد که در این ارتباط نقش پرستار حائز اهمیت است. بیماران مبتلا به نارسایی مزمن پیشرفته کلیه تحت درمان با همودیالیز بدلیل داشتن درمانهای داروئی متعدد برنامه غذایی خاص و کسب توانائی لازم در سازگاری با ناتوانیهای جسمی و روحی نیازمند آموزش مخصوص و مداوم هستند (۱۲). آموزش، ابزار مناسب جهت افزایش سطح آگاهی مددجویان می باشد (۱۳). مطالعات متعددی بر روی بیماران دیالیزی انجام شده است که در همه آنها برنامه

آموزشی بر کاهش مشکلات تأثیر مثبتی داشته است (۱۳ و ۱۲ و ۸). در عین حال بررسی ها نشان می دهد که کمبود آگاهی و دانش کافی درباره مراقبت از خود در زمینه های رژیم غذایی مناسب، میزان مصرف مایعات و مراقبت از مسیر عروقی در این بیماری، باعث بروز مشكلات گوناگوني شده و سرانجام منجربه مرگ و مير و عوارض مختلفی خواهد شد (۱۲). بیماران در کشور ما از دیالیز ناکافی که کمتر از ۱۲ ساعت در هفته می باشد، برخوردارند و دیالیز ناکافی باعث کاهش آمادگی آنها برای دریافت آموزش مراقبت از خود میباشد. لذا با توجه به نوع، گستردگی و کثرت مشکلات جسمانی و روانی و عدم آمادگی اولیه جسمی و روانی و از سوی دیگر لزوم آموزش که بتواند بیمار را متکی به خود نماید تا صلاحیت مراقبت مستمر از خود را بیشتر به عهده بگیرد این تحقیق در صدد این است که تعیین کند آموزش خود مراقبتی بر اساس الگوی اورم (که یکی از مدلهای مراقبتی است) در این دسته از بیماران تا چه اندازه در کاهش مشکلات جسمی و بهبود کیفیت زندگی آنها می تواند مؤثر باشد.

روش بررسی

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که در یک گروه به صورت پیش آزمون- پس آزمون در سه بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران در سال ۸۴-۸۳ انجام گرفته است. بدین منظور ۳۲ بیمار تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده بصورت غیر تصادفی و مبتنی بر هدف با توجه به ویژگیهای واحدهای مورد مطالعه انتخاب گردید. سپس واحدهای پژوهشی در دو نوبت در طی دو هفته قبل از شروع دیالیز با استفاده از پرسشنامههای تعیین نیازهای

آموزشی، کیفیت زندگی و چک لیست مورد بررسی قرار گرفتند و بعد از جمع آوری دادههای لازم و تجزیه و تحلیل آنها، نیازها و مشکلات مورد نظر مشخص شد. سپس بر ساس نیازهای مددجویان در رابطه با رژیم غذایی، مصرف مایعات، مسیر عروقی و سلامت پوست یک برنامه آموزشی خود مراقبتی بر اساس مدل خود مراقبتی اورم (۱۴) و مشاوره با متخصصین کلیه و تغذیه طراحی و پس از تدوین و تصویب، برای بیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده، توسط پژوهشگر و اساتید راهنما و مشاور با كمك وسايل كمك آموزشي مانند اورهد و پاورپوینت در دو جلسه ۴۵ دقیقهای برای مددجویان اجرا گردید. بعد از اجرای برنامه، نمونهها در طی دو هفته دو بار مانند قبل از مداخله توسط همان پرسشنامهها ارزیابی شدند. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار آماری SPSS آزمونهای آماری T جفت و مك نمار استفاده شد.

ویژگیهای واحدهای مورد مطالعه: ۱- بیماری دیگری بجز نارسایی مزمن پیشرفتهٔ کلیه نداشتند. ۲- حداقل هفتهای ۳-۲ بار، هر بار به مدت ۴ ساعت تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده قرار می گرفتند. ۳- در طول مداخله و اجرای برنامه آموزشی قصد مهاجرت یا پیوند کلیه را نداشتند. ۴- شرایط جسمانی مناسب داشته و مایل به شرکت در کلاسهای آموزشی بودند. ۵- قبلاً آموزش رسمی دربارهٔ مراقبت از خود ندیده بودند، و در طول پژوهش نیز در برنامهٔ آموزش دیگری در این زمینه شرکت نداشتند. ۶- در محدودهٔ سنی ۵۰-۱۸ سال قرار داشتند. ۷- حداقل ۶ ماه و حداکثر ۸ سال تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده بودند. ۸- حداقل سواد دوره کامل ابتدایی را داشتند. بودند. ۸- حداقل سواد دوره کامل ابتدایی را داشتند. جمع آوری دادههای مربوط از پرسشنامه و چک

لیست استفاده شده است، پرسشنامههای استفاده شده شامل: ١) پرسشنامهٔ بررسی خصوصیات فردی (اطلاعات دموگرافیک) و پرسشنامهٔ تعیین نیازهای آموزشی در زمینه عملکرد مددجویان در مورد مراقبت از خود، ۲) پرسشنامهٔ استاندارد کیفیت زندگی ۳۶ سئوالی٬، ۳) چک لیستها برای ثبت مشکلات ناشی از عدم رعایت رژیم غذایی، مایعات مصرفی، مراقبت از مسیر عروقی و پوست که ممکن است برای بیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده بوجود آید. این مشکلات بوسیله اندازه گیری اوره، کراتی نین، اسید اوریک، سديم، پتاسيم، فسفر، كلسيم، آلبومين، ميزان اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز، فشار خون سیستول و دیاستول، درجهٔ ادم، خارش پوست و علایم و نشانه های عفونت موضعی مسیر عروقی (گرمی- قرمزی) قبل از شروع دیالیز سنجیده شدند. جهت اطمینان بیشتر به دادههای حاصله، ترکیبات بیوشیمیایی خون به صورت میانگین دو ماهه قبل از آموزش و بقیه متغیرها در دو الی چهار نوبت به فاصله دو هفته در قبل از آموزش بررسی شده و میانگین آنها به عنوان دادههای قبل از آموزش در نظر گرفته شد. بعد از آموزش ترکیبات بیوشیمیایی خون به صورت میانگین دو ماهه بعد از آموزش و چک لیستها در دو الى چهار نوبت به فاصله دو هفته (در هفتههاى سوم و پنجم بعد از آموزش) و کیفیت زندگی دو بار بعد از آموزش (هفته های ششم و هشتم بعد از آموزش) اندازه گیری شدند و میانگین آنها به عنوان دادههای بعد از آموزش منظور گردید. پرسشنامه کیفیت زندگی ژنریک SF-36 یک معیار استاندارد می باشد و نیاز به تائيد اعتبار نداشت.

داوودی و دهداری مینویسند پرسشنامه کیفیت زندگی SF-36 در سال ۱۹۹۲ در بریتانیا توسط برازیر ٔ و همكاران به منظور تعيين پايائي پرسشنامه تست گرديد. نتایج نشان داد که پایائی بر اساس آزمون کرون باخ " بالای ۰/۸۵ می باشد (۱۵و۱۶). برای تعیین پایائی پرسشنامه تعیین نیاز آموزشی از روش زوج و فردی استفاده شد و برای چک لیستها از روش آزمون مجدد استفاده گردید.

نتایج نشان داد که پایائی بر اساس آزمون پیرسون بالای ۰/۸۰ می باشد.

روش تعیین درجه و امتیاز ادم واحدهای پژوهشی:

| درجه مشكل | كيفيت مشكل | نام مشكل |
|-----------|----------------------|----------|
| صفر | نداشته است. | |
| خفیف | در ناحیه مچ پا (۱+) | ادم |
| کم | تا وسط ساق پا (۲+) | |
| متوسط | تا زانو (۳+) | |
| شدید | سرتاسر بدن (۴+) | |
| | | |

ىافتەھا

تعداد افراد مورد مطالعه ٣٢ بيمار بودند كه محدودهٔ سنی آنها بین ۵۰–۱۸ سال با میانگین سنی ۳۵/۸۷±۳۸/۳ سال بود. ۵۳/۱٪ نمونهها مرد و ۴۶/۹٪ آنها زن بودند. ۵۰٪ بيماران تحصيلات ديپلم و بالاتر، ١٥/٤٢٪ سواد ابتدائي و ۳۴/۳۸٪ آنها سواد راهنمائی و متوسطه داشتند. ۶۵/۶٪ نمونهها متأهل، ۷۸/۱٪ بیکار و متوسط مدت درمان با همو دیالیز ۴/۳۲±۰/۴ سال بو د.

امتیازات در ۸ بعد کیفیت زندگی در جدول ۱ ارائه شده است.

^{2.} Brazier

^{3.} cronbach

^{4.} pierson

| یرای برنامه آموزشی | فبل و بعد از اج | با همودياليز أ | لیفیت زندگی در بیماران تحت درمان | انگین نمرات ابعاد 7 | جدول ١: ميا |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| n | df | f | ر ایک باری در این | مقار له گرمه | |

| p | df | t | میانگین نمرات | | مقايسه گروه |
|-------|----|-------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|
| | | - | بعد آموزش | قبل آموزش | ابعاد کیفیت زندگی |
| •/٨٢ | ٣١ | -•/۲۲۶ | 41/.1 | 4./67 | سلامتي عمومي |
| */*** | ٣١ | -۴/ ۵۷۷ | ٧٠/١۵ | ۶۳/۹۰ | عملكرد جسماني |
| •/••٣ | ٣١ | -4/114 | ۵۰/۵۱ | 44/11 | ایفای نقش فیزیکی |
| /4• | ٣١ | -/177 | 44/46 | 44/10 | ایفای نقش عاطفی |
| •/••٣ | ٣١ | -4/184 | 941.9 | 20/49 | عملكرد اجتماعي |
| •/٣٩٢ | ٣١ | •/٨۶٨ | ۵۵/۴۵ | ۵۷/۵۰ | درد بدنی |
| ٠/٠٠۵ | ٣١ | - ٣/•۵∧ | ۵۶/۱۰ | 45/41 | نیرو و انرژی حیاتی |
| •/•• | ٣١ | - ٣/1 % | ۵۵/۰۷ | 46/11 | درک کلی از سلامتی |
| •/••1 | ٣١ | - ٣/ ۸ ۴۶ | 54/94 | 49/89 | میانگین نمره کل کیفیت زندگی |

جدول ۱ نشان می دهد که میانگین نمرات در ابعاد عملکرد جسمانی، ایفای نقش فیزیکی، عملکرد اجتماعی، انرژی حیاتی و درک کلی از سلامتی در بعد از آموزش افزایش یافته است. در مجموع میانگین کل کیفیت زندگی قبل از مداخله ۴۹/۶۹ بوده که بعد از

آموزش به 7 رسیده است و آزمون T جفت با $(p<\cdot,\cdot)$ تفاوت معناداری را از نظر آماری در قبل و بعد از آموزش نشان می دهد. در جدول Y نیز میانگین تستهای آزمایشگاهی در قبل و بعد از آموزش مشخص شده است.

جدول ۲: میانگین تستهای آزمایشگاهی، فشارخون سیستول و دیاستول و اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز در بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده قبل و بعد از اجرای برنامه آموزشی

| | 3 " " 3 | | J . – J . – | , | |
|------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|----|--------|
| تست آزمایشگاهی | قبل از آموزش | بعد از آموزش | t | df | p |
| اوره | A6/49 | ۵۶/۳۱ | ٤/٨٥٦ | ٣١ | •/••• |
| کراتی نین | ٩/۴٨ | 9/46 | ۵/۸۵ | ٣١ | ./19 |
| سديم | 14./14 | 14./41 | ·/۵1V | ٣١ | •/9 |
| پتاسیم | ۵/۴۶ | ۵/۱ | ۲/۰۵۶ | ٣١ | •/•۴٨ |
| كلسيم | ۸/۶۳ | 9/.4 | -1/914 | ٣١ | ٠/٠۶۵ |
| فسفر | 8/18 | ۵/۰۲ | 4/4.4 | ٣١ | •/•• ٢ |
| آلبومين | 4/11 | 4/11 | -1/478 | ٣١ | •/19 |
| اسيد اوريك | 9/V | ۵/۶۱ | 4/144 | ٣١ | •/••1 |
| فشارخون سيستول | 140/10 | 144/74 | 4/619 | ٣١ | •/••1 |
| فشارخون دياستول | A&/99 | 12/48 | 4/2.1 | ٣١ | ٠/٠٠٣ |
| اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز | Y/9V | Y/•A | Y/11Y | ٣١ | •/••• |
| | | | | | |

همانطوریکه در جدول ۲ مشاهده می شود تغییرات از قبل از آموزش به بعد از آموزش در رابطه با اوره پتاسیم، فسفر، اسید اوریک، فشار خون و اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز که شاخصهای مهمی هستند و در ایجاد مشکلات و کاهش کیفیت زندگی نقش موثری دارند

کاهش معنی دار آماری نشان داده است. در بقیه موارد مثل سديم، كلسيم، آلبومين تغييرات معنى دار نبوده است.

همچنین وضعیت میزان خارش و میزان ادم به ترتیب در جداول ۳ و ۴ ارائه گردیده است.

جدول ۳: توزیع فراوانی مطلق و نسبی خارش پوستی در قبل و بعد از آموزش در بیماران تحت درمان با همودیالیز

| آموزش | بعد از آ | قبل از آموزش | | مقايسه | |
|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|--------|------------|
| فراوانی نسبی | فراواني مطلق | فراواني نسبي | فراواني مطلق | | ميزان خارش |
| / 44/10 | 14 | 7. ۳۷ /۵ | 17 | | ندارند |
| '/. ٣ ۴/ ٣V | 11 | 7. 10/88 | ۵ | | کم |
| % Y1/AA | ٧ | % 4./84 | ١٣ | | متوسط |
| • | • | 7. 9/40 | ۲ | | شدید |

دادههای جدول ۳ مشخص می کند که با (p<٠/٠٥) آموزش بر میزان خارش و کاهش آن مؤثر بوده است.

جدول ۴: توزیع فراوانی مطلق و نسبی ادم در قبل و بعد از آموزش در بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده

| آموزش | بعد از | آموزش - | قبل از آموزش | | |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|--|-----------|
| فراواني نسبي | فراوانى مطلق | فراواني نسبي | فراواني مطلق | | ميزان ادم |
| '/. Y A/1 | 70 | /. ۴ ٣/A | 14 | | ندارند |
| % Y1/ 9 | ٧ | % Y A/1 | ٩ | | خفیف |
| | • | /. YA/1 | ٩ | | کم |

همانطور که جدول ۴ نشان میدهد در قبل آموزش ۲۸/۱٪ بیماران ادم کم، ۲۸/۱٪ آنان ادم خفیف و ۴۳/۸٪ بیماران ادم نداشتهاند، و بعد از آموزش ادم کم وجود نداشت، ۲۱/۹٪ ادم خفیف و ۷۸/۱٪ ادم نداشتهاند و با (p<=-/٠٥) اختلاف معنی داری در ارتباط با اثر آموزش بر میزان ادم را نشان داده است.

و در مورد گرمی مسیر عروق در قبل و بعد از آموزش تفاوت معنی داری با (p<٠/٠١) را نشان می دهد و مشخص می گردد که آموزش مؤثر بوده و این متغیر را در بیماران کاهش داده است، در حالیکه در خصوص قرمزی مسیر عروق تفاوت معنی داری در قبل و بعد از آموزش مشاهده نگر دید (p=٠/۴۵) (جدول ۵).

جدول ۵: توزیع فراوانی مطلق و نسبی گرمی مسیر عروقی در قبل و بعد از آموزش در بیماران تحت درمان با همودیالیز

| آموزش | بعد از آموزش | | قبل از آموزش | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------------|
| فراواني نسبي | فراواني مطلق | فراواني نسبي | فراواني مطلق | | متغیر مورد بررسی |
| /۸۱/۲۵ | 75 | '/.۴۶/AV | 10 | ندارند | گرمی مسیر عروقی |
| /.۱٨/٧۵ | ۶ | 7.54/14 | 17 | دارند | عربی اسیر عروتی |
| ·/.AV/Δ | 44 | '.VA/1Y | 70 | ندارند | |
| 7.17/0 | ۴ | ·/.Υ\/AA | ٧ | دارند | قرمزی مسیر عروقی |
| ١ | ٣٢ | ١ | ٣٢ | جمع | |

ىحث

دادههای این پژوهش نشان میدهد که میانگین کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز در كشور ما حدود ۴۹/۶۹ مي باشد، اين يافته ها در مقايسه با مطالعات کشورهای دیگر مثل فوجی ساوا انشان داد که که میانگین نمرات در تمام ابعاد و میانگین کلی کیفیت زندگی بیماران در کشور ما پائین تر می باشد (۱۷). در تحقیقی که بوکسو ٔ با عنوان مقایسه کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده و دیالیز يريتونئال با جمعيت عمومي با استفاده از يرسشنامه SF-36 انجام داد نشان داد که نمرات ابعاد کیفیت زندگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده و دیالیز پریتونئال در مقایسه با جمعیت عمومی پائین تر مى باشد (١٨). مقايسه پژوهش فوق با پژوهش انجام شده نشان میدهد که بیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده در پژوهش انجام شده در ابعاد عملکرد فیزیکی، ایفای نقش فیزیکی و درک کلی از سلامتی نمرات بالاترى را داشتند و در بقیه ابعاد نمرات یائین ترى را داشتند. مطالعات فوق نشان دادند که بیماران تحت درمان با همودیالیز در کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگر نمرات یائین تری در ابعاد کیفیت زندگی دارند.

یکی از دلایل کیفیت زندگی بهتر می تواند دیالیز کافی باشد. هاریسون می نویسد با گسترش و کامل شدن همودیالیز جان هزاران بیمار مبتلا به نارسایی مزمن پیشرفته کلیه نجات یافته و میزان مرگ ومیر در بیماران به طور چشمگیری کاهش یافته است. با افزایش تعداد جلسات دیالیز و اصلاح تغذیه بیماران، کیفیت زندگی آنان به طور چشمگیری بهبود یافته است (۱). در مطالعه ما، بیماران هفتهای ۱۲ ساعت تحت دیالیز قرار می گیرند در حالی که در کشورهای دیگر بیماران هفتهای ۲۰–۲۴ ساعت تحت دیالیز قرار می گیرند باین بودن زمان دیالیز قرار می گیرند و می توان گفت که یائین بودن زمان دیالیز در مطالعه ما می تواند دلیل بر پائین بودن کیفیت زندگی بیماران باشد.

علیرغم پائین بودن سطح کیفیت زندگی بیماران در این مطالعه، پس از آموزش خود مراقبتی این میزان از ۴۹/۶۹ به ۴۹/۶۴ افزایش یافته و این افزایش که از نظر آماری معنی دار می باشد نشان اثر بخش بودن آموزش می باشد. تی سی به نقل از لو – اون گفته است که ار تباط مثبت بین مسئولیت پذیری در مراقبت از خود و کیفیت زندگی وجود دارد و ار تباط منفی بین مسئولیت پذیری در مراقبت از خود و حالات روحی – عاطفی منفی در بیمار تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده وجود دارد (۱۹).

^{1.} Fujisawa

^{2.} Diaz-Buxo

میانگین اوره سرم در این پژوهش از ۸۶/۳۹ قبل از آموزش به ۵۶/۳۱ بعد از آموزش کاهش یافت. در تحقیقی که صرافی (۱۳۷۳) و عشوندی (۱۳۷۳) و کوزلوسکا '(۲۰۰۴) انجام دادند میانگین اوره سرم بعد از آموزش کاهش چشمگیری داشت که نتایج مطالعه ما را تأیید میکنند (۲۱و۲۰و۸). اورمی خودش تحریک پذیری را باعث می شود، اشتها را کم می کند، بی خوابی، خواب آلودگی، خستگی، از دست دادن حافظه، اشتباه كردن در قضاوت و ضعف تمركز را باعث می شود و همه این وضعیتها بر کیفیت زندگی اثر دارد (19).

در مطالعه ما میانگین کراتینین سرم بعد از آموزش كاهش پيدا نكرد. نتايج تحقيق صرافي نشان می دهد که میانگین کراتی نین سرم بعد از آموزش کاهش پیدا نکرده (۲۰). در توجیه این مطلب می توان گفت که چون کراتی نین به خوبی از طریق دیالیز دفع نمی شود لذا اکثر بیماران دیالیزی کراتی نین بالایی دارند. میانگین پتاسیم سرم در این پژوهش از ۵/۴۶ قبل از

آموزش به ۵/۱۷ بعد از آموزش رسیده است که از نظر آماری معنی دار بود. نتایج تحقیق صالحی نشان داد که میانگین پتاسیم بعد از آموزش کاهش معنی دار آماری نداشته است (۲۲). نارسایی پیشرفته مزمن کلیه عامل اصلی افزایش پتاسیم خون است، چون در این حالت كليه قادر به دفع پتاسيم اضافي بدن نيست، از طرفي پتاسیم خون این بیماران با دریافت آب و مواد غذایی که حاوی پتاسیم میباشد افزایش مییابد (۳). میانگین كلسيم سرم بعد از آموزش افزايش معنى دارى نداشته است. نتایج تحقیق صالحی نیز نشان داد که میانگین سه

ماهه كلسيم بعد از آموزش افزايش معنى دارى نداشته است (۲۲).

در این پژوهش میانگین فسفر سرم بعد از آموزش کاهش چشمگیری از نظر آماری نشان داد. نتایج پژوهشی که توسط شی چیری و همکاران صورت گرفت نیز نشان داد که ۵ هفته بعد از آموزش افراد تحت مطالعه سطح فسفر سرم آنها به میزان قابل ملاحظهای كاهش يافته بود (٢٣). نتايج تحقيق صالحي نشان داد كه میانگین فسفر در مرحله بعد از آموزش کاهش معنادار آماری داشته است که بیانگر اثر بخش بودن برنامه آموزش رژیم غذایی در کاهش سطح فسفر بوده است (۲۲). یکی از مهمترین عوارض نارسائی کلیه، بیماری استخوانی استئودیستروفی کلیوی است که این حالت در نتیجه کاهش کلسیم و افزایش فسفر خون است. از آنجائی که دیالیز قادر به برداشت فسفر اضافی در بدن نمی باشد لذا انتخاب برنامه غذایی مناسب در کم کردن این نوع اختلال با اهمیت است (۲۴).

میانگین اسید اوریک سرم در این پژوهش بعد از آموزش کاهش معنی دار آماری داشته است (p<٠/٠٥). نتایج پژوهش شی چیری و همکاران حاکی از آن است که مصرف رژیم کم پروتئین باعث کاهش معنی داری از نظر آماری در میزان اسیداوریک خون می گردد (۲۳).

فشار خون سیستول و دیاستول در مطالعه ما بعد از آموزش از نظر آماری کاهش معنی داری داشته است (p<٠/٠۵). نتایج تحقیق صرافی نیز حاکی از مؤثر بودن برنامه آموزشي بر كاهش فشارخون بيماران همودياليزي بوده است (۲۰). کنترل نکردن هیپرتانسیون علت اصلی هیپرتروفی بطن چپ و عامل اصلی مرگ ومیر قلبی - عروقی در این بیماران است (۲۵).

^{1.} Kozlowska

میانگین اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز در این پژوهش بعد آموزش کاهش چشمگیری پیدا کرد. نتایج صالحی نشان دادکه میانگین اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز بعد از آموزش اختلاف معنی دار آماری داشته است (۲۲). اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز باعث افزایش فشارخون بیماران به میزان ۳ میلیمتر جیوه به ازای هر کیلوگرم اضافه وزن بین دو جلسه می گردد (۲۵). مطالعه میشی اوکا نشان داد که بین کنترل رفتار تغذیهای و نیتروژن اوره خون، پتاسیم، فسفر و اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز ارتباط منفی چشمگیری وجود دارد (۲۶). مطالعه دوروس در سال ۲۰۰۴ نشان داد که آموزش بیماران همودیالیزی در ارتباط با رژیم غذایی و نحوه مصرف مایعات می تواند باعث محدودیت در دریافت مایع و بدنبال آن کاهش وزن گردد (۲۷). نتایج تحقیق یونانوف در ایران نشان داد که تنها ۲۰٪ از واحدهای مورد پژوهش افزایش وزنی در حد طبیعی داشتهاند و در حدود ۸۰٪ آنها افزایش وزن بین دو جلسه دیالیز بیشتر از حد طبیعی بوده است (۲۸). مصرف مایعات روزانه در بیماران تحت درمان با همودیالیز از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا آنها در صورت عدم توجه به مایعات دریافتی روزانه، با تجمع مایع در بدن روبرو شده و مشكلاتي از قبيل: تورم عمومي بدن، تنگي نفس، اختلالات قلبي و ريوي، اضافه وزن و بوجود آمده و سلامت آنها را به مخاطره خواهد انداخت (۳). خارش، احساس آزاردهندهای در پوست بوده که مشکل مهمی می باشد و می تواند کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگهدارنده را به هم زده، باعث افسردگی و گاهی خودکشی شود. مهمترین علت شناخته شده آن

اختلال متابولیسم کلسیم و فسفر در نارسایی مزمن کلیه است و اکثر مطالعات اخیر، شیوع ۶۰ تا ۹۰ درصد را در بین بیماران مبتلا به مرحله انتهایی بیماری کلیه در زمان دیالیز یا قبل از شروع دیالیز گزارش می کنند (۷). در این پژوهش میزان خارش و ادم بیماران بعد از آموزش برنامه خود مراقبتی به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرد. نتایج تحقیق عشوندی نیز حاکی از مؤثر بودن برنامه آموزشی بر میزان خارش و ادم بیماران همودیالیزی میباشد که نتایج مطالعه ما را تأیید می کند (۸). در این پژوهش بعد از آموزش مشکلات بیماران در رابطه با مسیر عروقی تا حدودی کاهش پیدا کرد.

نتيجه گيري

یافتههای حاصله از تجزیه و تحلیل دادهها مشخص کرد که ابعاد کیفیت زندگی، عملکرد فیزیکی، ایفای نقش فیزیکی، عملکرد اجتماعی، نیرو و انرژی حیاتی و درک کلی از سلامتی در گروه مورد مطالعه افزایش یافته است. نتایج مشخص کرد که اجرای برنامه خود مراقبتی در گروه آموزشی باعث کاهش چشمگیری در مشکلات بیماران تحت درمان با همودیالیز در ارتباط با بالابودن اوره، اسیداوریک، پتاسیم، فسفر، فشارخون سیستول و دیاستول، اضافه وزن بین دو جلسه دیالیز، خیز، خارش و مشکل مسیر عروقی شده است. لذا می توان گفت، اجرای برنامه آموزشی مراقبت از خود بر کاهش مشکلات و بهبود کیفیت زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز نگه دارنده مؤثر بوده است، و اجرای درمان با همودیالیز نگه دارنده مؤثر بوده است، و اجرای

^{1.} michiyo oka

^{2.} durose

References

- 1. Skorecki K, Green J, Brenner BM. Chronic renal failure.In: Braunwald E, Fauci AS, Kasper D, Longo DL, Hauser SL, Jameson JL. Harrison principle of internal medicine. 16th ed .New York: McGrow Hill company; 2005:1653-1667
- ۲. افشاری لیلا. ترجمه نارسایی کلیه و درمان آن: کتاب راهنما برای بیماران کلیوی و خانوادههای آنان، میکی هال فریس (مؤلف) چاپ اول، تهران: انتشارات تیمورزاده (طیب)، ۱۳۸۱. صفحات: ۱۲۱–۱۱۴
- 3. Smeltezer SC, Bare BG. Brunner and Suddarth Text book of Medical-Surgical Nursing.21th ed. Philadlphia: Lippincot Company; 2004: 1326-1334
- 4. Thelan LA, Urden LD, lough ME. Text book of critical care nursing diagnosis and management. 3th ed. St. Louis: Mosby company; 1998: 535
- 5. Luckman J, Sorensen KC. Medical-Surgical Nursing. A psychophysiologic approach.9th ed. Philadelphia: Saunders company;1997: 1135-1168.
- 6. Marantides DK, Marek JF, Morgan J, Bartucci MR. Management of persons with renal failure. In: Phipps W, sands J, Marker J. Medical-surgical nursing concept & clinical practice.6th ed. St. Louis: Mosby; 2003: 1465-1477.
- 7. Lugon JR. Uremic pruritus: a review. Hemodial Int 2005; 9(2): 180-8.
- ۸ عشوندی خدایار. بررسی تأثیر آموزش مراقبت از خود بر کاهش مشکلات بیماران همودیالیزی، پایاننامه کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه تربت مدرس، دانشکده بزشکی ۱۳۷۳.
- 9. Merkus, M.P., Jager, K.J., Dekker, F.W., Boeschoten, E.W., Stevens, P., and Krediet, R.T. Quality of life in patients on chronic dialysis: self-assessment 3 months after the start of treatment. The Necosad Study Group. Am J Kidney Dis 1997; 29(4): 584-592.
- 10. Perneger, T.V., Leski, M., Chopard-Stoermann, C., and Martin, P.Y. Assessment of health status in chronic hemodialysis patients. J Nephrol 2003; 16(2): 252-9.
- 11. Iliescu, E.A., Coo, H., McMurray, M.H., Meers, C.L., Quinn, M.M., Singer, M.A., and et al. Quality of sleep and health-related quality of life in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2003; 18(1): 126-32.
- 12. Klang, B., Bjorvell, H., and Clyne, N. Predialysis education helps patients choose dialysis modality and increases disease-specific knowledge. J Adv Nurs 1999; 29(4): 869-76.
- 13. Prowant, B.F., Satalowich, R.J., Murray-Bell, A., Ryan, L.P., Schmidt, L.M., Kennedy, J.M., and et al. Effectiveness of a phosphorus education program for dialysis patients. ANNA J 1999; 16(5): 353-357.
- 14. Meleis, A. Nursing Theories. 4th ed. Philadelphia: lippincot comoany; 2005: 301-354.
- ۱۵. داوودی عارفه. بررسی تأثیر برنامه خود مراقبتی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان مری بعد از عمل جراحی ازوفاژکتومی در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم یزشکی تهران، پایاننامه کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پزشکی، ۱۳۸۱. ۱۶. دهداری طاهره. بررسی تأثیر آموزش بر کیفیت زندگی بیماران با عمل جراحی قلب باز، پایاننامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکدهٔ علوم پزشکی، ۱۳۸۱.
- 17. Fujisawa, M., Ichikawa, Y., Yoshiya, K., Isotani, S., Higuchi, A., Nagano, S., and et al. Assessment of health-related quality of life in renal transplant and hemodialysis patients using the SF-36 health survey. Urology 2000; 56(2): 201-6.
- 18. Diaz-Buxo, J.A., Lowrie, E.G., Lew, N.L., Zhang, H., and Lazarus, J.M. Quality of life evaluation using short form 36: comparison in hemodialysis and peritoneal dialysis patients. Am J Kidney Dis 2000; 35(2): 293-300.
- 19. Tsay, S.L., Healstead, M. Self care efficacy, depression and quality of life among patients hemodialysis in Taiwan. Int J Nurs Stud 2002; 39(3): 245-251.

۲۰. صرافی ملیحه. بررسی تأثیر آموزش مراقبت از خود بر دانش، نگرش و وضعیت جسمی بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پرستاری و مامایی، ۱۳۷۳.

- 21. Kozlowska, L., Rosolowska-Huszcz, D., and Rydzewski, A. Low protein diet causes a decrease in serum concentrations of leptin and tumour necrosis factor-alpha in patients with conservatively treated chronic renal failure. Nephrology 2004; 9(5): 319-324.
- ۲۲. صالحی شهریار. بررسی تأثیرآموزش رژیم غذایی برشاخصهای آزمایشگاهی و افزایش وزن بین دو جلسه دیالیز در بیمارستانهای علوم پزشکی شهرکرد. پایاننامه کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایرا ن، دانشکده پرستاری و مامایی، ۱۳۸۱.
- 23. Shichiri, M., Nishio, Y., and Ogura, M., Marumo. Effect of low protein, very low-phosphorus diet on diabetic renal insufficiency with proteinuria. Am J Kidney Dis. 1991; 18(1): 26-32.
- 24. Schlatter, S., Ferrans, C.E. Teaching program effects on high phosphorus levels in patients receiving hemodialysis. ANNA J 1998; 25(7): 31-37.
- 25. Agarwal, R., Nissenson, A.R., Batlle, D., Coyne, D.W., Trout, J.R., and Warnock, D.G. Prevalence, treatment, and control of hypertension in chronic hemodialysis patients in the United States. Am J Med 2003; 115(4): 291-297.
- 26. Oka, M., Tomura, S.H., and Takahashi, H. Treatment regimen adherence and life-satisfaction in hemodialysis patients: a covariance structure analysis .Clin Exp Nephron.1999; 3: 198-206.
- 27. Durose, C.L., Holdsworth, M., Watson, V., Przygrodzka, F. Knowledge of dietary restrictions and the medical consequences of noncompliance by patients on hemodialysis are not predictive of dietary compliance. J Am Diet Assoc 2004; 104(1): 35-42.

۲۸. یونانوف ماری. بررسی واکنش بیماران تحت درمان با همودیالیز نسبت به بیماری خود و پیگیری رژیم درمانی در مراجعه کنندگان به بخشهای همودیالیز وابسته به دانشگاه تهران، پایاننامه کارشناسی ارشدیرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگده پرستاری و مامایی. ۱۳۷۱