

## The effect of allopurinol on high glucose- induced neurotoxicity in PC12 cells

**Aminzadeh A., PhD<sup>1,2</sup>**

1. Assistant Professor, Department of Pharmacology and Toxicology, School of Pharmacy, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran (Corresponding Author), Tel: +98-34-313225242, a.aminzadeh@kmu.ac.ir

2. Pharmaceutics Research Center, Institute of Neuropharmacology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.

### ABSTRACT

**Background and Aim:** Hyperglycemia which occurs in diabetes is one of the main factors which can lead to serious complications such as diabetic neuropathy. There is evidence that allopurinol has neuroprotective effect against many types of damaging stimuli. The present study investigated the effects of allopurinol on high glucose induced neurotoxicity in PC12 cells as a suitable in-vitro model for evaluation of neuronal functions.

**Material and Methods:** Neurotoxicity was induced by high glucose concentration, and cells were exposed to allopurinol in the presence or absence of high glucose concentration. Cell viability was assessed by MTT assay. Biochemical markers of oxidative stress were investigated by measurement of lipid peroxidation (LPO), total thiol groups, and total antioxidant power (TAP).

**Results:** The present results indicated that allopurinol significantly inhibited high glucose-induced cell death in PC12 cells. Furthermore, treatment with allopurinol decreased lipid peroxidation level. It also increased the total thiol groups and TAP.

**Conclusion:** These findings showed protective effects of allopurinol on HG-induced cell death in PC12 cells, which may be related to its antioxidant effect and inhibition of oxidative stress.

**Keywords:** PC12 cells, Glucose, Neurotoxicity, Allopurinol.

**Received:** Apr 23, 2016    **Accepted:** Nov 26, 2016

## بررسی تاثیر آلوپورینول بر نوروتوکسیستی ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلول های PC12

آزاده امین زاده<sup>۱،۲</sup>

۱. استادیار، گروه فارماکولوژی و سسم شناسی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران (مؤلف مسؤول)، تلفن ثابت: ۰۳۴-۳۱۳۲۵۲۴۲،

a.aminzadeh@kmu.ac.ir

۲. مرکز تحقیقات فارماسیوتیکس، پژوهشکده نوروفارماکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

### چکیده

**زمینه و هدف:** هیپرگلیسمی که در شرایط دیابت رخ می دهد، یکی از عوامل اصلی عوارض دیابت از جمله نوروپاتی دیابتی می باشد. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد آلوپورینول اثرات نوروپرتوکتیو بر بسیاری از محرك های آسیب رسان دارد. این مطالعه به منظور بررسی اثرات آلوپورینول بر نوروتوکسیستی ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلول های PC12 که به عنوان یک مدل برونتی مناسب برای مطالعه سلول های عصبی می باشد انجام شد.

**روش بررسی:** در سلول های PC12، نوروتوکسیستی توسط غلظت بالای گلوکز ایجاد شد و سلول ها در حضور و عدم حضور غلظت بالای گلوکز، در مععرض آلوپورینول قرار گرفتند. زنده مانی سلولی با استفاده از روش MTT اندازه گیری شد. مارکرهای بیوشیمیایی استرس اکسیداتیو با اندازه گیری میزان پراکسیداسیون لیپیدی، گروه های تیول و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام بررسی شد.

**یافته ها:** نتایج نشان داد که آلوپورینول به طور معنی داری، مرگ سلولی ناشی از غلظت بالای گلوکز را در سلول های PC12 مهار می کند. به علاوه، آلوپورینول میزان پراکسیداسیون لیپیدی را کاهش داد. این دارو همچنین گروه های تیول و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام را افزایش داد.

**نتیجه گیری:** این یافته ها نشان می دهند که آلوپورینول اثرات محافظتی بر مرگ سلولی ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلول های PC12 دارد که ممکن است مربوط به عملکرد آنتی اکسیدانی این دارو و مهار استرس اکسیداتیو باشد.

**کلید واژه ها:** سلول های PC12، گلوکز، نوروتوکسیستی، آلوپورینول

وصول مقاله: ۹۵/۲/۴ اصلاحیه نهایی: ۹۵/۴/۲۷ پذیرش: ۹۵/۹/۶

## مقدمه

ملاحظه آلوپورینول، مطالعات زیادی بر قابلیت اثر آن به عنوان یک درمان جدید در بیماری های مختلف در حال انجام است. اثرات محافظتی آلوپورینول بر بسیاری های از انواع محرك های آسیب رسان مشاهده شده است. مطالعات نشان دادند که در موش سوری، آلوپورینول توانسته فیروز قلبی ناشی از آثربوتنسین II را کاهش دهد و این دارو از آسیب ایسکمی-ریپفیوژن در مثانه موش صحرابی جلوگیری می کند (۷). این دارو در شرایط ایسکمی ناشی از هیپوکسی، باعث کاهش شکل گیری رادیکال های آزاد و آسیب بافتی می شود (۹). تحقیقات نشان دادند که آلوپورینول، مغز را از آسیب های ناشی از ایسکمی و ریپفیوژن محافظت می نماید (۱۰). آلوپورینول توانسته از طریق مهار آنزیم گراناتین اکسیداز، تولید گونه های فعال اکسیژن ناشی از آسیب سلول های مغزی را کاهش دهد (۱۱و۱۲). از دیگر مسیرهای نوروپروتکتیو آلوپورینول می توان به مهار مستقیم رادیکال های هیدروکسیل در شرایط برون تنی (۱۳)، مهار تجمع نوتروفیل ها (۱۴)، شلالور یون های فلزی مانند آهن فریک (۱۵) و تسهیل انتقال الکترون از آهن فروس به آهن فریک سیتوکروم C اشاره نمود (۱۶).

**Pheochromocytoma Cell** سلول های PC12 (Line) به عنوان یک مدل مناسب برای مطالعه دیس فانکشن عصبی در سطوح گلوکز بالا شناسایی شده اند و با موفقیت برای بررسی استرس اکسیداتیو، سیگنانالیگ فاکتور رشد عصبی (NGF) و... استفاده شده اند (۱۷). با توجه به موارد ذکر شده فوق، مطالعه حاضر در نظر دارد اثرات نوروپروتکتیو آلوپورینول را بر مرگ سلولی ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلول های PC12 که به عنوان یک مدل مناسب برای مطالعه سلول های عصبی در سطوح بالای گلوکز می باشد، مورد بررسی قرار دهد.

## روش بررسی

مطالعه حاضر از نوع تجربی بوده و گروه های مورد مطالعه در این تحقیق عبارت بودند از: ۱- گروه کنترل، ۲- گروه

بسیاری از تحقیقات نشان داده است که غلظت بالای گلوکز باعث تولید رادیکال های آزاد و استرس اکسیداتیو در سلول های عصبی می شود (۱). استرس اکسیداتیو در نتیجه ای عدم تعادل بین تولید رادیکال های آزاد و گونه های فعال اکسیژن از یک سو و سیستم دفاع آنتی اکسیدانی از سوی دیگر ایجاد می شود. گونه های فعال اکسیژن شامل رادیکال های آزاد مشتق از  $O_2^-$  مانند یون های سوپراکسید ( $O_2^\bullet-$ ), هیدروکسیل ( $HO^\bullet$ ), پروکسیل ( $RO^\bullet$ ) و آلكوكسیل ( $RO_2^\bullet$ ) و همچنین گونه های غیر رادیکالی مشتق از  $O_2^-$  مانند پراکسید هیدروژن ( $H_2O_2$ ) می باشند. در شرایط نرمال؛ گونه های فعال اکسیژن از طریق زنجیره انتقال الکترون تولید می شوند و به طور طبیعی بوسیله آنتی اکسیدان های سلولی مثل سوپراکساید دیسموتاز، کاتالاز و گلوتاژون برداشته می شوند. تولید زیاد گونه های فعال اکسیژن و بیشتر از ظرفیت آنتی اکسیدانی باعث آسیب به لپیدها، پروتئین ها و DNA می شود. این آسیب ها در نهایت عملکرد سلولی را مختل می کنند. میتوکندری ها که جایگاه تولید گونه های فعال اکسیژن هستند بیشتر به آسیب ها حساس هستند و استرس اکسیداتیو موجب آسیب میتوکندریایی می شود (۲و۳). در دیابت غلظت بالای گلوکز باعث افزایش تولید گونه های فعال اکسیژن می شود و مکانیسم های آنتی اکسیدانی را کاهش می دهد (۴و۱). در حال حاضر کنترل قند خون و کاهش استرس اکسیداتیو، یک روش موثر برای پیشگیری و درمان عوارض دیابت مانند نوروپاتی می باشد (۵). بنابراین بررسی راهکارهایی که استرس اکسیداتیو اعصاب را کاهش دهند و از اختلال عملکرد عصبی ناشی از هیپرگلیسمی جلوگیری نمایند بسیار مهم است.

آلوپورینول در چندین دهه به عنوان درمان استاندارد بیماری نفرس و شرایط مرتبط با هیپراوریسمی استفاده شده است (۶). در سال های اخیر روی اثرات پروتکتیو آلوپورینول توجه زیادی شده است. به علت خواص پروتکتیو قابل

ساعت قرار داده شد. سپس محیط داخل چاهک‌ها خالی گردید و ۱۰۰ میکرو لیتر DMSO به رسوب اضافه شد و در نهایت میزان جذب نوری هر چاهک با استفاده از دستگاه ELISA Reader در طول موج ۵۷۰ نانومتر و طول موج رفرنس ۶۳۰ نانومتر اندازه گیری گردید.

اندازه گیری میزان پراکسیداسیون لیپیدی به روش MDA استرس اکسیداتیو، باعث افزایش پراکسیداسیون لیپیدی اسیدهای چرب غیر اشباع می‌گردد و بر اثر حمله رادیکالهای آزاد به لیپیدها، یکی از موادی که تولید می‌شود، مالون دی‌آلدئید (MDA) است. جهت ارزیابی میزان پراکسیداسیون لیپیدها، مولکول مالون دی‌آلدئید به عنوان ساختاری از پراکسیداسیون لیپیدها بررسی می‌شود. در این روش با ارزیابی مواد واکنشی تیوباریتوريک اسید (TBARs) می‌توان آسیب وارد شده به لیپیدها را اندازه ۲۵ cm<sup>2</sup> گیری نمود. برای این منظور سلولها در فلاسک ۲۵ cm<sup>2</sup> کشت داده می‌شوند و بعد از چسبیدن سلول‌ها به کف فلاسک و رسیدن به ۷۰٪ confluence سلول‌ها با آلوپورینول پرانکوبه شده و سپس در مععرض غلظت بالای گلوکز قرار گرفته و سپس مایع رویی یا سوپرناتانت آن‌ها جمع آوری شده و پس از سانتریفیوژ با دور ۱۲۰۰ g و به مدت ۶ دقیقه تا انجام آزمایش‌های تیول و ظرفیت آنتی پراکسیداسیون لیپیدی، گروه‌های تیول و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام در دمای ۸۰-۸۰ نگهداری شد. مالون دی‌آلدئید در شرایط اسیدی و دمای بالا با تیوباریتوريک اسید تشکیل پیوند می‌دهد. کمپلکس این دو ماده در نمونه‌ها قابل تشخیص است و به شکل (TBA-MDA-TBA) تشکیل شده در طول موج ۵۳۲ نانومتر دارای حداکثر جذب است.

اندازه گیری گروه‌های تیول:

گروه‌های تیول به عنوان ساختار دیگری از وضعیت استرس اکسیداتیو مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. گروه‌های تیول (-SH)- نسبت به صدمات اکسیداتیو حساس هستند و کاهش آنها نشانه‌ی مهمی از استرس اکسیداتیو بر روی

با گلوکز بالا، ۳- گروه با گلوکز بالا به علاوه آلوپورینول با غلظت ۴۰ μM-۴- گروه با گلوکز بالا به علاوه آلوپورینول با غلظت ۴۰ μM-۵- گروه با گلوکز بالا به علاوه آلوپورینول با غلظت ۴۰ μM-۶- گروه با گلوکز بالا به علاوه آلوپورینول با غلظت ۴۰ μM.

سلول‌های PC12 از انتیمو پاستور خریداری شدند. این سلول‌ها در محیط کشت DMEM؛ همراه با ۵٪ سرم جنین گاوی (FBS)، ۱۰٪ سرم اسبی (HS) و ۰.۱٪ آنتی بیوتیک (پنی سیلین + استرپتومایسین)، تحت شرایط کشت (دمای ۳۷ درجه سانتی گراد، ۹۵٪ O<sub>2</sub> و ۵٪ CO<sub>2</sub>) نگهداری شدند. سلول‌های مورد نظر، ۲۴ ساعت پس از انتقال به درون فلاسک حاوی محیط کشت به کف فلاسک چسبیده و به تدریج حالت رشته‌ای به خود می‌گیرند. این در حالی است که سلول‌های مرده کروی شده و در سطح محیط کشت شناور می‌گردند محیط کشت حاوی سلول‌های مرده حذف گردند و سلول‌های چسبیده به کف فلاسک با استفاده از تریپسین (TE) پاساز داده شدند و هر ۴۸ ساعت محیط کشت آن‌ها تعویض شد.

اندازه گیری میزان حیات سلولی به روش MTT: با استفاده از آزمایش MTT می‌توان پاسخ سلول‌ها به فاکتورهای خارجی مانند داروها و عوامل شیمیایی را ارزیابی نمود. مطالعات نشان دادند که در سلول‌های PC12، غلظت بالای گلوکز می‌تواند استرس اکسیداتیو ایجاد نماید و باعث مرگ سلولی و آپوپتوز شود (۲۰-۲۸٪).

در اجرای این روش، به ترتیب زیر عمل شده است: سلول‌ها پس از شمارش به تعداد ۵۰۰۰ سلول در هر چاهک به پلیت ۹۶ خانه‌ای منتقل شدند. بعد از چسبیدن سلول‌ها به کف چاهک و رسیدن به ۷۰٪ confluence سلول‌ها به مدت دو ساعت با غلظت‌های مختلف آلوپورینول پرانکوبه شده و در زمان‌های ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت، در مععرض گلوکز با غلظت ۷۵ میلی مولار قرار گرفته و ۱۰ میکرو لیتر از محلول MTT (۵ درصد) به هر چاهک اضافه گردید و پلیت در انکوباتور ۳۷°C به مدت ۲

تمامی اطلاعات بدست آمده به صورت mean $\pm$  SEM گزارش شده اند. نتایج داده ها با استفاده از برنامه SPSS و روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  $P < 0.05$  معنی دار در نظر گرفته شد.

#### یافته ها


اثر آلوپورینول بر مرگ سلولی ناشی از غلظت بالای گلوکز:

پس از اندازه گیری میزان حیات سلول ها با روش MTT مشاهده شد که گلوکز در غلظت ۷۵ میلی مولار بعد از ۷۲ ساعت مواجهه با سلول ها، به طور معنی داری باعث القای مرگ سلولی شده است. همانطور که در نمودار ۱ نشان داده شده است پرانکوباسیون با آلوپورینول توانسته از آسیب سلولی ناشی از غلظت بالای گلوکز جلوگیری نماید. غلظت های ۲۰ و ۴۰ میکرو مولار آلوپورینول برای این مطالعه انتخاب شدند.

پروتئین ها می باشد. برای ارزیابی این عوامل از روش HU و معرف ۲ و ۲ دی تیونیتروبنزوئیک اسید (DTNB) که به معرف المن معروف است استفاده می گردد. DTNB با این گروه ها کمپلکس زرد رنگ ایجاد می نماید که در طول موج ۴۱۲ نانومتر دارای حداکثر جذب است.

اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAP) برای اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدان های تام از روش (Ferric Reducing Ability of Plasma) FRAP استفاده می گردد. این روش بر اساس توانایی احیا کنندگی یون های فریک به فرو در حضور ماده ای به نام تری پیریدیل تری آزین (TPTZ) استوار است. با احیای یون های فریک و تبدیل آن به یون های فرو در PH اسیدی و با حضور معرف های اختصاصی، کمپلکس آبی رنگی ایجاد می شود که در طول موج ۵۹۳ نانومتر و بصورت اسپکترو فتو متریک قابل اندازه گیری است.


روش آماری:



نمودار ۱: اثرات نوروپروتکتیو غلظت های مختلف آلوپورینول (۵-۴۰ میکرو مولار) بر نورو توکسیتی ناشی از غلظت بالای گلوکز (۷۵ میلی مولار) در سلولهای PC12. PC12. حیات سلولی بوسیله روش MTT اندازه گیری شد. نتایج بصورت mean  $\pm$  S.E.M نشان داده شده اند. \*\*\*  $P < 0.001$  با گروه کنترل مقایسه شد. #  $P < 0.05$  ، #####  $P < 0.001$  با گروه گلوکز مقایسه شدند.

اثر آلوپورینول بر پراکسیداسیون لیپیدی:


غلظت بالای گلوکز به مدت ۷۲ ساعت در مقایسه با گروه کنترل باعث افزایش پراکسیداسیون لیپیدی در سلول های PC12 شد. پرانکوباسیون با آلوپورینول در مقایسه با گروه گلوکز توانست به میزان چشمگیری از این افزایش میزان پراکسیداسیون لیپیدی جلوگیری نماید (نمودار ۲).



نمودار ۲: اثرات آلوپورینول بر افزایش پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از غلظت بالای گلوکز. میزان پراکسیداسیون لیپیدی بوسیله روش TBARS اندازه گیری شد. نتایج بصورت mean  $\pm$  S.E.M نشان داده شده اند.  $P < 0.001$  \*\*\* با گروه کنترل مقایسه شد.  $P < 0.01$  ## با گروه گلوکز مقایسه شد.


اثر آلوپورینول بر گروه های تیول:

همانطور که در نمودار ۳ نشان داده شده است درمان با غلظت بالای گلوکز به مدت ۷۲ ساعت در مقایسه با گروه کنترل باعث کاهش میزان گروه های تیول در سلول های PC12 شد. پرانکوباسیون با آلوپورینول در مقایسه با گروه گلوکز توانست به میزان معناداری از این کاهش میزان گروه های تیول جلوگیری کند و میزان گروه های تیول را افزایش دهد.



نمودار ۳: اثرات آلوپورینول بر کاهش گروه های تیول ناشی از غلظت بالای گلوکز. میزان گروه های تیول بوسیله روش المن اندازه گیری شد. نتایج بصورت mean  $\pm$  S.E.M نشان داده شده اند.  $P < 0.001$  \*\*\* با گروه کنترل مقایسه شد.  $P < 0.01$  ## با گروه گلوکز مقایسه شد.

اثر آلوپورینول بر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام: در گروه گلوکز در مقایسه با گروه کنترل، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام به میزان معنی داری کاهش یافت. همانطور که در نمودار ۴ نشان داده شده است پرانکوباسیون با آلوپورینول در مقایسه با گروه گلوکز به میزان معنی داری باعث افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام شده است.



نمودار ۴: اثرات آلوپورینول بر کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام ناشی از غلظت بالای گلوکز. نتایج بصورت mean  $\pm$  S.E.M نشان داده شده اند.  $P < 0.01$  با گروه کنترل مقایسه شد.  $P < 0.05$  با گروه گلوکز مقایسه شد.

می باشدند. در شرایط فیزیولوژی، سوپراکساید دیسموتاز آئیون سوپراکسید ( $O_2^-$ ) را متabolیزه می کند و پراکسید هیدروژن ( $H_2O_2$ ) تولید می کند. به علاوه فعالیت کاتالاز در پاسخ به تولید پراکسید هیدروژن افزایش می یابد کاتالاز آنزیم مهی در سم زدایی پراکسید هیدروژن می باشد. گلوتاتیون ترانسفرازها گروهی از آنزیم های دتوکسیفیک کننده هستند که در متابولیسم آفت کش ها و دیگر سموم نقش دارند (۲۲ و ۳).

آلپورینول مهار کننده گرانتین اکسیداز می باشد و به عنوان درمان استاندارد بیماری نقرس و شرایط مرتبط با هیپر اوریسمی استفاده شده است. گرانتین اکسیداز یک آنزیم سیتوزولی است که سوبسترهاز زیادی از جمله بازهای پورین و پیریمیدین را اکسید می کند. در شرایط نرمال، این آنزیم در فرم دهیدروژنانز قرار دارد. در شرایط پاتولوژیک، فرم دهیدروژنانز آنزیم متحمل اکسیداسیون و پروتونلیز قرار گرفته و به فرم فعال آنزیم تبدیل می شود. آنزیم گرانتین اکسیداز بر گرانتین و هیپو گرانتین اثر کرده و

## بحث

نتایج ما نشان داد که آلوپورینول اثرات نوروپروتکتیو بر استرس اکسیداتیو و آپوپتوز ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلول های PC12 دارد. مطالعات نشان دادند که استرس اکسیداتیو ناشی از گلوکز، نقش اساسی در پاتوزن نوروپاتی دیابتی دارد. گرچه در پیشرفت نوروپاتی دیابتی فاکتورهای متعددی نقش دارند ولی تاکنون مکانیسم دقیق پاتولوژیک این بیماری شناسایی نشده است چندین تئوری در این مورد توصیف شده است؛ از جمله اینکه هیپر گلیسمی مسیرهای پلی ال، هگزوza-آمین، پروتئین کیناز C، محصولات نهایی پیشرفته گلیکوزیل اسیون (AGES)، استرس اکسیداتیو، نیتریک اکساید و التهاب را فعال می کند. نتایج تحقیقات نشان می دهد که استرس اکسیداتیو در همه این مسیرها نقش دارد (۲۱ و ۲۲).

آنژیم های آنتی اکسیدانی مهم مانند سوپراکساید دیسموتاز (SOD)، کاتالاز و GST به عنوان اولین خط دفاعی در برابر آسیب رادیکال های آزاد در شرایط استرس اکسیداتیو

قلبی ناشی از ایزوپروترنول جلوگیری نموده است (۲۶). به نظر می رسد بخشی از اثرات نوروپروتکتیو آلوپورینول ناشی از اثرات آنتی اکسیدانی آن در افزایش فعالیت آنزیم سوپراکساید دیسموتاز و کاتالاز باشد (۲۵ و ۲۶). بنابراین، آلوپورینول می تواند سیستم دفاع آنتی اکسیدانی طبیعی را تنظیم نماید. آلوپورینول نه تنها مهارکننده گزانتین اکسیداز می باشد بلکه دارویی است که اختلال میتوکندریالی ناشی از ایسکمی را بهبود می بخشد (۲۸ و ۱۰). همچنین این دارو، مستقیماً به عنوان جاذب رادیکال های آزاد سمی هیدروکسیل عمل می کند (۱۳).

مطالعات نشان داده اند که آلوپورینول میزان سیتوکین های التهابی مانند فاکتور نکروز دهنده توموری آلفا (TNF- $\alpha$ )،

ایترلوکین ۱، متالوپیتیداز ماتریکسی و مولکولهای چسبندگی بین سلولی نوع یک (ICAM-1) را کاهش می دهد و فعال سازی فاکتور هسته ای کاپا B (NF-κB) را مهار می کند (۲۹). بررسی ها نشان داده است که آلوپورینول با کاهش بیان فاکتورهای پیش التهابی شامل TNF- $\alpha$  و ICAM-1 از مرگ عصبی ناشی از سمیت منوکسید کربن جلوگیری می کند (۳۰).

آلوپورینول همچنین مکانیسم های نوروپروتکتیو دیگری نیز دارد این دارو از طریق مهار بیون های فلزی مانند آهن فریک و مس، از اکسیداسیون لیپیدهای غشاء اریتروسیت ها جلوگیری می کند بنابراین اثر پروتکتیو آلوپورینول بر آسیب ناشی از ایسکمی - رپرفیوژن ممکن است ناشی از عملکرد شلاتوری این دارو باشد (۱۵). آلوپورینول با تسهیل انتقال الکترون از آهن فروس به آهن فریک سیتوکروم C، عملکرد میوکارد را در طی آسیب ناشی از رپرفیوژن میوکارد افزایش می دهد (۱۶). در طی ایسکمی مغزی، نوتروفیل ها در عروق خونی مغز تجمع می یابند و پس از ورود به پارانشیم مغز باعث ایسکمی - رپرفیوژن می شوند. آلوپورینول از طریق کاهش تجمع نوتروفیل ها، اثر محافظتی در برابر آسیب ایسکمی مغزی دارد (۱۴).

آن ها را به اسید اوریک تبدیل می کند و در طی این واکنش یون های سوپراکساید تولید می شوند. این دارو با مهار این آنزیم سطح اسید اوریک را کاهش می دهد. همزمان با آن، گزانتین و هیبوگزانتین که محلول تر هستند، افزایش می یابند (۲۳). نتایج ما نشان داد پرانکوپاسیون با آلوپورینول توانسته از مرگ سلولی ناشی از غلظت بالای گلوکز جلوگیری نماید. این نتایج با مطالعات گذشته که نشان دادند آلوپورینول توانسته دیس فانکشن قلبی را بهبود بخشد و از آسیب میوکارد جلوگیری نماید (۲۴) و همچنین آلوپورینول در موش صحرایی به طور قابل ملاحظه remodeling را در انفارکتوس قلبی و کاردیومیوپاتی کاهش داده است، مطابقت دارد (۲۵).

مالون دی آلدئید محصول نهایی پراکسیداسیون لیپیدی است و به عنوان یک بیومارکر پراکسیداسیون لیپیدی اندازه گیری می شود. نتایج ما نشان داد که غلظت بالای گلوکز میزان مالون دی آلدئید را افزایش داده است. در شرایط غلظت بالای گلوکز، پرانکوپاسیون با آلوپورینول به طور قابل توجهی توانست میزان مالون دی آلدئید را کاهش دهد. این موافق با مطالعات قبلی است که نشان می دهنند در موش صحرایی، آلوپورینول از افزایش مالون دی آلدئید ناشی از ایزوپروترنول جلوگیری می کند و این دارو در موش سوری، افزایش مالون دی آلدئید ناشی از آثریوتانسین II را مهار می کند (۲۶ و ۷). در مطالعه دیگری نشان داده شده است که در موش صحرایی، ترکیب آلوپورینول و ان استیل سیستین نخاع را از آسیب ایسکمی - رپرفیوژن محافظت می نماید (۲۷).

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که غلظت بالای گلوکز میزان ظرفیت آنتی اکسیدانی را کاهش داده است. پرانکوپاسیون با آلوپورینول به طور قابل توجهی توانسته از کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانی جلوگیری کرده و این ظرفیت را افزایش دهد. این یافته ها در توافق با مطالعه ای است که نشان می دهد در موش صحرایی درمان با آلوپورینول موجب افزایش فعالیت آنزیم کاتالاز شده است و از انفارکتوس و آسیب

لیپید پر اکسیداسیون را کاهش داده است و از کاهش گروه های تیول ناشی از غلظت بالای گلوکز جلوگیری کرده است. به علاوه این دارو توانسته ظرفیت آنتی اکسیدانی تام را افزایش دهد. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که آلوپورینول به سبب دارا بودن ویژگی های آنتی اکسیدانت، قادر به جلوگیری از استرس اکسیداتیو و مرگ سلولی ناشی از غلظت بالای گلوکز می باشد.

### تشکر و قدردانی

بدینوسیله از معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت حمایت مالی از این تحقیق، تشکر و قدردانی به عمل می آید.

نتایج ما نشان داد در شرایط غلظت بالای گلوکز، گروه های تیول پروتئین ها که به استرس اکسیداتیو حساسند در نتیجه این آسیب ها کاهش می یابند. در توافق با یافته ما در مطالعه ای نشان داده شده است که میزان تیول پروتئین های سرمی در هر دو نوع دیابت کاهش می یابند (۳۱). در مطالعه دیگری یافت شده است که در بیماران تیپ ۲ دیابت، مقادیر تیول سرمی کاهش یافته است (۳۲). همچنین ما نشان دادیم که آلوپورینول توانسته از کاهش گروه های تیول پروتئین ها ناشی از غلظت بالای گلوکز جلوگیری نماید.

### نتیجه گیری

مطالعه حاضر نشان داد که آلوپورینول اثرات نوروپرتوکتیو بر آپوپتوز ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلول های PC12 دارد. در این مطالعه دیده شد که آلوپورینول میزان

### References

1. Hosseini A, Abdollahi M. Diabetic neuropathy and oxidative stress: therapeutic perspectives. *Oxid Med Cell Longev* 2013; 2013: 1-15.
2. Leininger GM, Edwards JL, Lipshaw MJ, Feldman EL. Mechanisms of disease: mitochondria as new therapeutic targets in diabetic neuropathy. *Nat Clin Pract Neurol* 2006; 2: 620-628.
3. Valko M, Leibfritz D, Moncol J, Cronin MT, Mazur M, Telser J. Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human disease. *Int J Biochem Cell Biol* 2007; 39: 44-84.
4. Negi G, Kumar A, Joshi RP, Ruby P, Sharma SS. Oxidative stress and diabetic neuropathy: current status of antioxidants. *IIOAB J* 2011; 2: 71-78.
5. Chilelli N, Burlina S, Lapolla A. AGEs, rather than hyperglycemia, are responsible for microvascular complications in diabetes: a “glycoxidation-centric” point of view. *Nutr Metab Cardiovasc Dis* 2013; 23: 913-919.
6. Pacher P, Nivorozhkin A, Szabó C. Therapeutic effects of xanthine oxidase inhibitors: renaissance half a century after the discovery of allopurinol. *Pharmacol Rev* 2006; 58: 87-114.
7. Jia N, Dong P, Ye Y, Qian C, Dai Q. Allopurinol attenuates oxidative stress and cardiac fibrosis in angiotensin II-induced cardiac diastolic dysfunction. *Cardiovasc Ther* 2012; 30: 117-123.
8. Shin JH, Chun KS, Na YG, Song KH, Kim SI, Kim GH. Allopurinol protects against ischemia/reperfusion-induced injury in rat urinary bladders. *Oxid Med Cell Longev* 2015; 2015: 1-8.
9. Marro PJ, Mishra OP, Delivoria-Papadopoulos M. Effect of allopurinol on brain adenosine levels during hypoxia in newborn piglets. *Brain Res* 2006; 1073: 444-450.

10. Işık N, Berkman MZ, Pamir MN, Kalelioğlu M, Sav A. Effect of allopurinol in focal cerebral ischemia in rats: an experimental study. *Surg Neurol* 2005; 64: S5-S10.
11. Betz AL. Identification of hypoxanthine transport and xanthine oxidase activity in brain capillaries. *J Neurochem* 1985; 44: 574-579.
12. Phillis JW, Sen S. Oxypurinol attenuates hydroxyl radical production during ischemia/reperfusion injury of the rat cerebral cortex: an ESR study. *Brain Res* 1993; 628: 309-312.
13. Moorhouse PC, Grootveld M, Halliwell B, Quinlan JG, Gutteridge J. Allopurinol and oxypurinol are hydroxyl radical scavengers. *FEBS Lett* 1987; 213: 23-28.
14. Hudome S, Palmer C, Roberts RL, Mauger D, Housman C. The role of neutrophils in the production of hypoxic-ischemic brain injury in the neonatal rat. *Pediatr Res* 1997; 41: 607-616.
15. Ko KM, Godin DV. Inhibition of transition metal ion-catalysed ascorbate oxidation and lipid peroxidation by allopurinol and oxypurinol. *Biochem Pharmacol* 1990; 40: 803-809.
16. Peterson D, Kelly B, Gerrard J. Allopurinol can act as an electron transfer agent. Is this relevant during reperfusion injury? *Biochem Biophys Res Commun* 1986; 137: 76-79.
17. Hattangady NG, Rajadhyaksha MS. A brief review of in vitro models of diabetic neuropathy. *Int J of Diabetes Dev Ctries* 2009; 29: 143-149.
18. Sharifi AM, Mousavi SH, Farhadi M, Larijani B. Study of high glucose-induced apoptosis in PC12 cells: role of bax protein. *J Pharmacol Sci* 2007; 104: 258-262.
19. Lelkes E, Unsworth BR, Lelkes PI. Reactive oxygen species, apoptosis and altered NGF-induced signaling in PC12 pheochromocytoma cells cultured in elevated glucose: An in vitro cellular model for diabetic neuropathy. *Neurotox Res* 2001; 3: 189-203.
20. Sharifi AM, Eslami H, Larijani B, Davoodi J. Involvement of caspase-8,-9, and -3 in high glucose-induced apoptosis in PC12 cells. *Neurosci Lett* 2009; 459: 47-51.
21. Yagihashi S, Mizukami H, Sugimoto K. Mechanism of diabetic neuropathy: where are we now and where to go? *J Diabetes Investig* 2011; 2: 18-32.
22. Nishikawa T, Edelstein D, Du XL, Yamagishi S, Matsumura T, Kaneda Y, et al. Normalizing mitochondrial superoxide production blocks three pathways of hyperglycaemic damage. *Nature* 2000; 404: 787-790.
23. Bernal JA, Quilis N, Andrés M, Sivera F, Pascual E. Gout: optimizing treatment to achieve a disease cure. *Ther Adv Chronic Dis* 2016; 7: 135-44.
24. Gao X, Xu Y, Xu B, Liu Y, Cai J, Liu HM, et al. Allopurinol attenuates left ventricular dysfunction in rats with early stages of streptozotocin-induced diabetes. *Diabetes Metab Res Rev* 2012; 28: 409-417.
25. Minhas KM, Saraiva RM, Schuleri KH, Lehrke S, Zheng M, Salariaris AP, et al. Xanthine oxidoreductase inhibition causes reverse remodeling in rats with dilated cardiomyopathy. *Circ Res* 2006; 98: 271-279.
26. Sagor MAT, Tabassum N, Potol MA, Alam MA. Xanthine oxidase inhibitor, allopurinol, prevented oxidative stress, fibrosis, and myocardial damage in isoproterenol induced aged rats. *Oxid Med Cell Longev* 2015; 2015: 1-9.
27. Erkut B, Onk OA. Effect of N-acetylcysteine and allopurinol combination to protect spinal cord ischemia/reperfusion injury induced by aortic cross-clamping in rat model. *J Cardiothorac Surg* 2015; 10: 95.
28. Canbaz S, Duran E, Ege T, Sunar H, Cikirkcioglu M. The effects of intracoronary administration of vitamin E on myocardial ischemia-reperfusion injury during coronary artery surgery. *Thorac Cardiovasc Surg* 2003; 51: 57-61.

29. Yamaguchi M, Okamoto K, Kusano T, Matsuda Y, Suzuki G. The effects of xanthine oxidoreductase inhibitors on oxidative stress markers following global brain ischemia reperfusion injury in C57BL/6 mice. PLoS One 2015; 10: e0133980.
30. Dong G, Ren M, Wang X, Jiang H, Yin X. Allopurinol reduces severity of delayed neurologic sequelae in experimental carbon monoxide toxicity in rats. Neurotoxicology 2015; 48: 171-179.
31. Van Campenhout A, Van Campenhout C, Lagrou AR, Abrams P, Moorkens G, Van Gaal L, et al. Impact of diabetes mellitus on the relationships between iron-, inflammatory-and oxidative stress status. Diabetes Metab Res and Rev 2006; 22: 444-454.
32. Srivatsan R, Das S, Gadde R, Manoj-Kumar K, Taduri S, Rao N, et al. Antioxidants and lipid peroxidation status in diabetic patients with and without complications. Arch Iran Med 2009; 12: 121-127.