

## Etiology of Upper Gastrointestinal Bleeding in the Children Admitted to Besat Hospital in Sanandaj

Pedram Ataee<sup>1</sup>, Mahtab Kakaie<sup>2</sup>, Borhan Moradveisi<sup>3</sup>, Rasoul Nasiri<sup>4</sup>, Masoumeh Abedini<sup>5</sup>, Daem Roshani<sup>6</sup>, Armen Malekiantaghi<sup>7</sup>, Kambiz Eftekhari<sup>8</sup>

1. Assistant professor, Department of Pediatric, Liver and Digestive Research center, Research Institute for Health Development, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran. ORCID ID: 0000-0003-1201-8868

2. General Practitioner, Department of Pediatric, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran. ORCID ID: 0000-0003-2721-7667

3. Assistant professor, Department of pediatric, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran. ORCID ID: 0000-0002-1952-4344

4. Assistant professor, Department of Pediatric, Lung Disease and Allergy Research centre, Cellular and Molecular Research center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran. ORCID ID: 0000-0001-6351-2909

5. Assistant professor, Pediatric department, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran. ORCID ID: 0000-0001-7743-5174

6. Associate professor, Department of Statistics and Epidemiology, Social Determinants of Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran. ORCID ID: 0000-0003-4746-1114

7. Assistant professor, Department of Pediatric, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. ORCID ID: 0000-0002-0110-9580

8. Associate professor, Department of Pediatric, Pediatric Gastroenterology and Hepatology Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding Author), Tel: +982173013000, Email: [dr\\_k\\_eftekhary@yahoo.com](mailto:dr_k_eftekhary@yahoo.com). ORCID ID: 0000-0003-3471-2498

### ABSTRACT

**Background and Aim:** Upper gastrointestinal bleeding is defined as bleeding occurring from a site proximal to the ligament of Trietz, which can present as hematemesis, melena, and hematochezia. Epidemiological studies on pediatric upper gastrointestinal bleeding were limited and its accurate incidence is not clear. This study deals with epidemiological investigation of upper gastrointestinal bleeding in hospitalized children.

**Materials and Methods:** This was a cross-sectional-descriptive retrospective study. Medical records of the children under 14 years of age who had been hospitalized in Besat Hospital in Sanandaj for upper gastrointestinal bleeding over the past seven years (2011-2017) were reviewed. Demographic data and endoscopic results obtained from the medical records were recorded in the questionnaires. Using SPSS 20 software, statistical analysis was performed.

**Results:** Our study included 121 medical records. 64.5% of the patients were male. The mean age of the children was 5.66 years and the duration of hospitalization was 3.13 days. Among the patients, 77% were urban dwellers, 95% presented with hematemesis. 8.3% were treated with mechanical ventilation, and 5.8% had coagulation disorders. Endoscopic results showed that 45.5% of the children had prolapse gastropathy and 15.7% had Mallory Weiss syndrome.

**Conclusion:** According to our results, the most common manifestation of upper gastrointestinal bleeding in children was hematemesis and the most common cause of it was prolapse gastropathy.

**Keywords:** Upper gastrointestinal bleeding, Children, Epidemiology, Prolapse gastropathy, Mallory Weiss syndrome

**Received:** May 2, 2020

**Accepted:** Jan 23, 2020

**How to cite the article:** Pedram Ataee, Mahtab Kakaie, Borhan Moradveisi, Rasoul Nasiri, Masoumeh Abedini, Daem Roshani, Armen Malekiantaghi, Kambiz Eftekhari. The Etiology of Upper Gastrointestinal Bleeding in Children Admitted at Besat Hospital of Sanandaj. *SJKU* 2021;26(7):45-52.

Copyright © 2018 the Author (s). Published by Kurdistan University of Medical Sciences. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial License 4.0 (CCBYNC), where it is permissible to download, share, remix, transform, and buildup the work provided it is properly cited. The work cannot be used commercially without permission from the journal

## علت خونریزی گوارشی فوقانی در کودکان بستری در بیمارستان بعثت سنندج

پدرام عطائی<sup>۱</sup>، مهتاب کاکایی<sup>۲</sup>، برهان مرادویسی<sup>۳</sup>، رسول نصیری<sup>۴</sup>، معصومه عابدینی<sup>۵</sup>، دائم روشنی<sup>۶</sup>، آرمن ملکیان طاقی<sup>۷</sup>، کامبیز افتخاری<sup>۸</sup>

۱.استادیار، گروه کودکان، مرکز تحقیقات گوارش و کبد، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران کد ارکید: ۸۸۶۸-۱۲۰۱-۰۰۰۳-۰۰۰۰-۰۰۰۰

۲.پزشک عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران، کد ارکید: ۷۶۶۷-۲۷۲۱-۰۰۰۳-۰۰۰۰-۰۰۰۰

۳.استادیار، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران کد ارکید: ۴۳۴۴-۱۹۵۲-۰۰۰۲-۰۰۰۰-۰۰۰۰

۴.استادیار، گروه کودکان، مرکز تحقیقات بیماری ری و آلرژی، مرکز تحقیقات علوم سلولی و مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. کد ارکید: ۲۹۰۹-۶۳۵۱-۰۰۰۰-۰۰۰۱

۵.استادیار، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. کد ارکید: ۵۱۷۴-۷۷۴۳-۰۰۰۱-۰۰۰۰-۰۰۰۰

۶.دانشیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. کد ارکید: ۱۱۱۴-۴۷۴۶-۰۰۰۳-۰۰۰۰-۰۰۰۰

۷.استادیار، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. کد ارکید: ۹۵۸۰-۰۱۱۰-۰۰۰۲-۰۰۰۰-۰۰۰۰

۸.دانشیار، گروه کودکان، مرکز تحقیقات گوارش و کبد کودکان، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرن. (نویسنده مسئول)، پست الکترونیک:

[dr\\_k\\_eftkhary@yahoo.com](mailto:dr_k_eftkhary@yahoo.com)، تلفن: ۰۲۱-۷۳۰۱۳۰۰۰، کد ارکید: ۲۴۹۸-۳۴۷۱-۰۰۰۳-۰۰۰۰-۰۰۰۰

### چکیده

**زمینه و هدف:** خونریزی دستگاه گوارش فوقانی، زمانی که محل خونریزی پروگزیمال به لیگامات تراپتز باشد، در نظر گرفته می شود که می تواند به صورت هماتمز و ملنا یا هماتوئیزی تظاهر نماید. مطالعات اپیدمیولوژیک در مورد خونریزی دستگاه گوارش فوقانی کودکان محدود بوده و از بروز دقیق آن مشخص نیست. هدف ما بررسی اپیدمیولوژیک خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در کودکان بستری بود.

**مواد و روش ها:** این مطالعه، یک مطالعه مقطعی - توصیفی گذشته نگر بود. پرونده کودکان کمتر از ۱۴ سال که در طی ۷ سال اخیر (۱۳۹۰-۱۳۹۶) به علت خونریزی گوارشی فوقانی در بیمارستان بعثت سنندج بستری شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک و نتایج آندوسکوپی در پرسشنامه ها ثبت گردید این اطلاعات از پرونده پزشکی آنها به دست آمد. تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزار SPSS 20 انجام شد.

**یافته ها:** ۱۲۱ پرونده پزشکی در این مطالعه وارد شدند. ۶۴/۵٪ بیماران، مذکر بودند. میانگین سنی کودکان ۵/۶۶ سال و مدت زمان بستری ۳/۱۳ روز بود. حدود ۷۷٪ شهرنشین بود. ۹۵٪ کودکان با تظاهر هماتمز مراجعه کرده بودند. ۸/۳٪ بیماران تحت درمان با تهویه مکانیکی بودند. ۵/۸٪ این کودکان دچار اختلال انعقادی بودند. نتایج آندوسکوپی نشان داد که ۴۵/۵٪ کودکان دچار پرولاپس گاستروپاتی و ۱۵/۷٪ نیز دچار مالوری وایس Mallory Weiss بودند.

**نتیجه گیری:** برطبق نتایج ما، شایع ترین تظاهر خونریزی گوارشی فوقانی در کودکان، هماتمز و شایع ترین علت آن، پرولاپس گاستروپاتی بود.

**کلمات کلیدی:** خونریزی فوقانی گوارشی، کودکان، اپیدمیولوژی، پرولاپس گاستروپاتی، مالوری وایس

ووصول مقاله: ۹۹/۲/۱۳ اصلاحیه نهایی: ۹۹/۱۱/۱۷ پذیرش: ۹۹/۱۲/۴

## مقدمه

گاستریت، بیان کرده است در کل گاستریت اروزو و اولسر پپتیک ۴۰ تا ۷۵٪ علل را تشکیل می دهند. (۸، ۶) بیمارانی که در بیمارستان بستری می شوند به علت بیماری زمینه ای شدید یا استرس ناشی از بیماری ممکن است دچار خونریزی دستگاه گوارش فوقانی شوند که این خونریزی می تواند روی روند بهبودی آن‌ها اثر گذاشته و یا وضعیت بیمار را بدتر کند که آگاهی از میزان شیوع خونریزی گوارشی در بیمارستان و عوامل مرتبط با آن می تواند سبب آگاهی از وضعیت موجود شده و زمینه را برای راهکارهای عملی جهت امکان کاهش میزان خونریزی در این بیماران فراهم نماید. (۵) برای تعیین میزان اهمیت یک موضوع و برآورد مشکلاتی که ایجاد می کند، اولین اقدام بررسی اپیدمیولوژی آن است تا براساس آن بتوان دید بهتری از مسئله داشت و برای یافتن راهکارهای اساسی اقدام نمود؛ بنابراین هدف از این مطالعه بررسی اپیدمیولوژیک خونریزی گوارشی فوقانی در کودکان بستری در بیمارستان بعثت سنندج بود تا بتوان از وضعیت موجود در بیمارستان آگاه شد و از عوامل خطر بروز خونریزی اطلاع حاصل نمود و با اقدامات پیشگیری کننده، از بروز این مشکل پیشگیری نمود. روش انجام مطالعه:

این مطالعه مقطعی توصیفی، بر روی پرونده تمام کودکانی که به علت خونریزی گوارشی فوقانی در طی سال‌های ۹۶-۱۳۹۰ در بیمارستان بعثت سنندج بستری بودند یا مواردی که در مدت بستری دچار خونریزی گوارشی فوقانی شدند، به روش سرشماری انجام گرفت. برای ورود بیماران به مطالعه وجود معیارهای زیر ضروری بود: سن زیر ۱۴ سال با شکایت خونریزی گوارشی (اعم از استفراغ خون روشن، coffee ground، ملنا و افت ناگهانی هموگلوبین) که بر اساس شرح حال، معاینه فیزیکی و اقدامات تشخیصی دیگر (از جمله شستشوی معده و آندوسکوپی) خونریزی گوارشی آن‌ها تأیید شده باشد. بیمارانی که منشاء خونریزی از قسمت فوقانی دستگاه

خونریزی‌های دستگاه گوارش (GIB) به دو دسته با منشأ فوقانی و تحتانی تقسیم می شوند. (۱) خونریزی گوارشی فوقانی (Upper Gastrointestinal Bleeding) از نظر آناتومی به خونریزی بالاتر از لیگامان تریتز (Trietz) گفته می شود که به صورت استفراغ خون روشن یا هماتمز (Hematemesis) یا استفراغ خون تیره یا کافی گراند (Coffee Ground)، مدفوع سیاه قیری رنگ یا ملنا (Melena)، وجود خون مخفی در مدفوع و یا به ندرت به صورت دفع خون روشن از مقعد یا هماتوئیزی (Hematochezia) ظاهر می‌نماید. محل آن در مری، معده، دئودنوم و به ندرت در ابتدای ژژنوم است. (۳-۱) علل خونریزی گوارشی فوقانی می‌تواند تحت تأثیر فاکتورهای متعددی نظیر سن، جنس، تابلوی اپیدمیولوژیک، بیماری‌ها گوارشی و غیر گوارش، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، الگوی تغذیه‌ای، آب‌وهوا و شرایط جغرافیایی و ... است. (۲) خونریزی گوارشی در کودکان اتفاقی نه چندان شایع است؛ ولی بالقوه جدی است که با پی‌شرفته‌ترین امکانات تشخیصی در ۵ تا ۱۵٪ موارد خطر مرگ وجود دارد؛ بنابراین پیدا کردن علت و کانون خونریزی از نظر پیش آگهی و درمان مهم و حیاتی است. (۴) با وجود این که مطالعات متعددی در ارتباط با جزئیات تشخیص و درمان خونریزی گوارشی صورت گرفته؛ ولی اپیدمیولوژی آن در کودکان مشخص نیست. (۵) براساس مطالعات موجود میزان بروز خونریزی گوارشی در بخش مراقبت‌های ویژه کودکان در محدوده ۶ تا ۲۵٪ متغیر بوده است که این اختلاف زیاد، به دلیل محدود بودن تعداد مقالات و اختلاف میان آن‌ها از نظر ملاک‌های تشخیصی، انتخاب بیماران، روش تحقیق و محل انجام آن بوده است. (۶) برخی مطالعات در کشور ما شایع‌ترین علت خونریزی گوارشی فوقانی را ضایعات اروزو بیان کرده‌اند. (۷) و در مطالعات دیگر شایع‌ترین علت به ترتیب اولسر دئودنوم، اولسر معده و

اخلاق دانشگاه علوم پزشکی کردستان تأیید شد. (کد اخلاق:

IR.MUK.REC.1397.316

تجزیه و تحلیل داده ها:

تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ انجام شد. در این مطالعه متغیرهای کمی بر اساس میانگین و انحراف معیار و متغیرهای کیفی با تعداد و درصد برآورد شد.

نتایج:

در این مطالعه ۱۲۱ نفر وارد مطالعه شدند. میانگین سنی بیماران  $3/65 \pm 5/66$  سال (۲ ماه تا ۱۳ سال) و مدت زمان بستری و  $1/87 \pm 3/13$  روز (۱ روز تا ۱۱ روز) بود.  $64/5\%$  بیماران (۷۸ نفر) مذکر بودند. حدود  $77\%$  بیماران (۹۳ نفر) شهرنشین بود. (جدول ۱)

گوارش را نداشتند و منشاء خونریزی تحتانی داشتند و بیمارانی که پرونده ناقص داشتند، وارد مطالعه نشدند. با توجه به اینکه این مطالعه، در بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ به روش تمام شماری انجام گرفت، در نهایت ۱۲۱ نفر در این مدت، وارد مطالعه شدند. پس از تصویب پروپوزال و هماهنگی با دانشکده پزشکی و معاونت پژوهشی و همچنین ریاست مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بعثت به بایگانی بیمارستان بعثت مراجعه کرده و پرونده کودکان بستری شده در بیمارستان در طی این ۶ سال مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات دموگرافیک کودکان مبتلا به خونریزی گوارشی فوقانی شامل سن، جنس، علت و مدت زمان بستری، نوع خونریزی، علت خونریزی استخراج و در چک لیست مربوطه ثبت گردید.

ملاحظات اخلاقی: اطلاعات بیماران نزد پژوهشگر به صورت محرمانه باقی خواهد ماند. پروتکل اجرای مطالعه توسط کمیته

جدول ۱: توزیع فراوانی در افراد مورد مطالعه بر حسب جنسیت و محل سکونت

متغیر	تعداد	درصد
جنسیت		
پسر	۷۸	۶۴/۵
دختر	۴۳	۳۵/۵
محل سکونت		
شهر	۹۳	۷۶/۹
روستا	۲۸	۲۳/۱
کل	۱۲۱	۱۰۰

در ۹۵٪ موارد هماتمز تظاهر اولیه مراجعه بوده است. جدول ۲ هیچ کدامیک از این کودکان سابقه قبلی خونریزی را نداشتند.

جدول ۲: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب علت مراجعه

علت مراجعه	تعداد	درصد
ملنا	۲	۱/۷
هماتمز	۱۱۵	۹۵
ملنا/هماتمز	۲	۱/۷
هماتمز/هماتوشری	۲	۱/۷
کل	۱۲۱	۱۰۰

کمبود فاکتور انعقادی وجود داشت. نتایج حاصل از آندوسکوپی های انجام شده، نشان داد که پرولاپس گاستروپاتی (۵۵ نفر-۰/۴۵/۵) و Mallory Weiss (۱۹ نفر-۰/۱۵/۷) شایع ترین علل خونریزی بودند. جدول شماره ۳ علل خونریزی گوارشی در کودکان مبتلا به خونریزی گوارشی فوقانی بستری در بیمارستان را نشان می دهد. در ۵ کودک (۵/۷٪) سابقه مصرف داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (NSAIDs) وجود داشت که همگی به دنبال مصرف ایبوپروفن بوده است.

۷۷ کودک (۰/۶۳/۶)، در طی ۲۴ ساعت اول بعد از خونریزی، تحت آندوسکوپی قرار گرفتند. در کل تشخیص خونریزی گوارشی فوقانی براساس شرح حال، وجود خون روشن یا کافی گراند در محتویات لوله معده (NGT) و در نهایت آندوسکوپی فوقانی بود. در ۴۴ بیمار به دلایل ناپایدار بودن علائم بالینی، تحت درمان با ویتیلایسون مکانیکی و وجود اختلال انعقادی عمده، امکان انجام آندوسکوپی وجود نداشت. ۱۰ کودک (۰/۸/۳) نیاز به تهویه مکانیکی داشت. اختلال انعقادی در ۷ کودک (۰/۵/۸) وجود داشت که بیشتر موارد از نوع Partial Thromboplastin Time (PPT) طولانی (۵ مورد ۰/۴/۱) بود، یک مورد (۰/۰/۸) ترومبوسیتوپنی و یک مورد (۰/۰/۸) هم

جدول ۳: توزیع فراوانی در افراد مورد مطالعه برحسب علت خونریزی

درصد	تعداد	علت خونریزی
۴۵/۵	۵۵	پرولاپس گاستروپاتی
۱۵/۷	۱۹	مالوری ویس
۵/۷	۷	استرس اولسر
۵	۶	گاستریت
۵	۶	ازوفازیت
۵/۷	۵	مصرف داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (ایبوپروفن)
۳/۳	۴	اولسر معده
۲/۵	۳	هرنی هیاتال
۲/۵	۳	اولسر دئودنوم
۱/۶	۲	بلع خون ناشی از اپیتاکسی
۰/۸	۱	واریس مری
۰/۸	۱	ون ویلبراند
۰/۸	۱	هموفیلی
۰/۸	۱	ترومبوآستی گلن زمین
۵/۷	۷	نامشخص
۱۰۰	۱۲۱	کل

## بحث

در استان کردستان تاکنون چنین مطالعه‌ای انجام نشده بود، مطالعات قبلی انجام شده در ایران مربوط به چندین سال قبل بوده و مطالعه جدیدی انجام نشده بود؛ بنابراین ممکن است امروزه با توجه به تغییرات زندگی شهرنشینی، نوع تغذیه و یا استرس‌های محیطی، علل مسبب خونریزی در کودکان تغییر یافته باشد. از طرفی اکثر مطالعات قبلی در مراکز ریفرال انجام شده بود (با بیماران ارجاعی و انتخاب شده از کل کشور)؛ بنابراین انتظار می‌رود شیوع واقعی و تنوع اتیولوژی بیماری، همسان با کل کشور نباشد. بیمارستان بعثت سنندج (واقع در شمال غربی کشور) مرکز ارجاعی از کل کشور نبوده و از نظر به دست آوردن آمار دقیق منطقه، ارزشمند است و نتایج آن قابل مقایسه با مراکز مختلف است. احتمال اینکه در بقیه استان‌های کشور نیز نتایج مشابه دیده شود، بیشتر است. از جمله نقاط قوت دیگر مطالعه ما، بررسی طولانی مدت (۷ سال) پرونده‌ها است در مقالات قبلی طول مدت کوتاه بود. بر اساس مطالعه ما پرولاپس گاستروپاتی ۴۵/۵٪ و مالوری ویس ۱۵/۷٪ شایع‌ترین علل خونریزی گوارشی در کودکان بودند. مطالعه ما نشان داد ۶۴/۵٪ افراد مورد بررسی پسر بودند. در برخی مطالعات همانند مطالعه ما بیشترین موارد مبتلا در بین پسران بوده است (۷، ۹-۱۱) در مطالعه Chookhuan و همکاران موارد در بین دختران و پسران مساوی بود. (۱۲)

در مطالعه ما، میانگین سنی کودکان ۵/۶۶ سال بود. در مطالعه دهقانی و همکاران (۱۳) میانگین سنی ۷/۷ سال بود و در مطالعه Chookhuan و همکاران (۱۲) ۳/۸۲ سال بود. میانگین سنی متفاوت در هر یک از مطالعات در مناطق مختلف به دلیل بررسی گروه‌های سنی متفاوت از نظر خونریزی دستگاه گوارش فوقانی می‌تواند باشد. در مطالعه عبدالله پور میزان بروز خونریزی گوارشی ۱۵/۸٪ به دست آمد که همگی از نوع هماتمز بوده است. (۱۴) در مطالعه ما نیز ۹۵٪ تظاهرات UGIB

هماتمز بود. در مطالعه جعفری و همکاران شایع‌ترین علت خونریزی پرولاپس گاستروپاتی و ازوفازیت بود. (۱۵) که همسو با مطالعه ما بود. در مطالعات مختلف، علل شایع UGIB متفاوت بیان شده است. در برخی مطالعات گاستریت اروزیو (۱۶، ۱۲)، در برخی ازوفازیت اروزیو، مالوری ویس و گاستریت (۷) و در برخی دیگر گاستریت یا زخم معده (۱۹-۱۷) گزارش شده است. در مطالعه دهقانی (۱۳) همانند مطالعه ما، اولسر دئودنوم جزء علل کمتر شایع UGIB بود. مهم‌ترین اختلاف نتایج ما نسبت به مطالعات مشابه دیگر، تغییر در علت ایجادکننده خونریزی گوارشی فوقانی در کودکان بود. در مطالعات اولیه، زخم معده و دئودنوم علل شایع خونریزی گوارشی فوقانی بوده‌اند و در گذر زمان گاستریت اروزیو نهایتاً پرولاپس گاستروپاتی توانسته‌اند بیشترین شیوع را به خود اختصاص دهند. به نظر می‌رسد با توجه به کاربرد فراوان روش‌های تشخیصی غیرتهاجمی *Hpylori* (از جمله آنتی‌ژن مدفوعی آن) و شناسایی زودرس عفونت با این ارگانسیم، بیماری پپتیک مرتبط به این آن کاهش یابد و در آندوسکوپی بیماران این مسئله دیده نشود.

در مطالعه ما ۵/۷٪ علل خونریزی در گروه کودکان ثانویه به مصرف NSAID بود. در حالی که مطالعه قنادی و همکاران (۳) در بزرگسالان نشان داد که ۲۳٪ علل خونریزی مربوط به مصرف منظم NSAID مخصوصاً مربوط به آسپرین بود. در توجه این اختلاف می‌توان به مصرف بیشتر این دسته داروها در گروه سنی بزرگسال نسبت به گروه سنی کودکان اشاره نمود.

## نتیجه‌گیری

بر اساس مطالعه حاضر، میانگین سنی کودکان دچار UGIB حدود ۵ سال، با ارجحیت جنسی پسر و شایع‌ترین تظاهر آن

انجام این تحقیق یاری نمودند. همچنین از مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان بعثت سنندج نیز به علت ارائه مشاوره برای انجام این مطالعه و تهیه مقاله کمال تشکر را داریم. هیچ کدام از نویسندگان این مطالعه، افراد و یا دستگاه ها تعارض منافی برای انتشار این مقاله ندارند.

هماتم (۹۵٪) بود. شایع ترین علت خونریزی در این کودکان پرولاپس گاستروپاتی و Mallory Weiss بود.

### تشکر و قدردانی

از همکاری ریاست، معاونت پژوهشی و مسئول بایگانی بیمارستان بعثت صمیمانه تشکر و قدردانی می کنیم که ما را در

### منابع

1. Maqbool A, Liacouras CA. Major Symptoms and Signs of Digestive Tract Disorders (Chapter 332). In: Robert M Kliengman, Joseph W St Geme, Nathan J Blum, Samir S Shah, Robert C Tasker, Karen M Wilson, Richard E Behrman. Nelson Text book of pediatrics, 21<sup>th</sup> edition. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2019, 1902-1912.
2. Gilger MA, Whitfield Van Buren K. Upper Gastrointestinal Bleeding (Chapter 44). In: Kleinman RE, Sanderson IR, Goulet O-J, Mieli-Vergani G, Sanderson I R, Sherman P M, Shneider B L. Walker's Pediatric Gastrointestinal Disease. 6<sup>th</sup> edition, Raleigh North Carolina; People's Medical Publishing House-USA, 2018. 1854-1943.
3. Sahn B, Mamula P, Friedlander JA. Gastrointestinal Hemorrhage (chapter 13). In: Robert Wyllie, Jeffrey S Hyams, Marsha Kay. Pediatric gastrointestinal and liver disease. 5<sup>th</sup> edition, Saunders Elsevier, Philadelphia, 2020. 125-135.
4. Romano C, Oliva S, Martellosi S, Miele E, Arrigo S, Graziani MG, Cardile S, Gaiani F, de'Angelis GL, Torroni F. Pediatric gastrointestinal bleeding: Perspectives from the Italian Society of Pediatric Gastroenterology. World J Gastroenterol. 2017 Feb 28; 23(8): 1328-1337.
5. Amini-Ranjbar S, Kazemi B. Etiologies of lower Gastrointestinal Bleeding in Children Referring to Afzalipour Hospital (Kerman 2005-2007): A Short Report. JRUMS. 2011; 10 (4):317-322.
6. Suchartlikitwong S, Lapumnuaypol K, Rerknimitr R, Werawatganon D. Epidemiology of upper gastrointestinal bleeding and Helicobacter pylori infection: review of 3,488 Thai patients. Asian Biomed. 2015; 9(1):87-93.
7. Rafeey M, Shoaran M, Majidy H. Diagnostic Endoscopy and Clinical Characteristics of Gastrointestinal Bleeding in Children: a 10-Year Retrospective Study, Iran Red Crescent Med J. 2013; 15(9): 794-797.
8. Bishop WP, Ebach DR. Digestive System. In: Marc dante KJ, Beherman RE, Kliegman R. Nelson Essentials of Pediatrics. 18<sup>th</sup> edition, Philadelphia; Saunders. 2019: 476-479.
9. Haghbin S, Manafi Anari A, Serati Z, Aflaki K, Haghghi Aski B, Navaei far MR. Incidence and risk factors of upper gastrointestinal bleeding in pediatric intensive care unit admitted patients. IJCA. 2016; 2(2): 11-16.
10. Esfahani ST, Madani A, Ataei N, Nadjafi M, Allahverdi B, Haddadi M. Upper gastrointestinal disorders in children with end-stage renal disease. Acta Med Iran. 2009; 47(1): 46-50.
11. Ombeva, O. M., G. Ndeezi, and J. Mugalu. Upper GI bleeding among neonates admitted to Mulago Hospital, Kampala, Uganda: a prospective cohort study. Afr health sci. 2013; 13(3):741-747
12. Nithiwathanapong Ch, Reungrongrat S, Ukarapol N. Prevalence and risk factors of stress-induced gastrointestinal bleeding in critically ill children. World J Gastroenterol. 2005; 11(43): 6839-6842. doi: [10.3748/wjg.v11.i43.6839](https://doi.org/10.3748/wjg.v11.i43.6839).
13. Dehghani, SM, Haghghat M, Imanieh MH, Tabebordbar MR. Upper gastrointestinal bleeding in children in Southern Iran. Indian J Pediatr. 2009; 76(6): 635-638.

14. Abdullahpour M. Frequency of gastrointestinal bleeding among children admitted in the pediatric intensive care unit of Abuzar hospital of Ahvaz in 2014 [Dissertation]. Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences; 2014.
15. Jafari SA, Kiani MA, Kianifar HR, Mansooripour M, Heidari E, Khalesi M. Etiology of gastrointestinal bleeding in children referred to pediatric wards of Mashhad hospitals, Iran. *Electron Physician*. 2018; 10(2): 6341-6345.
16. Huang IF, Wu TC. Upper gastrointestinal endoscopy in children with upper gastrointestinal bleeding. *J chin Med Asso*. 2003; 60(5): 271-275.
17. Serrano P, Lanas A, Arroyo MT, Ferreira IJ. Risk of upper gastrointestinal bleeding in patient taking low dose aspirin of cardiovascular disease. *Aliment Pharmacol Ther*. 2002; 16(11): 1945-1953.
18. Owensby S, Taylor K, Wilkins T. Diagnosis and Management of Upper Gastrointestinal Bleeding in Children. *J Am Board Fam Med*. 2015; 28(1): 134-145.
20. Genel S, Lucia SM, Daniel SG, Emanuela F. Gastrointestinal Bleeding in Children can have Many Causes. *Pharm Anal Acta*. 2016; 7(2): e184