

جدا سازی و کشت اولیه سلول‌های اپیتلیال تیموس رت با استفاده از آنزیم اکتینیدین میوه کیوی

کامران منصوری^۱، دکتر علی مصطفایی^۲، زینب شیروانی^۳، دکتر علی بید مشکی پور^۴

۱- کارشناس ارشد هاتولوژی، مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

۲- دانشیار اینولوژی، مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (مؤلف مسؤول) amostafa@kums.ac.ir

۳- کارشناس ارشد زیست‌شناسی سلولی مولکولی، گروه زیست‌شناسی دانشکده علوم دانشگاه رازی کرمانشاه

۴- استادیار زیست‌شناسی سلولی مولکولی، گروه زیست‌شناسی دانشکده علوم دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

زمینه و هدف: برای تجزیه ماتریکس خارج سلولی جداسازی و کشت اولیه سلولها از آنژیهای پروتئولیتیک خصوص کلاژناز برای هضم بافت استفاده می‌شود. یافتن پروتئاز جایگزین کلاژناز در منابع گیاهی یا جانوری که راحتتر و با هزینه کمتر تخلیص گردد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین علت در مطالعه حاضر از آنزیم اکتینیدین که به وفور در میوه کیوی یافت می‌شود، جهت جداسازی سلول‌های اپیتلیال تیموس موش صحرایی استفاده شد.

روش بررسی: آنزیم اکتینیدین تخلیص شده از میوه کیوی در دامنه غلظت ۱ تا ۱۰ میلی‌گرم در میلی‌لیتر و زمان ۳، ۴ یا ۵ ساعت برای جداسازی سلول‌های اپیتلیال تیموس موش صحرایی استفاده شد و سلول‌های اپیتلیال تیموس جدا شده در پلیت کلاژن دار همراه محیط کشت williams E کشت داده شدند. درصد زنده ماندن سلول‌های اپیتلیال با استفاده از تست تریپان بلو و مرفلوژی سلولها در مراحل کشت پس از رنگ‌آمیزی پاپا نیکولا بررسی شد.

یافته‌ها: اکتینیدین در غلظت ۴ میلی‌گرم در میلی‌لیتر در مدت زمان ۴-۵ ساعت ماتریکس خارج سلولی تیموس موش بزرگ را هضم و سلول‌های اپیتلیال تیموس را بطور مطلوب جدا نمود. درصد بقای سلول‌های جدا شده ۹۰-۹۵ درصد تخمین زده شد.

نتیجه‌گیری: آنزیم اکتینیدین میوه کیوی در مقایسه با کلاژناز، پروتئاز مناسبی برای جداسازی سلول‌های اپیتلیال تیموس موش و احتمالاً سایر حیوانات است. لذا با توجه به سادگی و کم هزینه بودن اکتینیدین، این آنزیم جایگزین مناسبی برای کلاژناز به هدف جداسازی سلول‌های اپیتلیال تیموس و کشت این سلولها است.

کلید واژه‌ها: اکتینیدین، سلول‌های اپیتلیال تیموس، کشت اولیه، کلاژناز

وصول مقاله: ۸۶/۹/۲۹ اصلاح نهایی: ۸۶/۱۱/۱ پذیرش مقاله: ۸۶/۱۱/۱۰

مقدمه

جداسازی و کشت اولیه سلول‌های تیموس کاربردهای فراوانی در زمینه‌های مختلف دارد. جداسازی سلول‌های اپیتلیال از تیموس حیوانات آزمایشگاهی و کشت آنها بیش از دو دهه است که برای ارزیابی

طبیعت این سلولها و نقش آنها در بلوغ سلول‌های T مورد استفاده قرار گرفته است (۱ و ۲). جدا سازی و

بررسی هورمونهای تیموسی (۳)، شناخت و درمان سرطان با استفاده از این هورمونها،

کاربردهای اپیتلیال از تیموس حیوانات آزمایشگاهی و کشت آنها بیش از دو دهه است که برای ارزیابی

۰/۵ ۲۳ کیلو دالتون است (۱۵). اکتینیدین یک پروتئاز مناسب در تردکردن گوشت است و در هضم مواد پروتئینی در بیماران دارای مشکلات گوارشی قابل استفاده می‌باشد. در چند مطالعه اثر کلاژنازی اکتینیدین مورد بررسی قرار گرفته است (۱۶,۱۷).

توجه به کاربردهای فراوان جداسازی و کشت سلولها اهمیت تولید و استفاده از یک آنزیم مناسب را گوشزد می‌کند. یکی از پر مصرف‌ترین آنزیم‌ها در این زمینه آنزیم کلاژناز است که از منابع مختلف بافتی یا میکروبی تهیه می‌شود. با توجه به مقدار کم کلاژناز در منابع فوق، مشکلات تخلیص این آنزیم، پایداری ضعیف آن در مراحل تخلیص و پرهزینه بودن تهیه آن از شرکت‌های خارجی (۱۸-۲۰) ضرورت یافتن جایگزین مناسب آن از نظر علمی و اقتصادی اهمیت دارد. بر همین اساس در مطالعه حاضر سعی شده که از آنزیم دیگری به نام اکتینیدین به عنوان جایگزین کلاژناز با هدف جداسازی سلولهای اپی تلیال تیموس استفاده شود. از نکات مثبت این آنزیم، فراوانی آن در میوه کیوی و امکان تخلیص آن به روشی نسبتاً ساده است که قبلاً در این مرکز امکان پذیر شده است (۲۱).

روش بررسی

مواد: آنزیم اکتینیدین میوه کیوی (تخلیص شده در مرکز تحقیقات بیولوژی پژوهشی کرمانشاه)، موش بزرگ با نژاد ویستار (مؤسسه سرم سازی رازی) ، محیط کشت D-MEM (Gibco) ، محیط کشت E Williams' ، ال-گلوتامین

مطالعه و درمان بیماریها مرتبط با سیستم ایمنی (۴-۶)، بررسی و مطالعه ایمنی سلولی (۷)، بررسی ساختار و عمل سایتوکاین‌های مختلف، بررسی و مطالعه مسیرهای انتقال سیگنال در لنفوسيتهاي T (۸)، بررسی و مطالعه ويژگي‌های کلي و مكانيسم‌های تحمل ايونولوژيك (۹)، بررسی و مطالعه نقش فيزيولوژيك آپوپتوزيس در لنفوسيتهاي T، بررسی و مطالعه نقصهای ایمنی مادرزادی و اكتسابی و درمان آنها از مواردي است که اهميت جدا سازي و کشت سلولهای تیموس را روشن می‌سازد (۱۰). بافت تیموس مانند دیگر بافتها، شامل سلولها و ماتریکس خارج سلولی متشكل از انواعی از پروتئينهاي رشته‌اي (مانند کلاژن و لاستين) و غير رشته‌اي است. یکی از فراوانترین پروتئينهاي فضای خارج سلولی کلاژن است که متشكل از یک مارپیچ سه تایی (سه زنجیره آلفا) است (۱۱ و ۱۲). مولکول کلاژن به اغلب پروتئازها غیر از کلاژنازها مقاوم است (۱۳). به همین دليل از کلاژنازها در جداسازی سلولهای مختلف بافت‌های جامد همچون تیموس استفاده می‌شود.

اکتینیدین یک سیستئین پروتئاز است که در میوه کیوی به وفور وجود دارد. این پروتئاز از نظر خصوصیات کلي مشابه سایر سایر سیستئین پروتئازهاي گیاهی (همچون پاپائین) و سیستئین پروتئازهاي حیوانی (همچون کاتپسین) است (۱۴). پيش آنزیم اکتینیدین در سلول (پري پروآنزیم) داراي ۳۰۲ اسیدآmine و وزني معادل

تعليق به لوله منتقل شده و با ۳۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۳ دقیقه سانتریفیوژ گردید. به منظور حذف کامل آنزیمها و قسمتهای هضم نشده عمل سانتریفیوژ سه بار دیگر تکرار شد. بعد از آخرین سانتریفیوژ، مایع رویی دور رجته شد و به رسوب سلولی محیط william's E ماتوکسیلین هریس، Rnگ ائوزین، FCS %۲۰ اضافه شد و با پیپت به خوبی به هم زده شد تا تعليق یکنواخت گردد. اين تعليق سلولی به پلیت کلاژن دار منتقل و در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد با CO_2 %۵ و O_2 %۹۵ موجود شد. برای رسیدن به انکوبه شد. برای رسیدن به جمعیت غنی از سلولهای اپی تلیال تیموس (سلولهای چسبیده به کف پلیت) تعویض محیط ۴۸ ساعت بعد انجام شد. بلافاصله پس از جداسازی سلولها از تیموس و نیز ۴۸ ساعت بعد از آن، درصد بقای سلولها با محلول %۰/۴ تریپان بلو اندازه‌گیری گردید. همچنین برای بررسی مورفولوژی سلول‌های جدا شده از Rnگ آمیزی پاپانیکولا (الکل %۹۶ ۱۵-۲۰ دقیقه، الکل %۸۰ ۳-۴ ثانیه، الکل %۷۰ ۳-۴ ثانیه، الکل %۵۰ ۳-۴ ثانیه، شستشو با آب جاری، Rnگ هماتوکسیلین ۵ دقیقه، شستشو با آب جاری، محلول اسید- الکل ۲ ثانیه، شستشو با آب جاری، الکل %۵۰ ۳-۴ ثانیه، الکل %۷۰ ۳-۴ ثانیه، شستشو با آب جاری، Rnگ OG ۵ دقیقه، شستشو با آب جاری، الکل %۹۶ ۳-۴ بار (هر بار یک ثانیه)، Rnگ ائوزین ۵ دقیقه، شستشو با آب جاری، الکل %۹۶ ۳-۴ بار (هر بار یک ثانیه)، الکل مطلق ۳-۴ (هر بار یک ثانیه)، خشک شدن لام ها،

(Sigma-Alderich) ۲ mM/ml جنتامايسين ۵۰ µg/ml (شركت البرز دارو)، آمفوتريسين بي Bristol-Myers Sqible) ۲/۵µg/ml جنين گاو (Gibco)، كلاژن نوع I (Roche)، آنزيم كلاژناز، دگزامتاazon، محلول %۰/۴ تریپان بلو (Gibco)، محلول هماتوكسيلين هريس، Rnگ ائوزين، Orange G، بافر فسفات نمکي (PBS) همگی از شركت Merck (مرک).

جدا سازی و کشت سلول‌های اپی تلیال تیموس

برای آتروفی تیموس و به حداقل رسیدن جمعیت تیموسیتها موجود در آن، یک میکروگرم دگزامتاazon به ازای هر گرم وزن موش بصورت داخل عضلانی تزریق شد. ۷۲ ساعت بعد، حیوان در شرایط استریل جراحی شد و تیموس از بدن خارج و درون یک پلیت قرار داده شد. تیموس جدا شده چندین بار با سرم فیزیولوژی شسته و ۳ میلیلیتر از محلول اکتینیدین یا کلاژناز به آن اضافه گردید (آنزیم‌ها در محیط کشت william's E با غلظت مختلف ۱، ۲، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ میلیگرم در هر میلی لیتر تهیه شدند). سپس تیموس با تیغ جراحی تکه تکه شد و به مدت ۱، ۲ یا ۳ ساعت تحت تأثیر آنزیم‌ها در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد با CO_2 %۵ و O_2 %۹۵ قرار گرفت. بعد از آن تیموس دوباره با تیغ جراحی خرد گردید و ۲ ساعت دیگر نیز هر آن زیم در شرایط فوق انکوبه شد. سپس به محلوط سلولی داخل پلیت، ۳-۴ میلیلیتر محیط william's E اضافه و با پیپت به خوبی به هم زده شد تا تعليق یکنواختي حاصل گردد. اين

گرفت که غلظت ۴ میلیگرم در میلیلیتر بهترین غلظت برای جداسازی سلولهای اپی تلیال با درصد بقای ۹۰-۹۵ درصد بود. بنابراین اکتینیدین با غلظت ۴ میلیگرم در میلیلیتر و مدت زمان ۳/۵-۴ ساعت استفاده گردید که این غلظت و مدت زمان در مقایسه با کلژناز با غلظت ۲ میلیگرم و مدت زمان ۳/۵-۴ ساعت برای جداسازی سلولهای اپی تلیال با درصد بقای بالا مناسب بود.

برای کشت سلولهای اپی تلیال جداسده، محیط‌های کشت F12 و William's E به طور جداگانه به کار برده شد. سلولها در محیط کشت William'sE درصد بقای بیشتری داشتند. لذا در مراحل بعدی از این محیط کشت استفاده گردید. سلولهای جداسده به پلیتهای کلژن دار منتقل شدند. این سلولها در ساعتهاي اوليه پس از جداسازی، گردد، کوچک و شناور بودند (شکل ۱-الف). در روز دوم، سلولها با روش پاپانیکولا رنگآمیزی و مورفولوژی آنها بررسی گردید. سلولها به شکل چند ضلعی، دارای هسته کوچک و سیتوپلاسم فراوان بودند (حجم سیتوپلاسم چند برابر حجم هسته بود) و بصورت یک لایه سلولی در کف پلیت دیده شدند. (شکل ۱-ب).

این نتایج نشان داد که سلولهای اپی تلیال به وسیله آنزیم اکتینیدین با غلظت ۴ میلیگرم در میلیلیتر و مدت زمان ۳/۵-۴ ساعت به خوبی جدا شده و سلولهای جداسده کاملاً سالم بودند.


گزیلوں ۱۵-۲۰ دقیقه استفاده گردید (۲۲).

تعیین درصد بقای سلولهای جدا شده برای تعیین درصد بقای سلولهای اپی تلیال جداسده، ۲۵۰ میکرولیتر از تعلیق سلولی با ۳ میلیلیتر بافر فسفات نمکی (PBS) مخلوط و در ۱۵۰۰ دور به مدت ۳ دقیقه سانتریفوژ شد. شستشو با PBS ۲ بار دیگر صورت گرفت. پس از آخرین سانتریفوژ، رسوب سلولی در ۳ میلیلیتر PBS به تعلیق درآمد. یک قطره از تعلیق سلولی با یک قطره تریپان بلو ۴٪ مخلوط گردید. قطره‌ای از مخلوط حاصله روی لام شمارش قرار داده شد. تعداد کل سلولها و سلولهای رنگ شده با تریپان بلو شمارش و درصد بقای سلولها تعیین گردید.

یافته‌ها

جدا سازی و کشت سلولهای اپی تلیال تیموس موش صحرایی با استفاده از آنزیم اکتینیدین برای جداسازی سلولهای اپی تلیال تلیال تیموس، ابتدا بدون تزریق دگزامتازون عمل گردید. اما چون تعداد بسیار زیادی از لنفوسيتها نيز همراه سلولهای اپی تلیال جدا شدند، دگزامتازون را در غلظتها و زمانهای مختلف امتحان کردیم که غلظت ۱ میکروگرم به ازای هر گرم وزن حیوان و ۷۲ ساعت قبل از جداسازی سلول‌ها، برای به حداقل رساندن لنفوسيت‌ها در محیط مناسب بود.

جدا سازی و کشت سلولهای اپی تلیال توسط اکتینیدین در غلظتهاي مختلف (از ۱ تا ۱۰ میلیگرم در میلیلیتر) انجام



شکل ۱: ب) مورفولوژی سلولهای اپی تلیال تیموس موش صحرایی جدا شده به وسیله آنزیم اکتینیدین، ۴۸ ساعت پس از جداسازی (رنگامیزی با روش پاپانیکولا، میکروسکوپ نوری $\times 400$).

هستند و تنها توسط آنزیم‌های کلاژنаз مورد حمله قرار می‌گیرند (۲۳). آنزیمهای کلاژناز در جداسازی انواع سلول‌ها از بافت‌های مختلف مانند قلب، کلیه، کبد، تیموس و بند ناف به کار می‌روند. یکی از این نوع سلولها، سلولهای اپی تلیال تیموس است (۲۴). سلولهای اپی تلیال تیموس، سلولهای چند ضلعی بزرگ با هسته بیضی شکل و کوچک و سیتوپلاسم فراوان هستند. این سلولها اعمال تنظیم‌کنندگی سیستم ایمنی و نورواندکریینی را بر عهده دارند و هورمون‌هایی را ترشح می‌کنند که در بلوغ و تمايز لنفوسيتهاي T نقش دارند، لذا جداسازی و کشت آنها برای خلیص و مطالعه این هورمون‌ها، شناخت و درمان سرطان با استفاده از هورمون‌های تیموسی و مطالعه و درمان بیماریهای مرتبط با سیستم ایمنی مفید خواهد بود (۲۵).

حقیقین برای جداسازی سلولهای اپی تلیال تیموس روشهای مختلفی کشت و مواد کمکی مختلفی را به کار برده‌اند.



شکل ۱: الف) مورفولوژی سلولهای اپی تلیال تیموس موش صحرایی جدا شده به وسیله آنزیم اکتینیدین، بلافاصله پس از جداسازی (میکروسکوپ معکوس $\times 100$).

بررسی تعیین درصد بقای سلولهای جدا شده توسط آنزیم اکتینیدین درصد بقای سلولهای جدا شده (اپی تلیال تیموسی) در شرایط بهینه برای هر نوع سلول توسط تست تریپان بلو و با استفاده از لام نئوبار در تمام آزمونها در دامنه ۹۰-۹۵٪ تخمین زده شد. نتایج نشان داد که سلولهای جدا شده بوسیله آنزیم اکتینیدین، سالم و زنده جدا و قابل کشت هستند و تزریق دگزامتاژون با غلظت ۱ میکروگرم به ازای هر گرم وزن حیوان و غلظت ۴ میلیگرم در میلیلیتر آنزیم اکتینیدین و مدت زمان ۳/۵-۴ ساعت طی یک مرحله برای جداسازی اپی تلیال تیموس موش صحرایی مناسب است.

بحث

کلاژن فراوان ترین پروتئین در بدن پستانداران است که به صورت فیبرهای نا محلول بافت همبندی را قوام میدهد و تقریباً در همه بافت‌ها وجود دارد. فیبرهای کلاژن معمولاً به حمله آنزیم‌های پروتئازی مقاوم

آنژیم پروتئاز نوع X از باکتری باسیلوس ترموپروتئولیتیکوس) و مدت زمان ۳۰ دقیقه استفاده کردند و سلولها را در محیط کشت FHS Williams'E حاوی %۲ انسولین، دگزامتاژون، ترانسفرین و EGF کشت دادند و درصد بقای این سلولها %۸۵-۹۰ تخمین زده شد (۳۲). در همین سال نیز دانشمندان دیگری به طور جدآگانه در این زمینه تحقیقاتی انجام دادند. آنها نیز سلولهای اپی تلیال تیموس را با محلول آنژیم کلاژنаз/ دیسپاز (یک متالوپروتئاز خنثی مشتق شده از باسیلوس پلی میکسا است که فیبرونکتین، کلاژن نوع I و کلاژن نوع IV را میشکند) و مدت زمان ۲۰-۴۰ دقیقه جدا کردند و در محیط کشت Williams'E کشت دادند و برای شناسایی این سلولها از خصوصیات مورفولوژی به علاوه رنگآمیزی ایونوسیتوشیمیایی برای سیتوکراتین استفاده کردند (۳۴ و ۳۵).

در این تحقیق برای جداسازی سلولهای اپی تلیال تیموس موش صحرایی، ما آنژیم اکتینیدین را با غلظت ۴ میلی گرم در ۲/۵-۴ میلی لیتر و مدت زمان ۲ ساعت به کار بردم و سلول های جدا شده را در محیط کشت Williams'E حاوی %۲۰ FCS کشت دادیم. درصد بقای سلولهای جدا شده %۹۰-۹۵ تخمین زده شد که این نتایج با نتایج حاصل از کلاژناز که در این مطالعه و مطالعات دیگر محققین بدست آمده، قابل مقایسه است. در مطالعه حاضر نسبت به مطالعات دیگران که با استفاده از آنژیهای پروتئاز از جمله کلاژناز انجام شده بود، آنژیم

مثلاً در سال ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲، از خرد و له کردن مکانیکی جهت جدا سازی این سلولها از تیموس و برای کشت سلولهای جدا شده از محیط کشت RPMI حاوی %۱۰ استفاده کردند (۲۷ و ۲۸). در سال ۱۹۸۵، برای جدا سازی سلولهای اپی تلیال تیموس، محلول ۰/۳ درصد تریپسین و مدت زمان ۱۰ دقیقه و محیط کشت D-MEM حاوی %۱۰ FCS و پلیتهاي کلاژن دار را به کار برداشت Kurz (۲۸). در سال ۱۹۹۶ همکارانش برای جدا سازی سلولهای اپی تلیال تیموس از تریپسین استفاده کردند و به جای FCS از FHS استفاده کردند. درصد بقای سلولهای جدا شده در این حالت ۹۵ درصد تخمین زده شد (۲۹). در سال ۲۰۰۰ Ferone و همکارانش سلولهای اپی تلیال تیموسی را با استفاده از آنژیم کلاژناز با غلظت ۲ میلی گرم در میلی لیتر و مدت زمان یک ساعت جدا کردند و سلولهای D-MEM جدا شده را در محیط کشت حاوی %۱۰ FCS کشت دادند و درصد بقای این سلولها بوسیله آزمایش تریپان بلو %۹۰ تخمین زده شد (۳۰). در سال ۱۹۹۱، Collc و همکارانش، سلولهای اپی تلیال را بوسیله آنژیم کلاژناز RPMI جدا کردند و در محیط کشت حاوی %۱۵ FCS، دگزامتاژون، انسولین، فاکتور رشد اپی تلیال (EGF) و پلی ال- لیزین کشت دادند. درصد بقای این سلولها %۹۰ گزارش شد (۳۱). در سال ۲۰۰۴ Kikuchi و همکارانش برای جدا سازی این سلولها از آنژیم DNase I و آنژیم لیراز (خلوطی است از آنژیهای کلاژناز نوع I و II از باکتری کلستریدیوم هیستولیتیکوم و

مقدمه ذکر شد و نتایج حاصل از این تحقیق، اکتینیدین، آنزیم مناسبی برای جداسازی سلولهای اپی تلیال موش و احتمالاً سایر حیوانات است و راندمان مطلوبی در این خصوص داشته و فعالیت آن قابل مقایسه با کلژنаз است. بنابراین آنزیم اکتینیدین میتواند جایگزین مناسبی در این زمینه برای کلژناز باشد.

تشکر و قدردانی
با تشکر از خانم اعظم احمدی به خاطر کمک در مراحل اجرایی، آقای دکتر قربانی به خاطر راهنمایی در تشخیص سلولها، آقای شهرام پروانه به خاطر کمک در تهیه مواد و وسایل مورد نیاز و سایر همکاران مرکز تحقیقات بیولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به خاطر همکاری پیداریغ آنها.

اکتینیدین مدت زمان طولانی‌تری بر بافت تیموس اثر داده شد. با این حال نتایج نشان داد که این آنزیم اثر سمی یا تخریبی بر سلولهای اپی از مزیتهاست استفاده از اکتینیدین نسبت به سایر پروتئازها همچون کلژنаз یا تریپسین می‌باشد.

مطالعات و تحقیقات اجسام شده برای جداسازی و کشت سلول‌های اپی تلیال تیموس حاکی از آن است که مطالعه حاضر ظاهر اولین مطالعه‌ای است که برای جداسازی سلولهای اپی تلیال تیموس از آنزیم اکتینیدین میوه کیوی استفاده نموده و مطالعه مشابهی تاکنون در این زمینه گزارش نشده است.

نتیجه‌گیری

بنابراین با توجه به مشکل بودن تخلیص کلژناز که در

References

1. Sun TT, Bonitz P, and Burns WH. Cell culture of mammalian thymic epithelial cells: growth, structural, and antigenic properties. *J Cell Immunol* 1984; 83: 1-13.
2. Ropke C. Thymic epithelial cell culture. *J Microsc Res Tech* 1997; 38: 276-286.
3. Hashimura H, Toyokawa T, Hato F, Oshitani N, Kimura S, and Kinoshita Y. Separation of biologically active polypeptides from rat thymus-epithelial-cell-culture-supernatant by high-performance liquid chromatography. *J Cell Mol Biol* 1987; 33: 375-86.
4. Garaci E, Pica F, Rasi G, and Favalli C. Thymosin alpha1 in the treatment of cancer: from basic research to clinical application. *Int J Immunopharmacol* 2000; 22: 1067-1076.
5. Bodey B, Bodey JB, Siegel SE, and Kaiser HE. Review of thymic hormones in cancer diagnosis and treatment. *Int J Immunopharmacol* 2000; 22: 261-273.
6. Kater L, Osterom R, McClure J, and Goldstein AL. Presence of thymosin-like factors in human thymic epi-thelium conditioned medium. *Int J Immunopharmacol* 1979; 1: 273-284.
7. Pelegri C, Rodriguez-Palmero M, Morante MP, Comas J, Castell M, and Franch A. Comparison of four lymphocyte isolation methods applied to rodent T cell subpopulations and B cells. *J Immunol Methods* 1995; 187: 265-271.
8. Berhanu D, Mortari F, De Rosa SC, and Roederer M. Optimized lymphocyte isolation methods for analysis of chemokine receptor expression. *J Immunol Methods* 2003; 279: 199-207.
9. Juhlin R, and Alm GV. Morphologic and antigenic maturation of lymphocytes in the mouse thymus in vitro. *Scand J Immunol* 1976; 5: 497-503.
10. Figdor CG, Vyth-Dreese FA, Bont WS, Spits H, de Vries JE. Isolation of human thymocytes differing in maturation state and function by centrifugal elutriation. *J Thymus* 1982; 4: 243-256.

11. Culav EM, Clark CH, Merrilees MJ. Connective tissues: matrix composition and its relevance to physical therapy. *J Physic Ther* 1999; 79: 308-319
12. Kleinman HK, klebe RJ, Martin GR. Role of collagenous matrices in adhesion and growth of cells. *Cell Biol* 1981; 88: 473-485.
13. Goldberg Gl, wilhelm SM, Kronberger A, Bauer EA, Grant GA, Eisen AZ. Human fibroblast collagenase. *J Biol Chem* 1989; 261(14): 6600-6605.
14. Boland MJ, Hardman MJ. kinetic studies on thiol protease from *Actinidia Chinesis*. *Febes Lett*. 1972; 27: 282-284.
15. Reid DJ, Hussain S, Bailey TS, Sonkaria S, Sreedharan SK, Thomas EW, and et al. Isomerization of uncomplexed actinin molecule: Kinetic accessibility of additional steps in enzyme catalysis provided by solvent perturbatuion. *J Biochem* 2004; 378: 699-703.
16. Podivinsky E, Forsterl RLS, Gardner RC. Nucleotide sequence of actinin, a kiwifruit protease. *J Nucl Acid Res* 1989; 17: 8363.
17. Ohyama H, Enomoto T, Misunage S. Variety of kiwifruit protease and their collagenolytic activity. *Nippon Eiyo sykuyo Gakkaishi* (in Japanese) 1997; 50: 57-62.
18. Woolley DE, Glanville RW, Roberts DR, and Evanson JM. Purification, characterization and inhibition of human skin collagenase. *J Biochem* 1978; 169: 265-276.
19. Wittstock M, Flemmig TF, Schmidt H, Mutters R, and Karch H. Serodiagnosis of *porphyromonas gingivalis* infection by immunoblot analysis with recombinant collagenase. *J Clin Microbio* 1996; 34: 2411-13.
20. Yoshihara K, Matsushita O, Minami J, and Okabe A. Cloning and nucleotide sequence analysis of the colH gene from *clostridium histolyticum* encoding a collagenase and a gelatinase. *J Bacteriol* 1994; 176: 6489-6496.
- ۲۱- مصطفایی علی، چلبی مریم. اکتینیدین میوه کیوی: خالص سازی و بررسی مقدار آن در واریته های داخلی. *مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی*, سال ۱۳۸۵، شماره ۲۵، صفحات: ۲۲۳-۲۳۰.
22. Bancroft JD. Theory and practice of histological techniques. 5 th ed. 1997. p. 429.
23. Billinghurst RC, Dahlberg L, Ionescu M, Reiner A, Bourne R, Rorabeck C, and et al. Enhanced cleavage of type II collagen by collagenases in osteoarthritic articular cartilage. *J Clin Invest* 1997; 99: 1534-1545.
24. Strom SC, Jirtle RL, Jones RS. Isolation, culture and transplantation of human hepatocytes. *J Nat Cancer Inst* 1982; 68: 771-778.
25. Anderson G, Moore NC, Owen JJ, and Jenkinson EJ. Cellular interactions in thymocyte development. *Annu Rev Immunol* 1996; 14: 73-99.
26. Charles M, Harper JR, and Sharp JG. Evaluation of the morphological and functional characteristics of murine thymic non-lymphoid cells grown in vitro. *J Anat* 1981; 132: 607-625.
27. Savino W, Dardenne M, Papiernik M, Bach JF. Thymic hormone containing cells: characterization and localization of serum thymic factor in young mouse thymus studied by monoclonal antibodies. *J Exp Med* 1982; 156: 628-633.
28. Dhillon DS, and Harvey AL. Acetylcholine receptors of skeletal muscle cells in cultures of rat thymus glands. *J Physiol* 1985; 362: 349-358.
29. Kurz B, von Gaudecker B, Krisch B, and Mentlein R. Rat thymic epithelial cells in vitro and in situ: characterization by immunocytochemistry and morphology. *Cell Tissue Res* 1996; 283: 221-229.
30. Ferone D, Hagen MP, Kwekkeboom DJ, Koetsveld PM, Mooy DM, Lichtenuer-Kaligis E and et al. Somatostatin receptor subtypes in human thymoma and inhibition of cell proliferation by octreotide in Vitro. *J. Clin Endocrinol Metabolism* 2000; 85: 1719-1726.
31. Collc M, Pejnovi N, Kataranovski M, Terzi T, Stojanovi N, and Duji A. Rat thymic epithelial cells in culture constitutively secrete IL-1 and IL-6. *J Int Immunol* 1991; 3: 1165-1174.
32. Kikuchi T, Ichimiya S, Kojima T, Crisai L, Koshiba S, Tonooka A and et al. Expression profiles and functional implications of p53-like transcription factors in thymic epithelial cell subtypes. *J Int Immunol* 2004; 16: 831-841.

33. Gotter J, Brors B, Hergenhahn M, and Kyewski B. Medullary epithelial cells of the human thymus express a highly diverse selection of tissue-specific genes colocalized in chromosomal clusters. *JEM* 2004; 199: 155-166.
34. Chentoufi AA, Palumbo M, and Polychronakos C. Proinsulin expression by hassall's corpuscles in the mouse thymus. *J Diabets* 2004; 53: 354-359.