

Prevalence of fatty liver based on the Fatty Liver Index (FLI) and its association with laboratory findings and obesity-related factors in the Dehgolan cohort

Ali Ahsan Lotfi¹, Farhad Moradpour², Pezhman Sharifi³, Ezzatollah Rahimi⁴, Hakim Khodaei⁵

1. Assistant in Internal Medicine, Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran, ORCID ID: 0009-0008-8316-6562

2. Assistant Professor, Liver and Digestive Research Center, Research Institute for Health Development, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran, ORCID ID: 0000-0002-4449-1978

3. Master of Microbiology, Liver and Digestive Research Center, Research Institute for Health Development, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran, ORCID ID: 0000-0001-7953-9487

4. Associate Professor, Clinical Research Development Unit, Kowsar Hospital, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran, ORCID ID: 0000-0001-7727-2395

5. Assistant Professor, Liver and Digestive Research Center, Research Institute for Health Development, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran, (Corresponding Author), Email: hakim.khodai@gmail.com, Tel: 08733247855, ORCID ID: 0009-0008-9651-0748

ABSTRACT

Background and Aim: Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is recognized as the most common chronic liver disease worldwide. It encompasses a spectrum ranging from simple steatosis to nonalcoholic steatohepatitis (NASH), which may progress to hepatocellular carcinoma. This study aimed to investigate the association between the Fatty Liver Index (FLI)—as a noninvasive marker for detecting fatty liver—and individuals' demographic characteristics, socioeconomic status, and physical activity.

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on 3,996 Iranian participants aged 35 to 70 years who were enrolled in the Dehgolan Cohort Study. Data on demographic characteristics, socioeconomic status, physical activity level, and routine laboratory tests were collected. The Fatty Liver Index was calculated, and its association with the mentioned variables.

Results: Among the participants, 2,248 (56.3%) were male and 1,748 (43.7%) were female. The mean age was 48.33 ± 8.91 years. The mean body mass index (BMI) was 27.99 ± 4.58 , falling within the overweight range. Based on the FLI, 24.8% of individuals were in the normal liver condition, while 43.9% were classified as high-risk. The prevalence of fatty liver based on FLI was significantly higher in men (55.68%) than in women (49%) ($P = 0.000$). A weak but statistically significant positive correlation was observed between FLI and age ($R = 0.079$, $P = 0.000$). The FLI was also significantly associated with education level, marital status, socioeconomic status, employment, weight, waist and hip circumferences, BMI, serum AST and ALT levels, presence of diabetes, gestational diabetes, hypertension, cardiovascular disease, underlying and chronic conditions.

Conclusion: Given the significant associations between FLI and anthropometric indicators related to obesity—such as weight, height, waist and hip circumferences—as well as comorbid conditions including diabetes, hypertension, cardiovascular disease and gestational diabetes, greater attention should be paid to early detection and prevention strategies.

Keywords: Dehgolan cohort, Fatty liver index, Fatty liver, FLI.

Received: Mar 10, 2025

Accepted: Sep 7, 2025

How to cite the article: Ali Ahsan Lotfi, Farhad Moradpour, Pezhman Sharifi, Ezzatollah Rahimi, Hakim Khodaei. Prevalence of fatty liver based on the Fatty Liver Index (FLI) and its association with laboratory findings and obesity-related factors in the Dehgolan cohort. SJKU 2025;30(5): 85-95

Copyright © 2018 the Author (s). Published by Kurdistan University of Medical Sciences. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial License 4.0 (CCBYNC), where it is permissible to download, share, remix, transform, and buildup the work provided it is properly cited. The work cannot be used commercially without permission from the journal

بررسی شیوع کبد چرب بر اساس شاخص کبد چرب (FLI) و ارتباط آن با یافته‌های

آزمایشگاهی و عوامل مرتبط با چاقی در کوهورت دهگلان

علی احسن لطفی^۱، فرهاد مرادپور^۲، پژمان شریفی^۳، عزت‌الله رحیمی^۴، حکیم خدایی^۵

۱. دستیار داخلی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران، کد ارکید: ۶۵۶۲-۸۳۱۶-۰۰۰۸-۰۰۰۹
۲. استادیار، مرکز تحقیقات گوارش و کبد، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران، کد ارکید: ۱۹۷۸-۴۴۴۹-۰۰۰۲-۰۰۰۰
۳. کارشناس ارشد میکروبیولوژی، مرکز تحقیقات گوارش و کبد، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران، کد ارکید: ۹۴۸۷-۷۹۵۳-۰۰۰۱-۰۰۰۰
۴. دانشیار، واحد توسعه تحقیقات بالینی، بیمارستان کوثر، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران، کد ارکید: ۲۳۹۵-۷۷۲۷-۰۰۰۱-۰۰۰۰
۵. استادیار، مرکز تحقیقات گوارش و کبد، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران (نویسنده مسئول)، تلفن: ۰۸۷۳۳۲۴۷۸۵۵، پست الکترونیک: hakim.khodai@gmail.com کد ارکید: ۰۷۴۸-۹۶۵۱-۰۰۰۸-۰۰۰۹

چکیده

زمینه و هدف: در حال حاضر خط اول تشخیصی در سنجش مواد مخدر و به‌ویژه مورفین، اندازه‌گیری غلظت این آلکالوئید با استفاده از تست‌های سرینی (Point of Care Testing, POCT) مواد مخدر در ادرار بیمار است. هدف از این مطالعه محاسبه میزان کارایی این تست در قیاس با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه بر روی نمونه‌های ادرار افراد مشکوک به سوءمصرف مواد مخدر یا بیماران تحت درمان با مورفین، ارجاعی به مراکز آزمایشگاهی بیمارستانی شهرستان سنندج، انجام گرفت. در این مطالعه برای سنجش مورفین در نمونه‌ها همزمان از کیت رایج سرینی مورد استفاده در آزمایشگاه‌های شهرستان سنندج که از روش سنجش ایمنی جریان جانبی (Lateral Flow Immunoassay, LFIA) استفاده می‌کند (شرکت حنان طب پارس، تهران، ایران) و نیز روش HPLC استفاده شد. سپس برای مقایسه دو روش بکار رفته شاخص‌های حداقل میزان تشخیص، حساسیت، ویژگی و کارایی و ... محاسبه شد.

یافته‌ها: حداقل مقدار تشخیص (Limit of Detection, LOD) در روش‌های HPLC و LFIA مورد استفاده در این مطالعه ۳۰۰ ng/ml بود. در قیاس با روش HPLC، حساسیت و ویژگی روش LFIA به ترتیب معادل ۴۲.۶۵٪ و ۶۴٪ بود.

نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر به‌وضوح حاکی از ارزش تشخیصی پایین روش LFIA مورد استفاده در آزمایشگاه‌های شهرستان سنندج است. بالطبع نتایج نادرست به‌دست آمده از این روش بر مدیریت درمان بیمار اثرگذار بوده و می‌تواند نتایج سوئی را به بار بیاورد. روش HPLC راه‌اندازی شده در این مطالعه به‌عنوان روش جایگزین پیشنهاد می‌گردد.

کلمات کلیدی: ایمنو کروماتوگرافی، سوءمصرف مواد مخدر، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا، مورفین.

وصول مقاله: ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ اصلاحیه نهایی: ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

اضافه وزن و چاقی را کاهش دهد (۹). تحقیقات متعدد نشان داده‌اند که حتی فعالیت بدنی متوسط، به‌ویژه در صورت افزایش شدت، مدت و یا دفعات آن، می‌تواند فواید قابل توجهی در بهبود سلامت قلب و عروق و کاهش بیماری‌های متابولیک داشته باشد (۱۰، ۱۱). همچنین، کاهش مدت‌زمان بی‌حرکی و افزایش فعالیت بدنی در سطوح متوسط، با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های کاردیومتابولیک در بزرگسالان مرتبط است (۱۲، ۱۳).

تشخیص NAFLD معمولاً از طریق تصویربرداری غیرتهاجمی انجام می‌شود، اما این روش‌ها قادر به تمایز دقیق بین استئاتوز ساده و NASH نیستند. در نتیجه، بیوپسی کبد همچنان به‌عنوان روش استاندارد تشخیص در نظر گرفته می‌شود (۱۴). با این حال، بیوپسی کبد یک روش تهاجمی، پرهزینه و همراه با ناراحتی برای بیمار است و خطای نمونه‌برداری قابل توجهی دارد (۱۵، ۱۶). ر سال‌های اخیر، شاخص‌ها و الگوریتم‌های غیرتهاجمی برای تشخیص و برآورد شدت بیماری کبد چرب توسعه یافته‌اند. یکی از شناخته‌شده‌ترین این ابزارها، شاخص کبد چرب (Fatty Liver Index - FLI) است که نسبت به بیومارکرهای رایج کبدی دقت بیشتری در پیش‌بینی کبد چرب دارد (۱۷، ۱۸). با وجود این، اطلاعات موجود درباره تأثیر رفتارهای مرتبط با سبک زندگی، به‌ویژه فعالیت بدنی، بر این شاخص محدود است. بهبود درک ما از ارتباط میان FLI و میزان فعالیت بدنی می‌تواند نقش مؤثری در تدوین راهکارهای مشاوره‌ای، مدیریتی و پیشگیرانه در بیماران مشکوک به استئاتوز کبدی ایفا کند. بر همین اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین شاخص کبد چرب (FLI) و میزان فعالیت بدنی، به همراه سایر عوامل جمعیت شناختی و اجتماعی-اقتصادی در کوهورت دهگلان طراحی و اجرا شده است.

مقدمه

بیماری‌های مزمن کبد شامل طیف گسترده‌ای از اختلالات متابولیک، ژنتیکی، عفونی، خود ایمنی و علل ناشناخته هستند که در این میان "بیماری کبد چرب غیرالکلی (Non-alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD)" به‌عنوان شایع‌ترین بیماری مزمن کبد در سراسر جهان شناخته شده است (۱). این بیماری نشان‌دهنده طیفی از بیماری‌های کبدی پیش‌رونده از استئاتوز ساده تا "استئاتوهپاتیت غیرالکلی (Non-alcoholic Steatohepatitis, NASH)" است که امکان دارد به کارسینوم هپاتوسلولار تبدیل شود (۲). شیوع جهانی NAFLD حدود ۲۵.۲٪ برآورد شده و در مناطق خاورمیانه (۳۱.۷۸٪) و آمریکای جنوبی (۳۰.۴۵٪) بالاترین و در آفریقا (۱۳.۴۸٪) کمترین میزان گزارش شده است. همچنین، میزان شیوع آن در آمریکای شمالی، اروپا و آسیا به ترتیب ۲۴.۱٪، ۲۳.۷٪ و ۲۷.۴٪ گزارش شده است. در ایران نیز، مطالعات محدودی در زمینه شیوع و عوامل خطر NAFLD انجام شده است. بر اساس پژوهش‌ها، شیوع این بیماری در جمعیت عمومی بین ۲.۹٪ تا ۷.۱٪ و در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ تا ۵۵.۸٪ گزارش شده است (۳، ۴) افزایش شیوع NAFLD همراه با همه‌گیری چاقی و دیابت نوع ۲ که از عوامل خطر اصلی این بیماری هستند، نگران‌کننده است (۵، ۶).

با وجود پیشرفت در شناخت مکانیسم‌های پاتوفیزیولوژیک بیماری و شناسایی فیروز کبدی به‌عنوان قوی‌ترین پیش‌بینی کننده پیشرفت بیماری، هنوز درمان تأییدشده‌ای برای آن وجود ندارد. در حال حاضر، رویکرد اصلی درمانی شامل مداخلات مبتنی بر سبک زندگی، به‌ویژه کاهش وزن از طریق رژیم غذایی سالم و فعالیت بدنی منظم است (۷) شواهد نشان می‌دهد که اغلب مبتلایان به NAFLD از سطح پایین فعالیت بدنی برخوردارند که این مسئله با افزایش خطر پیشرفت بیماری مرتبط است (۸) فعالیت بدنی منظم می‌تواند خطر بسیاری از پیامدهای نامطلوب مانند فشارخون بالا،

مواد و روش‌ها

طراحی و روش انجام مطالعه

نوع مطالعه

مطالعه حاضر به صورت مقطعی (Cross-sectional) و بر روی شرکت کنندگان مطالعه آینده‌نگر پرشین کوهورت دهگلان (DehPCS) انجام شد.

جامعه مورد مطالعه و معیارهای ورود و خروج

افراد واجد شرایط، دارای سن بین ۳۵ تا ۷۰ سال، تابعیت ایرانی (بر اساس کارت ملی و شناسنامه)، سابقه اقامت حداقل یک سال با دست کم ۹ ماه در سال در شهرستان دهگلان، توانایی برقراری ارتباط با گروه پژوهش و رضایت آگاهانه برای شرکت در مطالعه بودند. افراد دارای مصرف الکل بیش از ۱۴۰ سی سی در هفته برای مردان و بیش از ۷۰ سی سی برای زنان، زنان باردار و مبتلایان به هیپاتیت مزمن یا بیماری‌های خودایمنی کبدی از مطالعه خارج شدند.

بر اساس سرشماری اولیه، حدود ۹۰۰۰ نفر در محدوده سنی هدف در منطقه شهری دهگلان ساکن بودند. از این میان، با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای یک مرحله‌ای و بر اساس تصمیم گروه کوهورت، تعداد ۳۹۹۶ نفر وارد مطالعه شدند. پس از حذف افراد فاقد شرایط لازم، داده‌های نهایی مورد تحلیل قرار گرفتند.

ابزار گردآوری داده‌ها

اطلاعات مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی، وضعیت اجتماعی-اقتصادی، سبک زندگی، عادات فردی، سابقه بیماری‌های زمینه‌ای و میزان فعالیت بدنی از طریق پرسش‌نامه‌های استاندارد کوهورت استخراج شد. اندازه‌گیری‌های آنتروپومتریک شامل قد، وزن، شاخص توده بدنی (BMI) و دور کمر (WC) توسط کارکنان آموزش دیده در حین معاینات پزشکی انجام و ثبت گردید. همچنین، نتایج آزمایش‌های بیوشیمیایی شامل چربی‌های خون و آنزیم‌های کبدی به‌ویژه تری‌گلیسرید (TG) و گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT) ثبت شد.

محاسبه شاخص FLI:

شاخص FLI به‌عنوان یک ابزار غربالگری غیرتهاجمی برای شناسایی استئاتوز کبدی، بر اساس الگوریتمی مشتق شده از BMI، دور کمر، سطح تری‌گلیسرید و GGT محاسبه می‌شود. این شاخص مقداری بین ۰ تا ۱۰۰ دارد. در این مطالعه، مقادیر $FLI \geq 60$ به‌عنوان معیار ابتلا به کبد چرب در نظر گرفته شد و مقادیر $FLI < 30$ به‌عنوان رد بیماری.

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها:

داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل شد. متغیرهای کمی به‌صورت میانگین \pm انحراف معیار و متغیرهای کیفی به‌صورت فراوانی و درصد گزارش شدند. برای بررسی ارتباط بین کبد چرب و متغیرهای جمعیت شناختی از آزمون کای اسکوئر استفاده شد. تحلیل رگرسیون لجستیک برای متغیرهایی مانند سن، جنس، سطح تحصیلات، BMI، وضعیت سیگار کشیدن و میزان فعالیت بدنی جهت شناسایی

$$FLI = \frac{[e^{0.953 \times \log_e(\text{triglycerides})} + 0.139 \times BMI + 0.718 \times \log_e(GGT) + 0.053 \times \text{waist circumference} - 15.745]}{[1 + e^{0.953 \times \log_e(\text{triglycerides})} + 0.139 \times BMI + 0.718 \times \log_e(GGT) + 0.053 \times \text{waist circumference} - 15.745]} \times 100$$

عوامل مؤثر و کنترل عوامل مخدوش‌گر انجام شد. نتایج به‌صورت نسبت شانس (Odds Ratio) همراه با فاصله اطمینان ۹۵ درصد (CI /۹۵) گزارش شد. سطح معناداری کمتر از ۰.۰۵ در نظر گرفته شد.

ملاحظات اخلاقی:

این مطالعه پس از اخذ تأییدیه از کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی کردستان (کد اخلاق: IR.MUK.REC.1401.296، مورخ ۱۷/۰۸/۱۴۰۱) انجام

شد. همه شرکت‌کنندگان پیش از ورود به مطالعه، رضایت‌نامه آگاهانه را امضا کردند. اطلاعات شرکت‌کنندگان به صورت محرمانه نگهداری شد و صرفاً برای اهداف این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. مطالعه مطابق با اصول اخلاقی اعلامیه هلسینکی اجرا گردید و هیچ‌گونه هزینه‌ای متوجه شرکت‌کنندگان نشد.

یافته‌ها

از مجموع ۳۹۹۶ شرکت‌کننده در مطالعه کوهورت دهگلان، ۵۶.۳٪ مرد و ۴۳.۷٪ زن بودند. بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان در گروه سنی ۳۵-۴۰ سال (۴۴.۲٪) قرار داشتند. میانگین سن افراد 48.33 ± 8.91 سال بود. در حدود ۵۲.۷٪ افراد شاغل و ۹۱.۸٪ متأهل بودند (جدول ۱).

جدول ۱. فاکتورهای جمعیت شناختی افراد شرکت‌کننده در مطالعه.

متغیر	جنسیت	فراوانی	درصد
جنسیت	زن	۱۷۴۸	۴۳.۷
	مرد	۲۲۴۸	۵۶.۳
محدوده سنی	۳۵-۴۰	۱۷۶۸	۴۴.۲
	۴۱-۵۰	۱۳۳۴	۳۳.۴
	۵۱-۶۰	۷۱۴	۱۷.۹
	۶۱-۷۰	۱۸۰	۴.۵
وضعیت تأهل	مجرد	۴۴	۱.۱
	متأهل	۳۶۳۶	۹۱.۸
	همسر فوت‌شده	۲۵۰	۶.۳
	همسر جداشده	۲۹	۰.۷
وضعیت اجتماعی اقتصادی	خیلی پایین	۱۰۲۱	۲۶
	پایین	۵۵۶	۱۴.۱
	متوسط	۷۸۶	۲۰
	بالا	۷۹۶	۲۰.۲
وضعیت شغلی	شاغل	۲۰۷۶	۵۲.۷
	بدون شغل	۱۸۶۲	۴۷.۳
	خیلی بالا	۷۷۴	۱۹.۷

وضعیت فاکتورهای جمعیت شناختی را در جدول مشاهده می‌کنیم. از نظر جنسیت، سن، وضعیت تأهل، وضعیت اجتماعی اقتصادی و وضعیت شغلی شرکت‌کنندگان مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

میانگین خواب شبانه شرکت‌کنندگان ۶.۹۵ ساعت در (۶۵ دقیقه)، ورزش هوازی (۲ دقیقه) و ورزش سنگین (۱ دقیقه) بود. همچنین، میانگین زمان تماشای تلویزیون ۱۵۳ دقیقه در روز گزارش شد (جدول ۲).

جدول ۲. فعالیت‌های روزمره افراد شرکت‌کننده در مطالعه.

فعالیت روزمره	میانگین ساعتی	انحراف معیار	میانگین به دقیقه
مدت خواب در ۲۴ ساعت	۶.۹۵	۱.۵۵	۴۱۷
مدت خواب نیمروزی	۰.۸۳	۰.۹۲	۵۰
تماشای تلویزیون	۲.۵۶	۱.۲۶	۱۵۳

۶	۰.۴۱	۰.۱۰	مطالعه
۱۳	۰.۸۶	۰.۲۱	کار پشت میز
۶۵	۰.۹۱	۱.۰۸	پیاده روی
۲	۰.۱۹	۰.۰۳	ورزش هوازی
۱	۰.۱۲	۰.۰۱	ورزش سنگین

وضعیت فعالیت‌های روزمره شرکت کنندگان به صورت زیر است.

در بررسی شاخص‌های آنتروپومتریک، میانگین قد 162.25 ± 9.37 سانتی‌متر، وزن 73.59 ± 12.71 کیلوگرم و BMI برابر با 27.99 ± 4.58 بود. حدود ۲۴.۸٪ افراد دارای BMI نرمال و ۴۲.۸٪ در محدوده اضافه‌وزن قرار داشتند. میانگین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک به ترتیب 110.90 و 69.44 میلی‌متر جیوه بود. اطلاعات کامل پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیکی در جدول ۳ آورده شده است.

جدول ۳. بررسی شاخص‌های آنتروپومتریک و آزمون‌های آزمایشگاهی افراد مورد مطالعه

بیشینه	کمینه	انحراف معیار	میانگین	پاسخگویان	متغیر
۱۹۲.۱۰	۱۳۳.۶۰	۹.۳۷	۱۶۲.۲۵	۳۹۸۰	قد (سانتی‌متر)
۱۳۰.۰۰	۳۵.۰۰	۱۲.۷۱	۷۳.۵۹	۳۹۸۰	وزن (کیلوگرم)
۱۴۴.۱۰	۶۰.۰۰	۱۰.۸۸	۹۷.۲۶	۳۹۴۳	اندازه دور کمر
۱۵۳.۰۰	۷۹.۲۰	۸.۲۳	۱۰۴.۳۹	۳۹۴۳	اندازه دور باسن
۲۳.۲۰	۱۲.۸۰	۱.۳۸	۱۷.۴۵	۳۹۴۲	اندازه دور مچ
۴۹.۰۲	۱۵.۳۵	۴.۵۹	۲۷.۹۹	۳۹۴۳	شاخص توده بدنی
۱۲۵.۰۰	۴۱.۰۰	۹.۹۲	۶۹.۴۴	۳۹۳۱	میانگین فشارخون دیاستولیک
۲۲۵.۰۰	۶۵.۰۰	۱۸.۸۳	۱۱۰.۹۰	۳۹۳۱	میانگین فشارخون سیستولیک
۱۳۲.۰۰	۴۸.۰۰	۹.۲۲	۷۳.۹۴	۳۹۳۱	ضریب قلب
۲۲۳۸.۰۰	۲۸.۰۰	۱۰۰.۸۴	۱۵۵.۷۸	۳۸۵۰	تری‌گلیسرید
۵۱۵.۰۰	۶۷.۰۰	۴۰.۰۰	۱۹۲.۴۷	۳۸۵۱	کلسترول
۱۳۸.۷۰	۲۰.۰۰	۱۱.۰۴	۴۶.۳۲	۳۸۵۱	HDL
۳۷۱.۴۰	۱۲.۴۰	۳۲.۸۵	۱۱۴.۷۲	۳۷۵۷	LDL
۴۲۱.۰۰	۶.۰۰	۹.۹۱	۲۰.۷۱	۳۸۶۷	آنزیم آسپارات آمینو ترانسفراز (SGOT)
۴۹۷.۰۰	۴.۰۰	۱۵.۳۴	۲۲.۶۰	۳۸۶۷	آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (SGPT)
۶۱۳.۰۰	۵.۰۰	۲۱.۵۹	۲۴.۴۸	۳۸۳۵	آنزیم گاما گلو تامیل ترانسفراز (GGT)
۳.۲۵	۰.۳۴	۰.۳۶	۱.۰۴	۳۸۶۷	نسبت AST به ALT
۹۹.۵۶	۰.۹۰	۲۶.۹۵	۵۲.۷۳	۳۷۸۷	شاخص کبد چرب (Fatty Liver Index)

این شاخص‌های کمی به همراه اطلاعات کامل پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیکی در جدول مشاهده می‌شود.

بر اساس شاخص کبد چرب (FLI)، ۲۴.۸٪ از افراد در محدوده پرخطر قرار داشتند (جدول ۴). محدوده کم‌خطر، ۳۱.۳٪ در محدوده متوسط و ۴۳.۹٪ در

جدول ۴. رده‌بندی شاخص کبد چرب (FLI) در افراد مورد مطالعه.

سطح	فراوانی	درصد	درصد معتبر
کم خطر FLI < 30	۹۴۱	۲۳.۵	۲۴.۸
متوسط FLI < 60 ≥ 30	۱۱۸۵	۲۹.۷	۳۱.۳
پرخطر FLI ≥ 60	۱۶۶۱	۴۱.۶	۴۳.۹
کل	۳۷۸۷	۹۴.۸	۱۰۰

افراد مورد مطالعه از نظر فراوانی شاخص کبد چرب به صورت جدول زیر بودند

میزان FLI در مردان به طور معناداری بالاتر از زنان بود (۵۵.۶۸٪ در مقابل ۴۹.۰۰٪، $P < 0.001$). همچنین، افراد متأهل و بدون شغل به طور معناداری FLI بالاتری نسبت به مجردها و افراد شاغل داشتند ($P < 0.001$) (جدول ۵).

جدول ۵. ارتباط بین شاخص کبد چرب با عوامل جمعیت شناختی.

فراوانی	میانگین	انحراف معیار	مقدار t	P
زن	۴۹.۰۰	۲۷.۱۳	۷.۶۳	۰.۰۰۰
مرد	۵۵.۶۸	۲۶.۴۵		
مجرد	۴۴.۰۰	۲۴.۳۴	۴.۹۸	۰.۰۰۰
متأهل	۵۲.۶۲	۲۶.۸۸		
بدون شغل	۵۶.۰۱	۲۶.۲۷	۷.۷۹	۰.۰۰۰
شاغل	۴۹.۲۲	۲۷.۲۳		

میزان FLI در مردان به طور معناداری بالاتر از زنان بود. افراد متأهل و بدون شغل به طور معناداری FLI بالاتری نسبت به مجردها و افراد شاغل داشتند

همبستگی مثبت و معناداری میان سن و شاخص FLI مشاهده شد ($P < 0.001$ ، $r = 0.079$)، اما ارتباط با وضعیت اقتصادی-اجتماعی معنادار نبود ($r = 0.01$)، $P = 0.48$ (جدول ۶).

جدول ۶. ارتباط شاخص کبد چرب با سن و وضعیت اقتصادی اجتماعی.

سن	همبستگی	مقدار t	P
سن	همبستگی	۰.۰۷۹	۰.۰۰۰
وضعیت اقتصادی اجتماعی	معداری	۳۷۸۷	۰.۰۱
	فراوانی	۴۸.۰	۳۷۶۶

همبستگی مثبت و معناداری میان سن و شاخص FLI مشاهده شد ولی این شاخص با وضعیت اقتصادی-اجتماعی دارای ارتباط معنادار نبود

همبستگی مثبت قوی و معناداری بین FLI با وزن ($r = 0.817$) و BMI وجود داشت ($P < 0.001$) همچنین، دور کمر ($r = 0.824$)، دور باسن ($r = 0.693$) و مقادیر FLI با سطح تری گلیسرید ($r = 0.509$)، آنزیم‌های

کبدی (r = 0.229) SGPT و (r = 0.081) SGOT رابطه معنادار داشتند. در مقابل، همبستگی معکوس بین FLI با HDL (r = -0.144) و نسبت AST/ALT (r = -0.357) مشاهده شد (جدول ۷).

جدول ۷. ارتباط بین شاخص کبد چرب و متغیرهای آنتروپومتریک و بیوشیمیایی.

شاخص کبد چرب (FLI)			متغیر
فراوانی	معناداری	همبستگی پیرسون	
۳۷۸۷	۰.۰۰۱	-۰.۱۰۹	قد (سانتی متر)
۳۷۸۷	۰.۰۰۱	۰.۷۰۲	وزن (کیلوگرم)
۳۷۸۷	۰.۰۰۱	۰.۸۲۴	اندازه دور کمر
۳۷۸۷	۰.۰۰۱	۰.۶۹۳	اندازه دور باسن
۳۷۸۶	۰.۰۰۱	۰.۵۱۷	اندازه دور میچ
۳۷۸۷	۰.۰۰۱	۰.۸۱۷	شاخص توده بدنی
۳۷۶۳	۰.۰۰۱	۰.۲۹۸	میانگین فشارخون دیاستولیک
۳۷۶۳	۰.۰۰۱	۰.۲۷۸	میانگین فشارخون سیستولیک
۳۷۶۳	۰.۰۰۱	۰.۱۹۵	ضربان قلب
۳۷۸۶	۰.۰۰۱	۰.۲۰۱	قند خون
۳۷۸۷	۰.۰۰۱	۰.۵۰۹	تری گلیسرید
۳۷۸۷	۰.۰۰۱	۰.۲۸	کلسترول
۳۷۸۷	۰.۰۰۱	-۰.۱۴۴	HDL کلسترول
۳۶۹۵	۰.۰۰۱	۰.۱۰۱	LDL کلسترول
۳۷۸۷	۰.۰۰۱	۰.۰۸۱	آنزیم آسپاراتات آمینو ترانسفراز (SGOT)
۳۷۸۷	۰.۰۰۱	۰.۲۲۹	آنزیم آلانین آمینو ترانسفراز (SGPT)
۳۷۸۷	۰.۰۰۱	۰.۳۱۹	گاما گلو تامیل ترانسفراز
۳۷۸۷	۰.۰۰۱	-۰.۳۵۷	نسبت AST به ALT

همبستگی مثبت قوی و معناداری بین FLI با وزن، دور کمر، دور باسن و BMI وجود داشت. مقادیر FLI با سطح تری گلیسرید، آنزیم‌های کبدی SGPT و SGOT رابطه معنادار داشتند. در مقابل، همبستگی معکوس بین FLI با HDL و نسبت AST/ALT مشاهده شد.

افراد مبتلا به دیابت، فشارخون بالا، بیماری قلبی و دارای بیماری‌های زمینه‌ای، مقادیر FLI بالاتری نسبت به سایرین داشتند (P < 0.001) (جدول ۸).

جدول ۸. ارتباط شاخص کبد چرب با وجود بیماری‌های زمینه‌ای.

P	مقدار t	انحراف معیار	میانگین	فراوانی		
۰.۰۰	۹.۲۹	۲۷.۰۴	۵۱.۱۷	۳۲۶۸.۰۰	خیر	ابتلا به دیابت
		۲۳.۹۰	۶۳.۰۳	۵۰۳.۰۰	بلی	
۰.۰۰	۱۲.۷۰	۲۶.۷۹	۵۰.۰۶	۳۰۳۳.۰۰	خیر	ابتلا به فشارخون بالا
		۲۴.۶۷	۶۳.۸۲	۷۳۸.۰۰	بلی	
۰.۰۰	۴.۴	۲۶.۸۲	۵۲.۲۴	۳۴۸۲.۰۰	خیر	ابتلا به بیماری قلبی
		۲۷.۷۵	۵۸.۹۰	۲۸۹.۰۰	بلی	

۰.۰۱	۱۰.۶۷	۲۶.۷۸	۴۸.۶۴	۲۱۰۰.۰۰	خیر	داشتن بیماری‌های زمینه‌ای
		۲۶.۲۵	۵۷.۹۳	۱۶۷۱.۰۰	بلی	
۰.۵۴	۰.۶۱	۲۶.۹۵	۵۲.۷۳	۳۷۴۰.۰۰	خیر	وجود بیماری سرطان
		۲۶.۰۲	۵۵.۷۱	۳۱.۰۰	بلی	

افراد مبتلا به دیابت، فشارخون بالا، بیماری قلبی و دارای بیماری‌های زمینه‌ای، مقادیر FLI بالاتری نسبت به سایرین داشتند

بحث

جنوبی، Ebenezzer، Zakerkish، Rasool و Zhang

همخوانی دارد.

بررسی داده‌های بیوشیمیایی نشان داد که میانگین غلظت چربی‌های خون در محدوده نرمال قرار دارد، اما برخی شاخص‌ها نظیر کلسترول تام و تری‌گلیسیرید نزدیک به محدوده هشدار هستند و نیاز به پایش دارند. میانگین شاخص کبد چرب (FLI) برابر ۵۲.۷۳ بود؛ ۴۳.۹٪ از شرکت‌کنندگان در محدوده پرخطر قرار داشتند. اختلاف معنادار بین مردان و زنان در شاخص FLI نشان‌دهنده اهمیت توجه به تفاوت‌های جنسیتی در سیاست‌گذاری‌های بهداشتی است.

یافته‌ها نشان دادند که افزایش سن با افزایش شاخص FLI همبستگی ضعیفی دارد. این یافته با روند طبیعی کاهش فعالیت بدنی و تغییرات متابولیکی در سنین بالا هم‌راستا است. همچنین، وضعیت اقتصادی-اجتماعی با FLI ارتباط معناداری نداشت، درحالی‌که افراد فاقد شغل، شاخص بالاتری داشتند که می‌تواند ناشی از سبک زندگی کم‌تحرک، استرس و الگوهای تغذیه‌ای ناسالم باشد.

همبستگی بسیار قوی بین شاخص FLI و متغیرهایی مانند وزن ($r = 0.702$)، دور کمر ($r = 0.824$)، دور باسن ($r = 0.693$) و BMI ($r = 0.817$) مشاهده شد که بیانگر نقش کلیدی چاقی و چاقی شکمی در بروز NAFLD است. همچنین، قد با شاخص FLI همبستگی منفی ضعیفی داشت ($r = -0.109$)، یافته‌ای که نیازمند بررسی بیشتر است.

سطوح آنزیم‌های ALT و AST با FLI ارتباط مثبت معناداری داشتند که مطابق انتظار و مرتبط با آسیب‌های سلولی کبدی در NAFLD است. افراد مبتلا به دیابت،

مطالعه حاضر بر روی ۳۹۹۶ فرد بزرگسال ایرانی (۳۵ تا ۷۰ ساله) در قالب مطالعه کوهورت پرشین دهگلان (DehPCS) انجام شد. ترکیب جنسیتی نسبتاً متعادلی داشت، هرچند مردان سهم بیشتری را تشکیل می‌دادند. میانگین سنی ۴۸.۳۳ سال، نشان‌دهنده غالب بودن گروه میانسال در جمعیت مطالعه است، یافته‌ای که با مطالعاتی نظیر Ebenezzer در برزیل و Cuthbertson در فنلاند همخوانی دارد، ولی با مطالعه Zhang در چین که میانگین سنی شرکت‌کنندگان آن پایین‌تر بود، تفاوت دارد. این اختلاف می‌تواند ناشی از تفاوت‌های جمعیت شناختی و جغرافیایی باشد.

اکثر شرکت‌کنندگان متأهل بودند که می‌تواند بیانگر ساختار سنتی خانواده و نقش پررنگ ازدواج در فرهنگ منطقه باشد. وضعیت اقتصادی-اجتماعی بیشتر افراد در سطح پایین یا متوسط قرار داشت که نشان‌دهنده ضرورت توجه به مداخلات چندبُعدی در حوزه سلامت عمومی است. همچنین، نسبت بالای افراد فاقد شغل (۵۲.۷٪) ممکن است بازتابی از چالش‌های بازار کار، نرخ بیکاری یا سن بالای برخی از شرکت‌کنندگان (بازنشستگان) باشد.

سبک زندگی شرکت‌کنندگان نیز دارای ویژگی‌های هشداردهنده بود. میانگین خواب شبانه ۶.۹۵ ساعت و خواب نيمروزی حدود ۵۰ دقیقه بود که می‌تواند با اختلالات متابولیک و افزایش خطر بیماری کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) مرتبط باشد. همچنین، فعالیت بدنی پایین در این جمعیت (میانگین پیاده‌روی روزانه ۶۵ دقیقه، فعالیت هوازی ۲ دقیقه) از دیگر عوامل مستعد کننده بیماری‌های متابولیک به شمار می‌رود. این یافته‌ها با مطالعات Choi در کره

ناشی از اپیدمی این ویروس، طی روند تصویب و اجرای آن مخصوصاً در ابتدای انجام این طرح اشاره نمود.

نتیجه گیری

یافته‌های این پژوهش نشان داد که شاخص کبد چرب (FLI) با عوامل متعددی از جمله شاخص توده بدنی (BMI)، وزن، دور کمر، دور باسن و نیز ابتلا به بیماری‌هایی مانند دیابت، پرفشاری خون، بیماری قلبی و بیماری‌های زمینه‌ای ارتباط معناداری دارد. بر این اساس، ضرورت دارد که در سیاست‌های سلامت عمومی، غربالگری منظم این عوامل در جمعیت‌های در معرض خطر مدنظر قرار گیرد. همچنین انجام مطالعات آینده‌نگر و مداخلاتی با رویکرد دقیق‌تر و جزئی‌تر برای بررسی مکانیسم‌های این ارتباط‌ها و طراحی برنامه‌های پیشگیری و درمانی هدفمند، توصیه می‌شود.

تشکر و قدردانی

از دانشگاه علوم پزشکی کردستان، بابت حمایت مالی از این پایان‌نامه که با کد اخلاق IR.MUK.REC.1401.296 در این دانشگاه مصوب شد و مقاله حاضر از آن مستخرج شده است، تشکر و قدردانی می‌شود. لازم به ذکر است که هیچ‌کدام از نویسندگان این مطالعه، افراد و یا دستگاه‌ها تعارض منافی برای انتشار این مقاله ندارند.

فشارخون بالا و بیماری‌های قلبی نیز شاخص FLI بالاتری داشتند که نشان‌دهنده نقش این بیماری‌ها به‌عنوان عوامل خطر همراه است. این نتایج در مطالعات Rafeian، Cuthbertson و سایر منابع نیز تأیید شده‌اند.

اگرچه ارتباط مستقیمی بین شاخص FLI و سرطان یافت نشد، اما یافته‌هایی مانند افزایش FLI در افراد مبتلابه بیماری‌های مزمن (دیابت، پرفشاری، اختلالات تیروئیدی) اهمیت مدیریت چندبعدی بیماری‌ها را در پیشگیری از آسیب‌های کبدی تقویت می‌کند.

در مجموع، مطالعه حاضر برای نخستین بار در ایران به بررسی دقیق شاخص کبد چرب و ارتباط آن با متغیرهای مختلف جمعیت شناختی، رفتاری و آزمایشگاهی در یک نمونه بزرگ پرداخته و یافته‌های نوآورانه‌ای را ارائه کرده است. این نتایج می‌توانند مبنای طراحی مداخلات بهداشتی و مطالعات آینده با رویکردهای دقیق‌تر اپیدمیولوژیک و بیوشیمیایی باشند.

از نقاط قوت و مزایای این مطالعه می‌توان به نوآوری در بسیاری از موضوعات و اهداف موردبررسی آن و تعداد بالای جامعه آماری با توجه به نوع این مطالعه که از افراد شرکت‌کننده مطالعه هم‌گروهی (کوهورت) دهگلان استفاده شد اشاره نمود. از محدودیت‌های این مطالعه نیز، می‌توان به کاهش سرعت انجام مطالعه و پیشبرد اهداف آن، با توجه به شیوع ویروس کرونا و مشکلات و چالش‌های

منابع

1. Clark JM. The epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease in adults. *Journal of clinical gastroenterology*. 2006;40:S5-S10.
2. Erickson SK. Nonalcoholic fatty liver disease. *Journal of lipid research*. 2009;50:S412-S6.
3. Moghaddasifar I, Lankarani K, Moosazadeh M, Afshari M, Ghaemi A, Aliramezany M, et al. Prevalence of non-alcoholic fatty liver disease and its related factors in Iran. *International journal of organ transplantation medicine*. 2016;7(3):149.
4. Bellentani S, Scaglioni F, Marino M, Bedogni G. Epidemiology of non-alcoholic fatty liver disease. *Digestive diseases*. 2010;28(1):155-61.
5. Polyzos SA, Kountouras J, Mantzoros CS. Obesity and nonalcoholic fatty liver disease: From pathophysiology to therapeutics. *Metabolism*. 2019;92:82-97.

6. Targher G, Bertolini L, Padovani R, Rodella S, Tessari R, Zenari L, et al. Prevalence of nonalcoholic fatty liver disease and its association with cardiovascular disease among type 2 diabetic patients. *Diabetes care*. 2007;30(5):1212-8.
7. Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, Charlton M, Cusi K, Rinella M, et al. The diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease: practice guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases. *Hepatology*. 2018;67(1):328-57.
8. Byambasukh O, Zelle D, Corpeleijn E. Physical activity, fatty liver, and glucose metabolism over the life course: the lifelines cohort. *Official journal of the American College of Gastroenterology | ACG*. 2019;114(6):907-15.
9. Wen CP, Wai JPM, Tsai MK, Yang YC, Cheng TYD, Lee M-C, et al. Minimum amount of physical activity for reduced mortality and extended life expectancy: a prospective cohort study. *The lancet*. 2011;378(9798):1244-53.
10. Lloyd-Jones DM, Hong Y, Labarthe D, Mozaffarian D, Appel LJ, Van Horn L, et al. Defining and setting national goals for cardiovascular health promotion and disease reduction: the American Heart Association's strategic Impact Goal through 2020 and beyond. *Circulation*. 2010;121(4):586-613.
11. Archer E, Blair SN. Physical activity and the prevention of cardiovascular disease: from evolution to epidemiology. *Progress in cardiovascular diseases*. 2011;53(6):387-96.
12. Renninger M, Hansen BH, Steene-Johannessen J, Kriemler S, Froberg K, Northstone K, et al. Associations between accelerometry measured physical activity and sedentary time and the metabolic syndrome: A meta-analysis of more than 6000 children and adolescents. *Pediatric obesity*. 2020;15(1):e12578.
13. Carson V, Tremblay MS, Chaput J-P, Chastin SF. Associations between sleep duration, sedentary time, physical activity, and health indicators among Canadian children and youth using compositional analyses. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*. 2016;41(6):S294-S302.
14. Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, Diehl AM, Brunt EM, Cusi K, et al. The diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease: Practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases, American College of Gastroenterology, and the American Gastroenterological Association. *Hepatology*. 2012;55(6):2005-23.
15. Ratziu V, Charlotte F, Heurtier A, Gombert S, Giral P, Bruckert E, et al. Sampling variability of liver biopsy in nonalcoholic fatty liver disease. *Gastroenterology*. 2005;128(7):1898-906.
16. Bravo AA, Sheth SG, Chopra S. Liver biopsy. *New England Journal of Medicine*. 2001;344(7):495-500.
17. Koehler EM, Schouten JN, Hansen BE, Hofman A, Stricker BH, Janssen HL. External validation of the fatty liver index for identifying nonalcoholic fatty liver disease in a population-based study. *Clinical Gastroenterology and Hepatology*. 2013;11(9):1201-4.
18. Bedogni G, Bellentani S, Miglioli L, Masutti F, Passalacqua M, Castiglione A, et al. The Fatty Liver Index: a simple and accurate predictor of hepatic steatosis in the general population. *BMC gastroenterology*. 2006;6:1-7.