

The COVID-19 Pandemic and Noncommunicable Disease Service Delivery: an Overview of Global Experiences

Ahad Bakhtiari¹, Amirhossein Takian^{2,3,1}, Masoud Behzadifar⁴, Fatemeh Hosseinpour^{5,6}, Hakimeh Mostafavi⁷

1. Ph.D. of Health Policy, Health Equity Research Centre (HERC), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
ORCID ID: 0000-0003-3580-9259

2. Professor, Department of Health Management, Policy and Economics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. (Corresponding author), T: +98(021)42933225 E: takian@tums.ac.ir. ORCID ID: 0000-0001-7806-5558

3. Professor, Department of Global Health and Public Policy, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 0000-0001-7806-5558

4. Assistant Professor, Social Determinants of Health Research Center, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran. ORCID ID: 0000-0002-0271-4360

5. MSc, Department of Economic Sciences, West Tehran Branch, Payame Noor University, Tehran, Iran. ORCID ID: 0000-0002-0543-9528

6. MSc, National Center for Health Insurance Research, Tehran, Iran ORCID ID: 0000-0002-0543-9528.

7. Ph.D. of Health Policy, Health Equity Research Centre (HERC), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
ORCID ID: 0000-0002-1969-7341

ABSTRACT

Background and Aim: Since the discovery of the SARS-Cov-2 coronavirus on December 30, 2019, in China, and the declaration of the COVID-19 pandemic on March 11, 2020, healthcare systems and economies around the world have faced unprecedented challenges. The impact of the crisis on non-communicable diseases and the delivery of related services, which could lead to a second crisis, has been a particular source of concern. We review the world's experience in this area here.

Materials and Methods: This is a systematic review of studies related to the effects of COVID-19 pandemic and non-communicable diseases (NCDs) on each other, and its impact on provision of related healthcare services for NCDs, carried out in 2021 by defining search keywords and database including PubMed / MEDLINE / ISI / Web of Sciences (WOS) and Scopus.

Results: 625 articles were found in the first search, that 98 duplicate ones were removed. Following a review of the article titles, 216 studies were removed as well. The abstracts of the articles were then reviewed, and 139 items were removed too. Finally, the study included 81 articles that met the previously mentioned criteria. The studies' findings were divided into seven groups: increased disease severity, decreased referrals to medical centers, decreased care delivery, increased anxiety and depression, decreased diagnosis of diseases, reduced elective surgeries, and strategies used to provide services to patients.

Conclusion: A review of country policies and experiences and the loss of thousands of human resources in the field of health during the Covid-19 pandemic crisis showed that country governance systems should prioritize capacity building and updating action plans to deal with similar crises. In the meantime, a resilient national program for the prevention and effective fight against NCDs, as the most important cause of death of citizens that is also preventable, and its uninterrupted implementation during crises of the health system is of fundamental importance.

Keywords: COVID-19, non-communicable diseases (NCDs), service delivery, Pandemic, health system, systematic review.

Received: July 29, 2021

Accepted: Jan 5, 2022

How to cite the article: Ahad Bakhtiari, Amirhossein Takian, Masoud Behzadifar, Fatemeh Hosseinpour, Hakimeh Mostafavi. The COVID-19 Pandemic and Noncommunicable Disease Service Delivery: an Overview of Global Experiences .*SJKU* 2021;26(6):98-118.

where it is permissible to download, share, remix, transform, and buildup the work provided it is properly cited. The work cannot be used commercially without permission from the journal

همه‌گیری کووید ۱۹ و ارائه خدمات بیماری‌های غیرواگیر؛ مروری بر تجربیات جهان

احد بختیاری^۱، امیرحسین تکیان^{۱،۲}، مسعود بهزادی‌فر^۳، فاطمه حسین‌بور^۴، حکیمه مصطفوی^۵

۱. دکترای سیاست‌گذاری سلامت، مرکز تحقیقات عدالت در سلامت (HERC)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. کد ارکید: ۹۲۵۹-۳۵۸۰-۳۵۸۰.....
۲. استاد، گروه مدیریت، سیاست‌گذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. ۰۰۰-۷۸۰۶-۵۵۵۸.....
۳. استاد، گروه سلامت جهانی و سیاست‌گذاری عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)، تلفن: ۰۲۱-۴۲۹۳۳۲۲۵، ایمیل: takian@tums.ac.ir کد ارکید: ۵۵۵۸-۷۸۰۶-۰۰۰۰.....
۴. استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران. کد ارکید: ۴۳۶۰-۰۲-۰۲۷۱-۰۰۰۰-۰۰۰۰.....
۵. کارشناسی ارشد، گروه علوم اقتصادی، دانشگاه پامنور واحد تهران غرب، تهران، ایران. کد ارکید: ۹۵۲۸-۰۵۴۳-۰۰۰۰-۰۰-۰۰.....
۶. کارشناسی ارشد، مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، تهران، ایران. کد ارکید: ۹۵۲۸-۰۵۴۳-۰۰۰۰-۰۰-۰۰.....
۷. دکترای سیاست‌گذاری سلامت، مرکز تحقیقات عدالت در سلامت (HERC)، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. کد ارکید: ۷۳۴۱-۱۹۶۹-۰۲-۰۰۰۰-۰۰-۰۰.....

چکیده

زمینه و هدف: از زمان شناسایی ویروس کرونا (SARS-CoV-۲) در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۹ در چین و به دنبال اعلام همه‌گیری بیماری COVID-۱۹ در ۱۱ مارس ۲۰۲۰ توسط سازمان جهانی سلامت، ظرفیت و انعطاف‌پذیری نظام سلامت و مجموعه اقتصاد کشورها با چالش‌های بی سابقه‌ای روپرورد شده است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، تأثیرات بحران ناشی از کووید ۱۹ بر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر و استمرار ارائه خدمات مرتبط با آن بوده است که خود می‌تواند بحران‌های دیگری نیز ایجاد نماید. در این مطالعه، به مرور تجربیات کشورهای گوناگون جهان در این زمینه پرداخته شده است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه یک مرور نظام مند از مطالعات مرتبط با برهم‌کنش بحران همه‌گیری کووید ۱۹ بر بیماری‌های غیرواگیر و ارائه خدمات مرتبط با این دسته از بیماری‌ها می‌باشد که با تعریف کلیدوازه‌های جستجو در پایگاه‌داده علمی شامل Scopus، ISI / Web of Sciences (WOS)، PubMed / MEDLINE و مقالات بین ۳۰ دسامبر ۲۰۱۹ تا ژانویه ۲۰۲۱ در سال ۱۳۹۹ انجام شد.

یافته‌ها: در جستجوی اولیه، تعداد ۶۲۵ مقاله شناسایی شد و تعداد ۹۸ مورد تکراری حذف شد. پس از مرور عنوانین مقالات، تعداد ۲۱۶ مطالعه خارج شدند. در گام بعدی، چکیده مقالات بررسی و ۱۳۹ مورد حذف شد و در نهایت تعداد ۸۱ مقاله بر اساس معیارهای ذکر شده قبلی وارد مطالعه گردید. یافته‌های مطالعات مورد بررسی در هفت مقوله شامل افزایش شدت بیماری، کاهش مراجعه به مراکز درمانی، کاهش ارائه خدمات درمانی، افزایش اضطراب و افسردگی، کاهش تشخیص بیماری‌ها، کاهش جراحی‌های الکتیو و راهکارهای مورد استفاده برای ارائه خدمت به بیماران طبقه‌بندی شدند.

نتیجه‌گیری: مرور سیاست‌ها و تجربه‌های کشورها و نظام‌های سلامت جهان و جان‌باختن هزاران نفر از منابع انسانی حوزه سلامت طی بحران همه‌گیری کووید-۱۹، خاطرنشان می‌سازد که ظرفیت‌سازی و بهروزرسانی برنامه‌های اقدام کشورها در برخورد با بحران‌های محتمل مشابه باشی در دستور کار نظام‌های حاکمیتی کشورها قرار گیرد. در این میان، برنامه ملی تاب‌آور و اجراء‌پذیر جهت پیشگیری و مبارزه مؤثر با بیماری‌های غیرواگیر، به عنوان مهم‌ترین دلیل مرگ‌ومیر شهروندان که قابل پیشگیری نیز هست، و اجرای بی‌وقفه آن در طی بحران‌های نظام سلامت اهمیت بنیادین دارد.

کلمات کلیدی: کووید ۱۹، بیماری‌های غیرواگیر، ارائه خدمت، همه‌گیری، نظام سلامت، مرور نظام مند.

وصول مقاله: ۱۴۰۰/۵/۷ اصلاحیه نهایی: ۱۴۰۰/۱۰/۸ پذیرش: ۱۴۰۰/۱۰/۱۵

مقدمه

غیرواگیر را به خود اختصاص داده‌اند و به دنبال آن سرطان‌ها (۹,۰ میلیون نفر)، بیماری‌های تنفسی (۳,۹ میلیون نفر) و دیابت (۱,۶ میلیون نفر) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. چهار زیرگروه بیماری‌های اشاره شده به همراه مهم‌ترین عوامل خطرزای آنها یعنی تغذیه ناسالم، فعالیت بدنی ناکافی، مصرف دخانیات و استفاده مضر از الکل مهم‌ترین تعیین‌کننده‌های مرگ‌ومیر و بار بیماری‌های غیرواگیر هستند (۱). همه گیری COVID-19 با بسیج منابع به سوی مبتلایان به این بیماری باعث غفلت نظام‌های سلامت از نیازهای حیاتی افراد دارای بیماری غیرواگیر شده است. از سوی دیگر، ترس از ابتلا به بیماری و هشدارهای مداوم رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در مورد خطر مضاعف COVID-19 برای افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای باعث عدم مراجعت به موقع این بیماران به مراکز درمانی و درنتیجه بدتر شدن وضعیت بیماری آنان شده است.

مطالعات نشان می‌دهند بیماری‌های غیرواگیر ممکن است خود عامل اصلی پس‌زمینه‌ای مرگ‌ومیر و بستری در بخش مراقبت‌های ویژه در بین بیماران COVID-19 باشند. همچنین شواهد نشان می‌هد که افرادی که با بیماری‌های غیرواگیر زندگی می‌کنند یا از آنها متاثر شده اند، در معرض ابتلا به علائم شدید بیماری COVID-19 قرار دارند، اختلال یا بیماری قبلی با نرخ مرگ و میر بیشتر در ابتلا به بیماری COVID-19 همراه است، به طوری که در عین حال که نرخ کلی مرگ و میر در مطالعه‌ای ۲,۳ درصد بود، این میزان برای مبتلایان با سابقه بیماری‌های قلبی و عروقی ۱۰,۵٪ دیابت ۷,۳٪؛ بیماری تنفسی مزمن ۶,۳٪؛ فشارخون بالا ۶٪ و سرطان ۵,۶٪ بوده است (۴-۲).

مواجهه کشورها با بحران همه گیری کوید ۱۹ نظام‌های سلامت جهان را با چالش‌های بسیاری روپرور کرده است. علی‌رغم اینکه بخش عمده ظرفیت نظام‌های سلامت به پاسخ‌دهی به این بحران اختصاص‌داده شده است اما ظرفیت پاسخ‌دهی از نظر کمبود تأمین مالی، نیروی انسانی و تخت‌ها و تجهیزات بیمارستانی (۱, ۳) پاسخ‌گوی حجم ورودی

از هنگام شناسایی ویروس کرونا SARS-Cov-2 در ۳۰ دسامبر ۲۰۱۹ در چین و به دنبال اعلام همه گیری بیماری ناشی از کووید ۱۹ در ۱۱ مارس ۲۰۲۰ توسط سازمان جهانی سلامت، ظرفیت و انعطاف‌پذیری نظام سلامت و مجموعه اقتصاد کشورها در سراسر جهان برای مبارزه با بحران ناشی از اپیدمی با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روپرور شده است (۱). تا ۲۸ ژانویه سال ۲۰۲۱، بیش از ۱۰۰ میلیون بیمار COVID-19 به طور قطعی شناسایی شده اند، با تلاش‌های نظام‌های سلامت ۵۵,۴ میلیون نفر از موارد قطعی؛ بهبود یافته اند و متاسفانه علی‌رغم این تلاشهای گسترده بیش از ۲,۱۶ میلیون نفر جان خود را از دست داده اند. COVID-19 و پیامدهای ویرانگر آن بعنوان بزرگ‌ترین چالش ناگهانی همه کشورها پس از جنگ جهانی دوم توصیف شده است، این همه گیری با تضعیف اقتصاد جهانی و فشار بر نظام‌های سلامت، بسیاری از کشورها را به زانو در آورده است (۱).

پیش از شروع همه گیری کرونا و همچنین هم‌زمان با آن، نظام‌های سلامت در بسیاری کشورهای جهان از جمله ایران، پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر را به عنوان کشنده‌ترین دسته بیماری‌ها در قرن ۲۱ و در راستای نیل به توسعه پایدار سلامت آغاز کرده بودند (۲). هفتاد و یک درصد از کل علل مرگ‌ومیر جهانی که رقمی بیش از ۴۱ میلیون مرگ سالانه را در بر می‌گیرد، با بیماری‌های غیرواگیر و عوامل خطر آنها مرتبط است. از سوی دیگر، مرگ‌ومیرهای زودرس (سنین ۳۰ تا ۶۹ سال) یکی دیگر از چالش‌های بیماری‌های غیرواگیر می‌باشد که سالانه ۱۵ میلیون مرگ زودرس را به کشورها، به‌ویژه کشورهای با درآمد کم و متوسط که سهمی ۸۰ درصدی از این مرگ‌های زودرس را دارند، تحمیل می‌کند. شصت و دو درصد (۲,۵ میلیارد) سال‌های ازدست‌رفته در نتیجه‌ی مرگ زودرس یا سپری شده با معلولیت و ناتوانی در سال ۲۰۱۷ به بیماری‌های غیرواگیر منتسب است. بیماری‌های قلبی عروقی با ۱۷ میلیون نفر مرگ سالانه، بیشترین مرگ و میر مرتبط با بیماری‌های

مستقل چندین پایگاهداده علمی شامل / PubMed و ISI / Web of Sciences (WOS) و MEDLINE Scopus را بین ۳۰ دسامبر ۲۰۱۹ تا زانویه ۲۰۲۱ در بین منابع انگلیسی زبان جستجو کردند. استراتژی جستجو پس از مشورت با خبرگان و درک اهداف مورد نظر تعریف شد:

TITLE-ABS (hypertension OR diabetes OR diabetic OR asthma OR "dental Care" OR cancer OR cardiovascular OR "Noncommunicable diseases" OR ncds OR overweight OR obesity OR hyperglycemia OR hyperlipidemia OR "chronic lung disease" OR "heart disease" OR stroke OR "ischemic heart disease" OR "Coronary artery disease" OR "Chronic obstructive pulmonary disease" OR copd OR "Chronic obstructive lung disease" OR "chronic kidney disease" OR ckd OR depression OR anxiety) AND TITLE-ABS ("health-care needs" OR "Service delivery" OR "care delivery" OR "services availability" OR "services accessibility" OR "services readiness" OR respond OR "providing services" OR "newly diagnosed" OR "Disruption of services" OR "Inpatient services" OR "Insufficient staff" OR "medical diagnostics" OR medicines OR unavailability OR "medical care" OR "essential health services" OR "resuming health services") AND TITLE-ABS ("COVID-19" OR coronaviruses OR "novel coronavirus" OR "coronavirus disease" OR "severe acute respiratory syndrome coronavirus 2" OR "SARS-CoV-2" OR covid OR pandemic OR pandemics) from 2019/11/1 - 2021/1/31

فهرست مرجع هر مقاله واجد شرایط نیز برای مطالعات بالقوه مرتبط بررسی شد و اختلافات با بحث و گفتگو میان پژوهشگران حل گردید. گزارش های سازمان جهانی سلامت و سایر سازمان های جهانی فعال در حوزه بیماری های غیر واگیر از جمله NCD Alliance و Knowledge Action Portal (KAP) برای بیماری های غیر واگیر نیز به عنوان سایر منابع جستجو شدند.

معیارهای ورود و خروج به مطالعه

تنها مقالات به زبان انگلیسی که به اثرات اپیدمی-COVID-19 بر بیماری های غیر واگیر و سیاست های اتخاذی برای

بیماران مبتلا به COVID-19 بوده و کشورها را در اوج گیری تعداد مبتلایان با چالش مواجه کرده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه ظرفیت قابل توجهی از بیمارستان ها به بیماران کرونایی اختصاص یافته است و مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی برای سلامتی افراد دارای بیماری های زمینه ای غیر واگیر و سایر مراجعه کنندگان جهت دریافت خدمات روتین خطرزا بوده است؛ دسترسی میلیون ها انسان نیازمند مراقبت های اورژانسی و روتین برای کنترل و درمان بیماری های غیر واگیر در سراسر جهان با چالشی جدی روبرو شده است (۶، ۵).

بر این اساس و با توجه به اهمیت ارزیابی وضعیت دریافت خدمات در افراد دارای بیماری غیر واگیر در دوران همه گیری COVID-19، در این مقاله به مرور اثرات بحران همه گیری COVID-19 بر خدمات روتین بیماری های غیر واگیر در سراسر جهان پرداخته ایم. همچنین فهرست قابل استنادی از سیاست های اتخاذ شده کشورهای گوناگون جهان که در مقالات و گزارش ها به آنها اشاره شده است، پدید آورده ایم تا سیاست گذاران و تصمیم گیران بتوانند در بحران های مشابه، اقدامات مناسب و مؤثری برای بهبود، حفظ و ارتقا وضعیت سلامت عموم جامعه و افرادی که با بیماری های غیر واگیر زندگی می کنند یا از آنها متأثر شده اند، اتخاذ نمایند.

مواد و روش ها

این مطالعه شامل مرور جامع باهدف شناسایی و فهرست کردن اثرات همه گیری کووید ۱۹ بر ارائه خدمت به بیماران متأثر از بیماری های غیر واگیر و تجربیات سیاست های اتخاذی در پاسخ به این شرایط می باشد که بر اساس مراحل زیر انجام پذیرفته و بر اساس چک لیست PRISMA گزارش شده است.

مرور پیشینه پژوهش:

این مرور بر مبنای رهنمودهای فراتحلیل مطالعات مشاهده ای در اپیدمیولوژی (MOOSE) انجام شد. دو نویسنده به طور

بنابراین موارد فنی و استانداردها به علت حجم بسیار زیاد در جدول یافته‌ها ذکر نشدند. شماره منبع در جدول ذکر شده است تا کارشناسان برای بررسی بیشتر به آنها مراجعه کنند (جدول ۱). مطالعه در آذرماه ۱۳۹۹ آغاز و در بهمن ماه ۱۳۹۹ پایان یافت، تمام مطالعات مورد بررسی در سال‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ انتشار یافته‌اند. مهم‌ترین یافته‌های حاصل از مرور مطالعه‌ها در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است:

کاهش مراجعه به مراکز درمانی:

ترس ناشی از ابتلا به کرونا به طور چشمگیری باعث کاهش مراجعه به مراکز درمانی جهت دریافت داروها و خدمات روتین شده است. به عنوان نمونه، به دلیل ترس از ابتلا به کرونا بیماران کلیوی دیالیز خود را به تعویق انداخته‌اند، میزان مراجعه برای بستری و گرفتن خدمت سرپایی بیماران کلیوی کاهش داشته است و علی‌رغم اثربخشی مشاوره‌های آنلاین، این خدمات توسط تعداد اندکی دریافت شده است (۷). در کره جنوبی، علی‌رغم اینکه بخش تریاژ بیماران کرونایی را از سایر بیماران جدا کردند و هیچ بیمار سلطانی مبتلا به کرونا نشد، اما میزان مراجعه نسبت به دوره مشابه کاهش داشت و مراجعه کنندگان به نسبت در مرحله پیش‌فته‌تری از بیماری بودند (۸). دو مطالعه گذشته‌نگر در ایتالیا و آمریکا نشان داد که بیماران با علائم اولیه سکته قلبی به دلیل پاندمی و ناآگاهی و ترس از شرایط به وجود آمده از COVID-19 به نسبت سایر دوران میزان و مدت درد بیشتری را تحمل می‌کرده‌اند تا به مرحله معرفی خود به مراکز درمانی برسند (۹). تحلیل‌ها از کاهش تعداد افراد مراجعه‌کننده برای دریافت خدمات حیاتی بیماری‌های قلبی و عروقی و همچنین تأخیر در دریافت خدمات حکایت دارد. در کانادا و چین، علاوه‌بر آن که مرگ‌ومیر در بخش اورژانس برای سندرم حاد کرونر (ACS) از ۲,۶۹ درصد در دوره قبل از COVID به ۷,۲۷ در دوره پس از محدودیت‌های اپیدمی افزایش یافته است، بر اساس مطالعه مقطعی انجام شده ازین ارائه کنندگان خدمات مرتبط با سکته مغزی در ۵۵ کشور مشخص شده است که گیرندگان خدمت جهت دریافت خدمات به مقدار کمتری

استمرار ارائه خدمات به افراد متأثر از بیماری‌های غیرواگیر پرداخته بودند، وارد مطالعه شدند. از آنجایی که تجربیات کشورهای مختلف در این مطالعه دارای اهمیت بود، مطالعات مشابه در کشورهای مختلف حذف نگردید و وارد مطالعه شد. گزارش‌ها و نامه به سردبیر حذف شدند. برهم‌کنش بالینی بیماری‌های غیرواگیر بر شدت بالاتر عوارض در بیماران COVID-19 به علت تفاوت با هدف این مطالعه از معیارهای خروج در نظر گرفته شد.

ارزیابی کیفی مطالعات

برای بررسی کیفیت مطالعات وارد شده به مطالعه از ابزار ارزیابی ریسک سوگیری کوکران برای مداخلات مطالعات غیرتصادفی (ACROBAT-NRSI) استفاده شد.

استخراج اطلاعات:

نام خانوادگی نویسنده اول، سال انتشار، کشور، نوع بیماری و ارائه خدمت مرتبط، مهم‌ترین اثرات همه گیری بر تداوم ارائه خدمت و سیاست‌های مرتبط با دوران همه گیری در گروه‌های مختلف بیماری‌های غیرواگیر، گروه سنی و جنسی، جمعیت هدف، و نوآوری‌های صورت گرفته جهت حفظ ارائه خدمات سلامت در دوران همه گیری از جمله مواردی بود که توسط دو نفر از نویسنده‌گان به طور جداگانه از مطالعات استخراج شد. سایر پژوهشگران (سه نفر دیگر) نیز در مرحله ادغام یافته‌های دو محقق، ابهامات و مغایرت‌ها را رفع کردند.

یافته‌ها

در جستجوی اولیه، تعداد ۶۲۵ مقاله شناسایی شد و تعداد ۹۸ مورد تکراری حذف شد. پس از مرور عناوین مقالات، تعداد ۲۱۶ مطالعه خارج شدند. در گام بعدی، چکیده مقالات بررسی و ۱۳۹ مورد حذف شد و در نهایت تعداد ۸۱ مقاله بر اساس معیارهای ذکر شده قبلی وارد مطالعه گردید. همچنین تعداد هفت مورد از گزارش‌های جهانی مرتبط بررسی شدند که تنها یک مورد وارد مطالعه گردید (نمودار ۱). در بخش نتایج سعی شد باهدف آشناسازی سیاستگذار با حیطه‌های مداخلات مؤثر به اقدامات کلی انجام شده اشاره شود؛

و یا مراکز با سطح ارائه مراقبت ایمن پایینی به ارائه خدمت مشغول بوده‌اند. مطالعه‌ای که در امریکای مرکزی و جنوبی جهت بررسی اثرات اپیدمی بر افراد دیابتی انجام شد نشان داد اکثر کشورها نتوانستند خدمات مناسبی به جامعه دیابتی خود ارائه دهند.

کاهش جراحی‌های الکتیو:

به دلیل ریسک بالای ابتلا به بیماری، در برخی از کشورها جراحی‌های الکتیو مرتبط با چاقی و متابولیک در دوران اوج همه‌گیری منوع شدند.

کاهش تشخیص بیماری‌ها:

مطالعه‌ای در کشور ترکیه نشان داد که تفاوت معناداری در تعداد بیماران تشخیص‌داده شده سرطانی در قبل و بعد از همه‌گیری وجود دارد، نزدیک به بیش از ۲۵٪ تشخیص کمتری در مقایسه با دوران پیش از شیوع کرونا گزارش شده است، همچنین در دوران اپیدمی و محدودیت‌های قرنطینه، مراجعه و دسترسی افراد برای غربالگری سرطان روده بزرگ کاهش یافته است.

افزایش اضطراب و افسردگی:

عموم مردم، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، مبتلایان و کسانی که عزیزان خود را از دست داده‌اند، در این دوران نیاز شدیدی به مراقبت‌های روانپزشکی داشته‌اند که به نظر می‌رسد برآورده نشده است، در عین حال افرادی که به دلیل اپیدمی شغل خود را از دست داده‌اند، شرایطی مشابه افسردگی و اضطراب را تجربه کرده‌اند. با کاهش خدمات در دسترس در هنگامه اپیدمی، مراقبان خانگی از بیماران دچار زوال عقل با سطح اضطراب و افسردگی بالایی روپروردند، بیماران نیازمند خدمات ضروری در کشورهای مختلف مانند بیماران سرطانی و قلبی - عروقی در خصوص مواردی همچون دسترسی به خدمت و دارو، مراجعه به مراکز ارائه‌دهنده، جایه‌جایی بین محل اقامت و درمان، آموزش‌های همراهان در دوران اپیدمی دچار اضطراب و استرس بالایی بودند، نوجوانان چینی دارای حد پایین حمایت اجتماعی در دوران همه‌گیری از سطح بالاتر اضطراب و افسردگی برخوردار

مراجعه کرده‌اند، در ایالات متحده آمریکا و سنگاپور از بین مراجعین به مراکز به علت دیابت، تعداد افراد کتواسیدوز دیابتی افزایش داشته که نشان‌دهنده تأخیر در مراجعه و اخذ خدمت در زمان اپیدمی است، ترس از ابتلا به بیماری COVID-19 در مراکز درمانی باعث شده ۳۰٪ از بیماران تنفسی مزمن برای اخذ خدمت به مراکز ارائه‌دهنده مراجعه نکنند.

افزایش شدت بیماری یا عامل خطر:

عدم مراجعه به بیمارستان‌ها و نیز عدم ارائه خدمات کافی از سوی مراکز درمانی در مدت قرنطینه باعث وخیم تر شدن سلامتی برخی از بیماران شده است. نتایج مطالعه‌ای در هندستان نشان داد در طول ۴۵ روز محدودیت شدید قرنطینه، افزایش مصرف کربوهیدرات، کاهش ورزش، کاهش پایش قند خون و فشار روانی گستره در بیماران دیابتی ثبت شده است، همچنین به علت شرایط قرنطینه اجباری در کلمبیا مشخص شد که بیش از ۷۵٪ از کودکان موردمطالعه در شرایط قرنطینه میزان فعالیت فیزیکی توصیه شده سازمان جهانی سلامت را انجام نمی‌دهند.

کاهش ارائه خدمات درمانی:

کرونا در بسیاری از کشورها باعث بسیج منابع به‌سوی این همه‌گیری و درنتیجه غفلت از سایر بیماری‌ها شد. مطالعه‌ای با پرسشنامه مبتنی بر اینترنت در کشورهای اروپایی و افریقاًی نشان داد که ارائه خدمت برای سرطان لوزالمعده و متاستازهای کبدی در دوران اپیدمی به شدت آسیب‌دیده است. نظرسنجی از متخصصان انکولوژی در ۷۰ کشور جهان کاهش دسترسی به خدمات و درمان به‌موقع و داروها در زمان اپیدمی خبر می‌دهد. در ووهان چین از ۲۴ بیمار تنها ۲ بیمار درمان اولیه مرتبط به سرطان سروگرد را دریافت کرده بودند، آن هم بدون ارزیابی اثربخشی که از نتایج اپیدمی و محدودیت‌های قرنطینه سخت سه ماهه بود، در عین حال مطالعه دیگری نشان داد بیش از ۵۰ درصد مراکز مرتبط به علت همه‌گیری ظرفیت ارائه خدمت به تمام افراد را نداشتند

خدمات تسکینی مهیا کرد و رضایت آنها را در دوران همه گیری افزایش داد. در چنین خدماتی میزان رضایتمندی بیمار و ارائه کننده بیش از ۹۰ درصد گزارش شده و در عین حال چالش‌هایی نیز در برداشته است (۱۲). معاینه و مشاوره مبتنی بر تلفن در عربستان سعودی برای افراد دارای علائم بیماری قلبی ضمن اینکه دسترسی به خدمات را در دوران منوعیت عبور و مرور افزایش داد، غربالگری اولیه افراد دارای علائم را به نحو قابل رضایتی به پیش برد. همچنین پرستاری از راه دور برای نوجوانان مبتلا به دیابت باعث شد این گروه از جامعه به خدمات دسترسی داشته باشند و همچنین هیچ گونه عارضه‌ای طی این نوع از ارائه خدمت دیده نشد. پژوهشی از راه دور فرصتی را برای ارزیابی، تشخیص و حتی نظارت بر بیماران قلبی و عروقی پس از ترجیح در صورت نیاز به حفظ فاصله گذاری فیزیکی فراهم نمود. ارسال دارو از طریق پست، مشاوره‌های دارویی آنلاین از خدمات داروسازان در دوران همه گیری به بیماران کلیوی بود. مشاوره‌های آنلاین؛ مطالعه مورد شاهدی در کانادا نشان داد که استفاده از شیوه‌های الکترونیک و دیجیتال و از راه دور، ارائه خدمات به جمعیت و بیمارانی که در دوران همه گیری نیازمند دریافت خدمات هستند، دسترسی را در دوره‌های بحرانی بدون افت کیفیت افزایش می‌دهد (۱۳).


بودند (۱۰). شیوع بالایی از ناراحتی‌های روان‌شناختی در میان جمعیت عمومی در اوج شیوع COVID-۱۹ در چین وجود دارد که با تاب‌آوری رابطه منفی دارد. تاب‌آوری روان‌شناختی یک هدف اساسی برای مداخله روان‌شناختی در موارد بحران‌های بهداشت عمومی است، بر اساس نظرسنجی از والدین کودکان دارای بیماری مزمن تنفسی، اضطراب و نگرانی‌های شدید والدین و کودکان و اختلال در دریافت مراقبتها از مهم‌ترین عوارض اپیدمی بیان شد (۱۱).

راهکارهای مورد استفاده

هر چند در ماه‌های آغازین بروز همه گیری کرونا غفلت از سایر بیماران باعث کاهش ارائه خدمات و بدتر شدن وضعیت سلامت برخی از این بیماران شد اما بسیاری از کشورها بلافضله اقدام به استفاده از راهکارهای خلاقانه برای ارائه خدمات به بیماران بهویژه افراد دارای بیماری‌های غیرواگیر نمودند.

افزایش استفاده از خدمات از راه دور؛ پژوهشی از راه دور در صورت ایجاد پشتیبانی فنی در مناطق و جمعیت‌های کمتر توسعه یافته می‌تواند شاخص‌های عدالت در دسترسی به خدمات را بهبود دهد. خدمات از راه دور مبتنی بر گوشی‌های هوشمند، خدمات تسکینی از جمله تجویز مسکن‌ها، مشاوره‌ها، سؤالات تداخل دارویی را برای بیماران گیرنده

نمودار ۱. فرایند بازیابی و انتخاب مطالعات



نمودار ۱. فرایند بازیابی و انتخاب مطالعات

جدول ۱. مهم‌ترین یافته‌های مقالات وارد شده به مطالعه

رفرنس	منطقه / کشور	حساس متأثر از - COVID	نوع بیماری / جمعیت	مهم‌ترین نکات متداوم و یافته‌ها
۱۹	(۱)	کشور جهان	میزان پاسخگویی نظامهای سلامت جهان به نیازهای بیماری‌های غیرواگیر در دوران COVID-19	در سه سطح کم، متوسط و شدید همه گیری به ترتیب خدمات ۳۹٪، ۵۷٪ و ۶۶٪ کشورها برای مدیریت فشارخون بالا مختل شده بود. خدمات ۳۳٪، ۵۳٪ و ۶۴٪ از کشورها برای درمان دیابت و عوارض مرتبط مختل شده بود. خدمات ۳۹٪، ۴۶٪ و ۵۶٪ کشورها خدمات برای درمان سرطان مختل شده بود. خدمات ۲۲٪، ۴۶٪ و ۶۱٪ از کشورها برای درمان موارد اضطراری قلبی و عروقی مختل شده بود. مهم‌ترین دلایل اختلال لغو شدن خدمات الکترونیکی، متوقف شدن برنامه‌های غربالگری جمعیت، منع رفت و آمد به دلیل محدودیت‌های قرنطینه‌ای، اختصاص نیروی انسانی غیرواگیر به همه گیری، تعطیلی کلینیک‌های مشاوره‌های اختصاصی بیماری‌های غیرواگیر، نیرو و زیرساخت‌های ناکافی، نبود تخت و عدم مراجعت بیماران تعیین شده است. نزدیک به ۶۶٪ از کشورها بیماری‌های غیرواگیر را در برنامه اپیدمی خود گنجانده بودند.
(۱۴-۱۶، ۷)	هندوستان	بیماران کلیوی / افراد اهداکننده و دریافت‌کننده کلیه و امور دیالیز، بیماری مزمن کلیه (CKD)	بیماران کلیوی / افراد اهداکننده و دریافت‌کننده کلیه و امور دیالیز، بیماری مزمن کلیه (CKD)	پیگیری درمان و دریافت خدمات در ۶۰ درصد از بیماران کلیوی مطالعه شده در چین با تأخیر مواجه و یا نامنظم شده بود. کشور انگلستان راهنمای ارائه مراقبت از بیماران کلیوی و اهداکننده و دریافت‌کننده کان عضو (کلیه) را بر اساس مواردی همچون استمرار ارائه خدمت، آموزش نیروی انسانی تخصصی مرتبط، جداسازی مراکز و یا واحدهای ارائه خدمت، آموزش‌های خودمراقبتی، کاهش انتظار بیماران در فضای بیمارستانی در حین طی کردن فرایند گرفتن خدمت را برای دوران همه گیری تهیه کرده است. ارسال دارو از طریق پست، مشاوره‌های دارویی آنلاین از خدمات داروسازان در دوران همه گیری به بیماران کلیوی بود. به دلیل ترس از ابتلا به کرونا بیماران کلیوی دیالیز خود را به تعویق اندخته‌اند، میزان مراجعت برای بستری و گرفتن خدمت سرپایی بیماران کلیوی کاهش داشته است. مشاوره‌های آنلاین علی‌رغم اثربخشی توسط تعداد اندکی دریافت شده است.

جراحی‌های الکتیو مرتبط با چاقی و متاپولیک در دوران اوج همه‌گیری منع شدند. انجمن جراحان با شروع فروکش کردن اپیدمی، مجموعه اقدامات و توصیه‌هایی را به اطلاع مراکز ارائه‌دهنده خدمات رسانده‌اند، از جمله فرایندهای انتخاب بیماران، فرایند پیش، حین و پس از پذیرش بیماران، پروتکل‌های جراحی و آموزش‌های نیروی انسانی اتفاق عمل.

در طول ۴۵ روز محدودیت شدید قرنطینه، افزایش مصرف کربوهیدرات، کاهش ورزش، کاهش پایش قند خون و فشار روانی گستردہ در بیماران دیابتی ثبت شده است.

به علت شرایط قرنطینه اجباری در کلمبیا مشخص شد که بیش از ۷۵٪ از کودکان موردمطالعه در شرایط قرنطینه میزان فعالیت فیزیکی توصیه شده سازمان جهانی سلامت را انجام نمی‌دهند، مهم‌ترین سیاست پیشنهادی این مطالعه آموزش‌های متناسب با شرایط قرنطینه برای افراد است.

بر اساس بررسی انجام شده سبک زندگی (اضطراب، فعالیت بدنه، تغذیه) افراد دارای سابقه خانوادگی کلسترول خون بالا در دوران اپیدمی تغییرات نامطلوبی داشته است. پژوهشی از راه دور و مشاوره، و آموزش‌های مبنی بر رسانه‌های اجتماعی سیاست‌های پیشنهادی جهت مقابله می‌باشد.

مطالعه قبل و بعد بحران کرونا در هفت منطقه فقیرنشین نشان داد که به دلایل اقتصادی و شرایط ارائه‌دهنده‌گان خدمات در این مناطق و عدم درنظر گرفتن روش‌های نوین ارائه خدمت در این مناطق، دریافت خدمات مرتبط با فشارخون بالا، بیماری‌های تنفسی، مراقبت‌های زایمان، چاقی، آسم، بیماری‌های قلبی و سکته کاهش محسوسی یافته بود. مشاوره از راه دور به افراد دارای پرونده در این مراکز از جمله پیشنهادهای این مطالعه بود.

مراکز بهداشت و اجد شرایط فدرال ایالات متحده که سالانه به بیش از ۲۲ میلیون از افراد کم درآمد فاقد بیمه ارائه خدمت می‌کند، مجموعه سیاست‌های پیشنهادی خود در مناطق تحت تأثیر قرار گرفته از اپیدمی را شامل غربالگری، تشخیص، پیگیری و حمایت طلبی و سیاستگذاری مرتبط با جمعیت کم درآمد با بودجه‌های اختصاصی پیشنهاد کرده است.

پژوهشی از راه دور در صورت ایجاد پشتیبانی فنی در مناطق و جمعیت‌های کمتر توسعه یافته می‌تواند شاخص‌های عدالت در دسترسی به خدمات را بهبود دهد.

مطالعه‌ای در کشور ترکیه نشان داد که تفاوت معناداری در تعداد بیماران تشخیص داده شده در قبل و بعد از همه‌گیری وجود دارد نزدیک به بیش از ۳۵٪/ تشخیص کمتر ناشی از عدم مراجعت و کاهش مدت زمان دوره درمان از ۱۷ روز به ۱۱ روز. همچنین کیفیت زندگی بیماران سلطانی به دلایل اضطراب‌های ناشی از پاندمی کاهش یافته بود.

مطالعه مرکز پرتو درمانی استرالیا مجموعه تجربیات این مرکز که سیاست‌های کاهش خطر در چهار حیطه برنامه‌ریزی نیروی کار، ارتباط نیروی کار، اینمنی و سلامتی بیمار، اینمنی و رفاه کارکنان در شرایط اپیدمی پیشنهاد داده است.

سبک زندگی، فعالیت فیزیکی،

تغذیه، چاقی / افراد متقاضی

هندوستان، کلمبیا، ترکیه

جراحی الکتیو مرتبط با چاقی،

فعالیت بدنی، کودکان

(۱۷-۲۰)

عدالت / جمعیت فقیرنشین و

درایافت خدمات سلامت غیر

هفت محله فقیرنشین در

بنگلادش، کنیا، نیجریه و

کرونا وی

عدالت در سلامت / سلطان

پاکستان

ایالات متحده آمریکا

کلور کیال

(۲۱-۲۳)

سرطان‌ها، تشخیص و درمان

تسکینی بیماران سلطانی، سلطان

ترکیه، استرالیا، اروپا و آفریقا،

هندوستان، ۷۰ کشور، چین،

ایتالیا، ایران، ترکیه / ۳۰ کشور،

لوزالمعده و متاستازهای کبدی،

سرطان سرو گردن، سلطان روده

کره جنوبی، انگلستان، اتریش

برزیل، تیروئید، سلطان‌های

(۲۴-۴۰, ۱۲, ۳)

<p>مطالعه با پرسش نامه مبتنی بر اینترنت در کشورهای اروپایی و افریقایی نشان داد که ارائه خدمت برای سرطان لوزالمعده و متاستازهای کبدی در دوران اپیدمی به شدت آسیب دیده است.</p> <p>خدمات از راه دور مبتنی بر گوشی های هوشمند، خدمات تسکینی از جمله تجویز مسکن ها، مشاوره ها، سؤالات تداخل دارویی را برای بیماران گیرنده خدمات تسکینی مهیا کرد و رضایت آنها را در دوران همه گیری افزایش داد. در چنین خدماتی میزان رضایتمندی بیمار و ارائه کننده بیش از ۹۰ درصد گزارش شده و در عین حال چالش هایی نیز در برداشته است.</p> <p>نظرسنجی از متخصصان انکولوژی در ۷۰ کشور جهان کاهش دسترسی به خدمات و درمان به موقع و داروها در زمان اپیدمی خبر می دهد. در ووهان چین از ۲۴ بیمار تنها ۲ بیمار درمان اولیه مرتبط به سرطان سرو گردن را دریافت کرده بودند، آن هم بدون ارزیابی اثربخشی که از نتایج اپیدمی و محدودیت های قرنطینه سخت ۳ ماهه بود. در نظرسنجی از متخصصان سرطان ۳۰ کشور جهان، بیش از ۴۰ توصیه به ارائه دهنده گان جهت استمرار خدمت در دوران اپیدمی پیشنهاد شد.</p> <p>در دوران اپیدمی و محدودیت های قرنطینه، مراجعه و دسترسی افراد برای غربالگری سرطان روده بزرگ کاهش یافته است. در عین حال پس از رفع اپیدمی و محدودیت های قرنطینه؛ جهت تشخیص هرچه سریع تر و میزان مراجعه افزایش یافته احتمالی باستی مراکز را مجهز کرد.</p> <p>این مطالعه مروری با بررسی راهنمای ارائه شده پر امون انواع سرطان های زنان در مراحل گوناگون، مجموعه سیاست های پالینی محور را برای فرایندهای تشخیص و درمان سرطان های زنان در دوران همه گیری پیشنهاد کرده است.</p> <p>در نظرسنجی انجام شده از متخصصان سرطان های زنان در ترکیه با توجه به وضعیت پاندمی در مراحل تشخیص، درمان، باز توانی و پایش بیماران مجموعه توصیه هایی برای ارتقا ارائه خدمات مناسب با بحران اپیدمی ارائه شده است.</p> <p>مراقبت های تسکینی مرتبط با بیماران سرطانی به میزان بیشتری به نسبت سایر مراقبت ها کاهش یافته است.</p> <p>تصاویر تهیه شده پوست با درموسکوپ را می توان بدون حضور متخصص در اتاق اورژانس به راحتی بررسی کرد تا از تأخیر بی مورد در تشخیص بیماری های پوستی انکولوژیک جلوگیری شود.</p> <p>در کره جنوبی، علی رغم اینکه بخش تریاژ بیماران کرونایی را از سایر بیماران جدا کردن و هیچ بیمار سرطانی مبتلا به کرونا نشد، اما میزان مراجعه نسبت به دوره مشابه کاهش داشت و مراجعه کننده گان به نسبت در مرحله پیشرفته تری از بیماری بودند.</p> <p>فلوچارت های فرایندی در انگلستان در همه گیری راهنمای عمل نیروی انسانی سلامت در فاز های پذیرش، تشخیص، درمان و پیگیری و باز توانی بیماران سرطانی بوده اند.</p>	<p>مریبوط به زنان، از جمله سرطان دهانه رحم، پستان، تخدمان،</p> <p>مریبوط به زنان، از جمله سرطان دهانه رحم، پستان، تخدمان،</p>
---	---

مطالعه مورد شاهدی در کانادا نشان داد که استفاده از شیوه‌های الکترونیک و دیجیتال و از راه دور، ارائه خدمت به جمعیت و بیمارانی که در دوران همه‌گیری نیازمند دریافت خدمات هستند، دسترسی را در دوره‌های بحرانی بدون افت کیفیت افزایش می‌دهد.

در ایتالیا مشخص شد که افراد مبتلا به صرع مصرف کننده داروهای ضدتشننج و اضطراب، در دوران همه‌گیری به وسیله دریافت خدمات از راه دور مدیریت بهتری بر شرایط مزمن خود داشته‌اند.

با کاهش خدمات در دسترس در هنگامه اپیدمی، مراقبان خانگی از بیماران دچار زوال عقل با سطح اضطراب و افسردگی بالایی رویرو شدند. حمایت و آموزش از مراقبان خانگی سیاست پیشنهادی مطالعه بود.

عموم افراد، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای، مبتلایان و کسانی که عزیزان خود را ازدستداده‌اند، در این دوران نیاز شدیدی به مراقبت‌های روپیزشکی داشته‌اند که به نظر می‌رسد برآورده نشده است. در عین حال افرادی که به دلیل اپیدمی شغل خود را ازدستداده‌اند، شرایط مشابه افسردگی و اضطراب را تجربه کرده‌اند.

کارکنان حوزه سلامت به خصوص پزشکان و پرستاران در دوران اپیدمی با حد بالای اختلال اضطراب رویرو بوده‌اند. بیماران نیازمند خدمات ضروری در کشورهای مختلف مانند بیماران سلطانی و قلبی - عروقی در خصوص مواردی همچون دسترسی به خدمت و دارو، مراجعه به مراکز ارائه‌دهنده، جایه‌جایی بین محل اقامت و درمان، آموزش‌های همراهان در دوران اپیدمی دچار اضطراب و استرس بالایی بودند.

نوجوانان چینی دارای حد پایین حمایت اجتماعی در دوران همه‌گیری از سطح بالاتر اضطراب و افسردگی برخوردار بودند.

شیوع بالایی از ناراحتی‌های روان شناختی در میان جمعیت عمومی در اوج شیوع COVID-۱۹ در چین وجود دارد که با تاب آوری رابطه منفی دارد. تاب آوری روان شناختی یک هدف اساسی برای مداخله روان شناختی در موارد بحران‌های بهداشت عمومی است.

دو مطالعه گذشته‌نگر در ایتالیا و آمریکا نشان داد که بیماران با عالم اولیه سکته قلبی به دلیل پاندمی و ناآگاهی و ترس از شرایط به وجود آمده از COVID-19 به نسبت سایر دوران میزان و مدت درد بیشتری را تحمل می‌کردند تا به مرحله معرفی خود به مراکز درمانی برستند. تفاوتی نزدیک به ۴۰٪، مهم‌ترین سیاست پیشنهادی این مطالعه آگاهی رسانی به مردم و اطمینان دادن از ارائه خدمت اینم ذکر شده است.

معاینه و مشاوره مبتنی بر تلفن در عربستان سعودی برای افراد دارای عالم بیماری قلبی ضمن اینکه دسترسی به خدمات را در دوران ممنوعیت عبور و مرور افزایش داد، غربالگری اولیه افراد دارای عالم را به نحو قابل رضایتی به پیش برد. بحران همه‌گیری، جراحی‌های الکتیو را در ترکیه محدود کرد. برای کودکان دارای بیماری قلبی مادرزادی، در مواردی به تأخیر انداختن عمل ممکن نبود در این مطالعه خدمات با امکان به تأخیر انداختن، و اقدامات حین و بعد از عمل جهت مدیریت خطر و بیماران در ۲۹ مورد شرح داده شده است.

سلامت روان، گیرندگان

خدمات سلامت روان (اختلال

کانادا، ایتالیا، ایالات متحده، آمریکا، آلمان، کامرون،

اضطراب عمومی و افسردگی)، صرع، زوال عقل، اختلال

هندوستان، چین

خدمات، حمایت اجتماعی و

سلامت روان

(۴۱-۴۶, ۱۱, ۱۰, ۸)

سکته حاد قلبی / موارد احتمالی

جدید سکته حاد قلبی

ایتالیا، عربستان، ترکیه،

بین‌المللی (نویسنده‌گان از

(۴۷-۵۸, ۹)

تپش قلب، درد قلبی / عموم

مردم،

تعیین به کل کشورها)، کانادا،

بیماری قلبی مادرزادی در

چین، آمریکا، آرژانتین، نیجریه

کودکان،

پروتکل تریاژ پیشنهادی بیماران برای مدیریت خطر بیماران قلبی و عروقی در دوران همه گیری از مواردی است که راهنمای عمل نیروی ارائه‌دهنده جهت کنترل خطر و مدیریت بیماران بوده است.

تحلیل‌ها از کاهش تعداد افراد مراجعه کننده برای دریافت خدمات حیاتی بیماری‌های قلبی و عروقی و همچنین تأخیر در دریافت خدمات حکایت دارد. در کانادا و چین، علاوه‌بر آن که مرگ‌ومیر در بخش اورژانس برای سندروم حاد کرونر (ACS) از ۲,۶۹ درصد در دوره قبل از COVID به ۷,۲۷ در دوره پس از محدودیت‌های اپیدمی افزایش یافته است.

پزشکی از راه دور فرصتی را برای ارزیابی، تشخیص و حتی ناظارت بر بیماران قلبی و عروقی پس از ترجیح در صورت نیاز به حفظ فاصله گذاری فیزیکی فراهم می‌کند.

انجمان قلب و عروق آمریکا و فرانسه به همراه انجمان پزشکی هسته‌ای این کشور مجموعه اقداماتی را پیش از رسیدن بیمار، در زمان پذیرش، در زمان انجام آزمایش‌ها، و پس از انجام آزمایش‌ها برای مراکز ارائه‌کننده خدمت ترسیم کرده است که مواجهه بیمار با همه گیری را کاهش دهد.

در این مطالعه که از سوی سازمان سکته مغزی و درمان‌های عصبی مداخله‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا انجام شده است مجموعه توصیه‌ها و سیاست‌هایی را برای استمرار خدمات مرتبط با سکته مغزی، در حوزه‌های آگاهی رساندن به بیماران جهت جستجوی درمان، کمبود نیرو انسانی متخصص، تخت‌های بیمارستانی برای سکته مغزی، اقلام حفاظتی، چالش‌های بیهوشی، فرایندهای پذیرش، درمان و ترجیص، حمایت‌های روان‌شناسی برای مراقبت و.. ارائه کرده است.

در منطقه ونتو ایتالیا متخصصین مرتبط با سکته‌های مغزی مجموعه تجربیات خود در حوزه‌های جدایی بیماران مبتلا به همه گیری با بیماران سکته‌های مغزی خفیف و حاد در حوزه‌هایی مانند جدایی بخش‌ها، تجهیزات، آگاهی رسانی، و درنظرگرفتن مناطق اختصاصی به اشتراک گذاشته‌اند.

بر اساس مطالعه مقطعی انجام شده از بین ارائه کنندگان خدمات مرتبط با سکته مغزی در ۵۵ کشور مشخص شده است که گیرندگان خدمت جهت دریافت خدمات به مقدار کمتری مراجعت کرده‌اند و در عین حال بیش از ۵۰ درصد مراکز مرتبط به علت همه گیری ظرفیت ارائه خدمت به تمام افراد را نداشته‌اند یا مراکز با سطح ارائه مراقبت اینم پایینی به ارائه خدمت مشغول بوده‌اند. سازمان سکته مغزی اروپا آگاهی رسانی به جامعه جهت دریافت حتمی خدمات مربوط، دسترسی به حفاظت شخصی برای متخصصان و بیماران را از الزامات بر شمرده است.

مطالعه‌ای که در امریکای مرکزی و جنوبی جهت بررسی اثرات اپیدمی بر افراد دیابتی انجام شد نشان داد اکثر کشورها نتوانستند خدمات مناسبی به جامعه دیابتی خود ارائه دهنند که باشد یافتن محدودیت‌های قرنطینه‌ای، دسترسی و اخذ دارو و خدمات در بین بیماران کاهش یافته است. سیاست‌های ارائه دارو درب منزل و ایجاد ذخیره سه‌ماهه دارویی از جمله سیاست‌های پیشنهادی این مطالعه است.

بیماری قلبی و عروقی،
فارخرخون بالا

سکته مغزی / افراد دچار سکته

خاورمیانه و شمال آفریقا، ایتالیا،
آرژانتین، ایالت متحده
اروپا ۵۰ کشور، ایالات متحده

مغزی و ارائه کنندگان خدمات
مرتبط، سکته مغزی / افراد
آمریکا، ژاپن
مواجه شده با سکته مغزی و یا
در حال درمان و بازتوانی

آمریکای جنوبی و مرکزی،
ایالات متحده آمریکا، سوئیس،
کودکان دیابتی، کلینیک‌های

<p>در ایالات متحده آمریکا و سنگاپور از بین مراجعین به مراکز به علت دیابت، تعداد افراد کتواسیدوز دیابتی افزایش داشته که نشان دهنده تأخیر در مراجعه و اخذ خدمت در زمان اپیدمی است.</p> <p>اطمینان از دریافت انسولین، مراجعه کادر بهداشتی به درب منازل افراد دیابتی، پیگیری تلفنی، آموزش بزرگسالان دیابتی و والدین کودکان دیابتی از طریق پزشکی از راه دور، ویدئوکنفرانس، پزشکی از راه دور، تحويل دارو از طریق پست یا پیک و فعالیت بدنی ویژه برای بیماران از جمله سیاست‌های در نظر گرفته شده در سوئیس و ایالات متحده بود.</p> <p>پروتکل تریاژ پیشنهادی بیماران برای مدیریت خطر برای بیماران دیابتی در دوران کرونا از سیاست‌های بکار گرفته شده جهت کاهش احتمال خطر بود.</p> <p>در کلینیک‌های پای دیابتی با استفاده از پزشکی از راه دور، تغییر به پذیرش سرپایی، و آمادگی برای دوران پسا اپیدمی تا حد ممکن سعی در استمرار خدمت رسانی شد.</p> <p>ابتكار پرستاری از راه دور برای نوجوانان مبتلا به دیابت باعث شد این گروه از جامعه به خدمات دسترسی داشته باشد و همچنین هیچ گونه عارضه‌ای طی این نوع از ارائه خدمت دیده نشد.</p>	<p>پای دیابتی، نوجوانان و بزرگسالان</p> <p>بین المللی، سنگاپور، آلمان، استرالیا</p> <p>دندانپزشکی، اورژانس دندانپزشکی</p> <p>ایالات متحده، رومانی</p> <p>کشورهای با درآمد کم و متوسط، ایالات متحده آمریکا، اردن</p> <p>ترکیه، چین</p>
<p>ارائه خدمات دندانپزشکی ذرات هوایبرد (آتروسل) زیادی ایجاد می‌کند. در دوران اپیدمی COVID-19 روش‌های نوآورانه عاری از آتروسل می‌تواند اینمی بیماران و ارائه کنندگان را در موارد اورژانسی خدمات حفظ کند.</p> <p>با تعطیلی مراکز خصوصی دندانپزشکی به علت همه گیری در رومانی، میزان مراجعات به بخش اورژانس دندانپزشکی بیمارستان عمومی در این کشور افزایش یافته بود. آبسه، عصب کشی و درد شدید از مهم ترین علل مراجعه بودند.</p>	<p>(۷۶, ۷۵)</p>
<p>در دوران اپیدمی، بسیاری از کارکنان سلامت با محدودیت‌های سرعت اینترنت، عدم آموزش کافی در استفاده از تجهیزات الکترونیک مرتبط با پزشکی از راه دور روبرو شدند.</p> <p>اثربخشی و کارایی پزشکی از راه دور و تنظیم دوز انسولین برای بیماران دیابتی در کنترل دوز انسولین در بزرگسالان و کودکان در دوران اپیدمی ثابت شد.</p> <p>بر اساس تجربه اثبات شده برای موارد دمای بدن، فشارخون، ضربان قلب، تنفس، معاینه قلب و یا ریه ارائه خدمات روانپزشکی، مراقبت‌های سکته حاد مغزی می‌توان از پزشکی از راه دور استفاده کرد.</p> <p>بیش از ۸۵ درصد از والدین کودکان دیابتی تجربه استفاده از پزشکی از راه دور را سازنده و خوشایند توصیف کردند.</p>	<p>پزشکی از راه دور و کارکنان بهداشتی و درمانی و تجهیزات</p> <p>(۷۷-۸۱, ۵)</p>
<p>بر اساس نظرسنجی از والدین کودکان دارای بیماری مزمن تنفسی، اضطراب و نگرانی‌های شدید والدین و کودکان و اختلال در دریافت مراقبت‌ها از مهم ترین عوارض اپیدمی بیان شد.</p>	<p>بیماری‌های تنفسی، کودکان</p> <p>(۸۲, ۴)</p>

ترس از ابتلا به بیماری COVID-19 در مراکز درمانی باعث شده ۳۰٪ از بیماران تنفسی مزمن برای اخذ خدمت به مراکز ارائه‌دهنده مراجعه نکنند.

ارائه خدمت بیماران غیرواگیر از بیماران کرونایی، آموزش بیماران و آموزش منابع انسانی سلامت بر اساس ویژگی‌های بیماری همه‌گیر شده، از جمله راهبردهای انجام‌شده برای استمرار خدمات در کشورهای مختلف و ایران بوده است (۱).

یکی از راهبردهای کشورها و نظام‌های سلامت برای استمرار ارائه خدمات غیرواگیر، بهویژه برای بیماری دیابت و فشارخون، مشاوره‌های دارویی، ویزیت‌های دوره‌ای و پیگیری بیماری‌های قلبی و عروقی و بیماران سرطانی با استفاده از ظرفیت پزشکی از راه دور بوده است. ارائه کنندگان و دریافت کنندگان خدمت از مزایای این راهبرد ابراز رضایت کرده‌اند و با به کارگیری این روش، از احتمال سرایت بیماری کرونا به افراد تا حد زیادی کاسته شده است، ضمن این که کیفیت خدمات نیز در این شیوه به شکل راضی‌کننده‌ای به همراه استمرار خدمات در دوران بحران حفظ شده است (۲۸، ۱۲). استفاده از خدمات پست و تحويل دارو درب منازل و اطمینان از دسترسی افراد به داروهای حیاتی مانند انسولین، ایجاد ذخیره‌های دارویی سه و چند ماهه برای بیماران متاثر از بیماری‌های غیرواگیر، آموزش مراقبین در خانه، استفاده از تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی، اطمینان بخشی به بیماران غیرواگیر از ارائه این خدمات در مراکز خاص تخصیص داده شده از دیگر راهبردهایی بود که بر اساس تجربیات بشر در دوران همه‌گیری موثر بوده‌اند، تا حدی که ایده استفاده روتین از این ظرفیت به طور جدی در ذهن بسیاری سیاست‌گذاران شکل گرفته است.

نتیجه‌گیری

بحran‌هایی مانند جنگ، درگیری‌ها و منازعات، اپیدمی‌ها، حوادث طبیعی مانند زلزله و سیل از جمله مواردی هستند که همواره با بشر همراه بوده‌اند. یکی از حساس‌ترین گروه‌های جمعیتی که می‌تواند از این بحران‌ها آسیب بیند، شهروندانی هستند که با انواع بیماری‌های غیرواگیر زندگی می‌کنند و یا در معرض عوامل خطر این بیماری‌ها قرار

بحث

این مطالعه با گرد هم آوری تجربیات کشورهای جهان پیرامون اثرات بحران‌ها بر استمرار ارائه خدمات بیماری‌های غیرواگیر و اقدامات انجام‌شده در پاسخ به بحران، نمونه‌های قابل استنادی را برای سیاست‌گذاران و ارائه‌دهندگان خدمت ترسیم کرد. به علت حجم فراوان اقدامات انجام شده، تنها به سرفصل‌های آنها اشاره شد. تقسیم‌بندی صورت گرفته در ارائه نتایج مطالعات مرتبط با هر گروه از بیماری‌های غیرواگیر، راهکارهایی را برای پژوهشگران مشخص کرده است.

تعدادی از خدمات مرتبط با بیماری‌های غیرواگیر و داروهای وابسته به این دسته از بیماری‌ها برای ادامه حیات بیمار الزاماً است. متأسفانه در صورت وقفه در ارائه این دسته خدمات به دلیل بحران‌هایی مانند جنگ، درگیری‌ها و اپیدمی، طبیعتاً میزان مرگ‌ومیر به خصوص مرگ‌های زودرس افزایش خواهد یافت (۱)، ارزیابی سازمان جهانی سلامت در ارتباط با وضعیت ارائه خدمات مرتبط با بیماری‌های غیرواگیر در کشورهای گوناگون نشان داد با افزایش شدت همه‌گیری، تعداد بیشتری از کشورها با وقفه و اختلال در ارائه خدمات مرتبط با بیماری‌های غیرواگیر روبرو شده‌اند (۱۰، ۶۳). اختصاص زیرساخت‌ها و نیروی انسانی به مقابله با همه‌گیری و در نتیجه لغو شدن خدمات الکترونی و متوقف شدن خدمات غربالگری جمعیت از یک سو و اعمال محدودیت‌های قرنطینه‌ای سختگیرانه در کنار ترس افراد از ابتلای به همه‌گیری از سوی دیگر، از مهم‌ترین دلایل وقفه در ارائه خدمات مرتبط با بیماری‌های غیرواگیر بوده‌اند. در حالی که بیشترین وقفه و اختلال در دسته خدمات بازتوانی و تسکینی مشاهده شده است، خدمات مرتبط با دیابت و فشارخون در مقایسه با بیماری‌های قلبی عروقی و سرطان‌ها به میزان بیشتری مختل شده بود.

تنها نزدیک به ۳۰ کشور جهان منابع مالی ویژه‌ای را برای ارائه خدمات مربوط به بیماری‌های غیرواگیر در برنامه ملی اقدام COVID-19 در نظر گرفته بودند. بازیینی بسته خدمات، استانداردهای ارائه خدمات، جداسازی واحد‌های

سوابق و مستندات ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی در پاسخ به بحران‌ها را تقویت خواهد کرد. نهایتاً اینکه با توجه به نبود مطالعاتی در زمینه سنجش هزینه-اثربخشی خدمات ارایه شده به بیماران در دوران همه‌گیری و یا سنجش چگونگی ارائه خدمات در منزل در بحرانها توصیه می‌شود پژوهشگران علاقمند به انجام مطالعاتی در این خصوص پردازنند.

دارند. مرور تجربیات و آماده‌سازی سناریوهای مختلف، استفاده از فناوری‌های نوین، اعتمادسازی و افزایش آگاهی عموم مردم در خصوص نحوه پیشگیری از ابتلا به بیماری، و در عین حال استمرار دریافت نیازها و خدمات مرتبط با بیماری و شرایط زندگی آنها از الزاماتی است که نظام‌های سلامت جهان بایستی بیش از پیش در آن سرمایه‌گذاری کنند تا مانع بروز بحران‌های آتی شوند.

توصیه‌ها

محدودیت‌ها

این مطالعه نیز همانند تمامی مطالعات دیگر دارای محدودیت‌هایی می‌باشد و تجربیات تمام کشورها و نظام‌های سلامت در جهان در مجلات و وب‌سایت‌ها انتشار نیافته است و طبیعتاً این مطالعه در بردارنده تعامی چالش‌ها و تجربیات کشورها نیست.

تشکر و قدردانی

نویسندهای این بازماندگان جانبرکفان و شهدای عرصه سلامت که در طی بحران همه‌گیری، جان شریف‌شان را در طبق اخلاص قرار داده‌اند قدردانی می‌کنند و بر روح بلند این عزیزان درود می‌فرستند. هیچ یک از نویسندهای این مطالعه تعارض منافعی برای انتشار این مقاله ندارند. این مطالعه حمایت مالی ویژه‌ای از سوی سازمانی یا نهادی دریافت نکرده است.

مدیران و سیاستگذاران حوزه بیماری‌های غیرواگیر در کنار سایر مراکز مسئول از جمله دفتر مدیریت بحران وزارت بهداشت، سازمان برنامه‌وپردازی، پدافند غیرعامل وزارت بهداشت با توجه به قرارگیری کشور در منطقه با ریسک بالای بلایای طبیعی و بلایای انسان‌ساخت می‌توانند بر اساس مرور تجربیات کشورهای جهان و مستندسازی تجربیات کشور در دوران بحران‌هایی مانند همه‌گیری کرونا، سناریوها و برنامه‌های اقدام جهت مقابله با اختلال در استمرار ارائه خدمات به بیماران غیرواگیر را به روزرسانی و سناریوهای متفاوتی برای آن در نظر بگیرند. استفاده از راهنمایی‌های سازمان جهانی سلامت و دیپلماسی سلامت فعال با کشورهای پیشرو در مدیریت بحران‌ها، امکان انتقال بهتر تجارب گرانبهای و ارزشمند نظام‌های سلامت جهان به نظام سلامت کشور را تسهیل خواهد کرد. از سوی دیگر تجارب دانشگاه‌های علوم پزشکی در مدیریت بحران‌هایی این‌چنین در صورت وجود

منابع

1. World Health Organization. The impact of the COVID-19 pandemic on noncommunicable disease resources and services: results of a rapid assessment. 2020.
2. Barone MTU, Villarroel D, de Luca PV, Harnik SB, Lima BLdS, Wieselberg RJP, et al. COVID-19 impact on people with diabetes in South and Central America (SACA region). Diabetes Res Clin Pract. 2020;166:108301.
3. Chazan G, Franchini F, Alexander M, Banerjee S, Mileshkin L, Blinman P, et al. Impact of COVID-19 on cancer service delivery: a follow-up international survey of oncology clinicians. ESMO Open. 2021;6(5):100224.
4. Liang Y, Chang C, Chen Y, Dong F, Zhang L, Sun Y. Symptoms, Management and Healthcare Utilization of COPD Patients During the COVID-19 Epidemic in Beijing. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2020;15:2487-94.
5. Hare N, Bansal P, Bajowala SS, Abramson SL, Chervinskiy S, Corriel R, et al. Work Group Report: COVID-19: Unmasking Telemedicine. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020;8(8):2461-73.

- 6.Kamposioras K, Mauri D, Papadimitriou K, Anthoney A, Hindi N, Petricevic B, et al. Synthesis of recommendations from 25 countries and 31 oncology societies: how to navigate through Covid-19 labyrinth. *Front Oncol.* 2020;10:2476.
- 7.Prasad N, Bhatt M, Agarwal SK, Kohli HS, Gopalakrishnan N, Fernando E, et al. The Adverse Effect of COVID Pandemic on the Care of Patients With Kidney Diseases in India. *Kidney Int Rep.* 2020;5(9):1545-50.
- 8.Mitra M, Basu M. A study on challenges to health care delivery faced by cancer patients in India during the COVID-19 pandemic. *JPC.* 2020;11:2150.
- 9.Aldujeli A, Hamadeh A, Briedis K, Tecson KM, Rutland J, Krivickas Z, et al. Delays in Presentation in Patients With Acute Myocardial Infarction During the COVID-19 Pandemic. *Cardiovasc Res.* 2020;11(6):386-91.
- 10.Ganson KT, Tsai AC, Weiser SD, Benabou SE, Nagata JM. Job Insecurity and Symptoms of Anxiety and Depression Among U.S. Young Adults During COVID-19. *J Adolesc Health.* 2021;68(1):53-6.
- 11.Jacob L, Smith L, Koyanagi A, Oh H, Tanislav C, Shin JI, et al. Impact of the coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic on anxiety diagnosis in general practices in Germany. *J Psychiatr Res.* 2021;143:528-33.
- 12.Biswas S, Adhikari SD, Gupta N, Garg R, Bharti SJ, Kumar V, et al. Smartphone-Based Telemedicine Service at Palliative Care Unit during Nationwide Lockdown: Our Initial Experience at a Tertiary Care Cancer Hospital. *Indian J Palliat Care.* 2020;26:31-5.
- 13.Iodice F, Romoli M, Giometto B, Clerico M, Tedeschi G, Bonavita S; Digital Technologies, Web and Social Media Study Group of the Italian Society of Neurology. Stroke and digital technology: a wake-up call from COVID-19 pandemic. *Neurol Sci.* 2021;42(3):805-809.
- 14.National Institute for Health and Care Excellence: Guidelines. COVID 19 rapid guideline: renal transplantation. London: National Institute for Health and Care Excellence (NICE) Copyright © NICE 2020. 2020.
- 15.Chen G, Zhou Y, Xia J, Yao J, Zheng K, Qin Y, et al. When the COVID-19 pandemic changed the follow-up landscape of chronic kidney disease: a survey of real-world nephrology practice. *Ren Fail.* 2020;42(1):733-9.
- 16.Okoro RN. COVID-19 pandemic: The role of community pharmacists in chronic kidney disease management supportive care. *RSAP.* 2021;17(1):1925-8.
- 17.Aggarwal S, Mahawar K, Khaitan M, Raj P, Wadhawan R, Dukkipati N, et al. Obesity and Metabolic Surgery Society of India (OSSI) Recommendations for Bariatric and Metabolic Surgery Practice During the COVID-19 Pandemic. *Obes Surg.* 2020;30(12):5101-7.
- 18.Ghosh A, Arora B, Gupta R, Anoop S, Misra A. Effects of nationwide lockdown during COVID-19 epidemic on lifestyle and other medical issues of patients with type 2 diabetes in north India. *Diabetes Metab Syndr.* 2020;14(5):917-20.
- 19.Arévalo H, Triana MU, Santacruz JC. Impact of mandatory preventive isolation on daily physical activity and weight of children in Colombia during the SARS-cov-2 pandemic. *Rev Colomb de Cardiol.* 2020;27(6):589-96.
- 20.Kayikcioglu M, Tokgozoglu L, Tuncel OK, Pirildar S, Can L. Negative impact of COVID-19 pandemic on the lifestyle and management of patients with homozygous familial hypercholesterolemia. *J Clin Lipidol.* 2020;14(6):751-5.
- 21.Ahmed SA, Ajisola M, Azeem K, Bakibinga P, Chen YF, Choudhury NN, Fayehun O, Griffiths F, Harris B, Kibe P, Lilford RJ. Impact of the societal response to COVID-19 on access to healthcare for non-COVID-19 health issues in slum communities of Bangladesh, Kenya, Nigeria and Pakistan: results of pre-COVID and COVID-19 lockdown stakeholder engagements. *BMJ Glob Health.* 2020;5(8):e003042.

- 22.Balzora S, Issaka RB, Anyane-Yeboa A, Gray II DM, May FP. Impact of COVID-19 on colorectal cancer disparities and the way forward. *Gastrointest Endosc.* 2020;92(4):946-50.
- 23.Kronenfeld JP, Penedo FJ. Novel coronavirus (COVID-19): telemedicine and remote care delivery in a time of medical crisis, implementation, and challenges. *Transl Behav Med.* 2021;11(2):659-63.
- 24.Ak N, Vatansever S. "Door to Treatment" Outcomes of Cancer Patients during the COVID-19 Pandemic. *Chemotherapy.* 2020;65(5-6):141-6.
- 25.Anderson N, Thompson K, Andrews J, Chesson B, Cray A, Phillips D, et al. Planning for a pandemic: Mitigating risk to radiation therapy service delivery in the COVID-19 era. *J Med Radiat Sci.* 2020;67(3):243-8.
- 26.Balakrishnan A, Lesurtel M, Siriwardena AK, Heinrich S, Serrablo A, Besselink MG, et al. Delivery of hepato-pancreato-biliary surgery during the COVID-19 pandemic: an European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association (E-AHPBA) cross-sectional survey. *HPB.* 2020;22(8):1128-34.
- 27.Chen G, Wu Q, Jiang H, Li Z, Hua X, Hu X, et al. Impact of treatment delay due to the pandemic of COVID-19 on the efficacy of immunotherapy in head and neck cancer patients. *J Hematol Oncol.* 2020;13(1):174.
- 28.Darcourt JG, Aparicio K, Dorsey PM, Ensor JE, Zsigmond EM, Wong ST, et al. Analysis of the implementation of telehealth visits for care of patients with cancer in Houston during the COVID-19 pandemic. *JCO oncology practice.* 2021;17(1):e36-43.
- 29.Del Vecchio Blanco G, Calabrese E, Biancone L, Monteleone G, Paoluzi OA. The impact of COVID-19 pandemic in the colorectal cancer prevention. *Int J Colorectal Dis.* 2020;35(10):1951-4.
- 30.Falcone R, Grani G, Ramundo V, Melcarne R, Giacomelli L, Filetti S, Durante C. Cancer care during COVID-19 era: the quality of life of patients with thyroid malignancies. *Front Oncol.* 2020;10:1128.
- 31.Alkatout I, Karimi-Zarchi M, Allahqoli L. Gynecological cancers and the global COVID-19 pandemic. *J Turk Ger Gynecol Assoc.* 2020;21(4):272-8.
- 32.Altın D, Yalçın İ, Khatib G, Dağgez Keleşoğlu M, Akgöl S, Önder AB, et al. Management of gynecological cancers in the COVID-19 era: a survey from Turkey. *J Turk Ger Gynecol Assoc.* 2020;21(4):265-71.
- 33.Guven DC, Aktas BY, Aksun MS, Ucgul E, Sahin TK, Yildirim HC, et al. COVID-19 pandemic: changes in cancer admissions. *BMJ SP Care.* 2020;0:1-4.
- 34.Kamposioras K, Mauri D, Papadimitriou K, Anthoney A, Hindi N, Petricevic B, Dambrosio M, et al. Synthesis of recommendations from 25 countries and 31 oncology societies: how to navigate through Covid-19 labyrinth. *Front Oncol.* 2020;10:2476.
- 35.Kiss N, Cantoresi F, Lampitelli S, Marino R, Bánvölgyi A, Wikonkál NM, et al. Emergency dermatology: Three-month experience from an Italian academic outpatient clinic during lockdown for COVID-19 pandemic. *Dermatol Ther.* 2020;33(6):e14390.
- 36.Park JY, Lee YJ, Kim T, Lee CY, Kim HI, Kim JH, et al. Collateral effects of the coronavirus disease 2019 pandemic on lung cancer diagnosis in Korea. *BMC Cancer.* 2020;20(1):1-8.
- 37.Rajasekaran RB, Ashford RU, Cosker TDA, Stevenson JD, Jeys L, Pollock R, et al. What Proportion of Patients with Bone and Soft Tissue Tumors Contracted Coronavirus-19 and Died From Surgical Procedures During the Initial Period of the COVID-19 Pandemic? Results From the Multicenter British Orthopaedic Oncology Society Observational Study. *Clin Orthop Relat Res.* 2021;479(5):1158-66.
- 38.Skowron KB, Hurst RD, Umanskiy K, Hyman NH, Shogan BD. Caring for Patients with Rectal Cancer During the COVID-19 Pandemic. *J Gastrointest Surg.* 2020;24(7):1698-703.

- 39.Tsibulak I, Reiser E, Bogner G, Petru E, Hell-Teutsch J, Reinthaller A, et al. Decrease in gynecological cancer diagnoses during the COVID-19 pandemic: an Austrian perspective. *IJGC*. 2020;30(11):1667-71.
- 40.Dinmohamed AG, Visser O, Verhoeven RH, Louwman MW, van Nederveen FH, Willems SM, Merkx MA, Lemmens VE, Nagtegaal ID, Siesling S. Fewer cancer diagnoses during the COVID-19 epidemic in the Netherlands. *Lancet Oncol*. 2020;21(6):750-1.
- 41.Alavi N, Yang M, Stephenson C, Nikjoo N, Malakouti N, Layzell G, et al. Using the Online Psychotherapy Tool to Address Mental Health Problems in the Context of the COVID-19 Pandemic: Protocol for an Electronically Delivered Cognitive Behavioral Therapy Program. *JMIR Res Protoc*. 2020;9(12):e24913.
- 42.Assenza G, Lanzone J, Brigo F, Coppola A, Di Gennaro G, Di Lazzaro V, et al. Epilepsy Care in the Time of COVID-19 Pandemic in Italy: Risk Factors for Seizure Worsening. *Front Neurol*. 2020;11:737.
- 43.Carpinelli Mazzi M, Iavarone A, Musella C, De Luca M, de Vita D, Branciforte S, et al. Time of isolation, education and gender influence the psychological outcome during COVID-19 lockdown in caregivers of patients with dementia. *Eur Geriatr Med*. 2020;11(6):1095-8.
- 44.Ferrando SJ, Klepacz L, Lynch S, Shahar S, Dornbush R, Smiley A, et al. Psychiatric emergencies during the height of the COVID-19 pandemic in the suburban New York City area. *J Psychiatr Res*. 2021;136:552-9.
- 45.Mboua CP, Keubo FRN, Fouaka SGN. Anxiety and Depression Associated with the Management of COVID-19 Among Healthcare workers in Cameroon. *Evol Psychiatr*. 2021;86(1):131-9.
- 46.Qi M, Zhou S-J, Guo Z-C, Zhang L-G, Min H-J, Li X-M, et al. The Effect of Social Support on Mental Health in Chinese Adolescents During the Outbreak of COVID-19. *J Adolesc Health*. 2020;67(4):514-8.
- 47.Alhadramy OM, Sr. The Structure and the Outcome of Telephone-Based Cardiac Consultations During Lockdown: A Lesson From COVID-19. *Cureus*. 2020;12(11):e11585.
- 48.Atalay A, Soran Türkcan B, Taşoğlu İ, Külahçıoğlu E, Yilmaz M, Ecevit AN, et al. Management of congenital cardiac surgery during COVID-19 pandemic. *Cardiol Young*. 2020;30(12):1797-805.
- 49.Bhaskar S, Rastogi A, Chattu VK, Adisesh A, Thomas P, Alvarado N, et al. Key strategies for clinical management and improvement of healthcare services for cardiovascular disease and diabetes patients in the coronavirus (COVID-19) settings: recommendations from the REPROGRAM consortium. *Front cardiovasc med*. 2020;7:112.
- 50.Boity LCP, Martin-Rhee M, Kasiban A, Swartz RH, Mulvagh SL, Lindsay MP, et al. COVID-19 Pandemic: Global Impact and Potential Implications for Cardiovascular Disease in Canada. *CJC open*. 2020;2(4):265-72.
- 51.Choudhary R, Gautam D, Mathur R, Choudhary D. Management of cardiovascular emergencies during the COVID-19 pandemic. *EMJ*. 2020;37(12):778-80.
- 52.Katsouras C, Karapanayiotides T, Papafakis M, Giannopoulos S, Ziakas A, Sianos G, et al. Greater decline of acute stroke admissions compared with acute coronary syndromes during COVID-19 outbreak in Greece: Cerebro/cardiovascular implications amidst a second wave surge. *Eur J Neurol*. 2021;28(10):3452-5.
- 53.González SM, Tartaglione F, Babio GR, Schiavone MJ, Gelpi FC, Angrisani MA, et al. Risks of cardiovascular disease patients in times of covid-19. A survey of the argentine foundation of cardiology. *Rev Argent Cardiol*. 2020;88(3):212-6.
- 54.Nan J, Jia R, Meng S, Jin Y, Chen W, Hu H. The Impact of the COVID-19 Pandemic and the Importance of Telemedicine in Managing Acute ST Segment Elevation Myocardial Infarction Patients: Preliminary Experience and Literature Review. *J Med Syst*. 2021;45(1):9.

- 55.Paschali A, Anagnostopoulos C. Nuclear Cardiology practice in COVID-19 era. Hell. J Nucl Med. 2020;23:26-30.
- 56.Vigne J, Manrique A, Mouet A, Le Hello S, Agostini D. Nuclear cardiology in the COVID-19 pandemic era. Arch Cardiovasc Dis. 2020;113(6-7):374-7.
- 57.Sokunbi OJ, Mgbajah O, Olugbemi A, Udom BO, Idowu A, Sanusi MO. Maintaining paediatric cardiac services during the COVID-19 pandemic in a developing country in sub-Saharan Africa: guidelines for a “scale up” in the face of a global “scale down”. Cardiol Young. 2020;30(11):1588-94.
- 58.Vensentini N, Zaidel EJ, Charask A, Salzberg S, Gagliardi J, Perea J, et al. [Cardiovascular admissions in Intensive Care Units during COVID-19 pandemic]. Medicina. 2020;80(5):425-32.
- 59.Al-Jehani H, John S, Hussain SI, Al Hashmi A, Alhamid MA, Amr D, et al. MENA-SINO consensus statement on implementing care pathways for acute neurovascular emergencies during the COVID-19 pandemic. Front Neurol. 2020;11:928.
- 60.Aguiar de Sousa D, van der Worp HB, Caso V, Cordonnier C, Strbian D, Ntaios G, et al. Maintaining stroke care in Europe during the COVID-19 pandemic: Results from an international survey of stroke professionals and practice recommendations from the European Stroke Organisation. Eur Stroke J. 2020;5(3):230-6.
- 61.Ortega-Gutierrez S, Farooqui M, Zha A, Czap A, Sebaugh J, Desai S, et al. Decline in mild stroke presentations and intravenous thrombolysis during the COVID-19 pandemic: The Society of Vascular and Interventional Neurology Multicenter Collaboration. Clin Neurol Neurosurg. 2021;201:106436.
- 62.Ota T, Shiokawa Y and Hirano T. Impact of COVID-19 on Stroke Admissions and the Medical Care System in the Tokyo Metropolitan Area. Front Neurol. 2020;11:601652.
- 63.Srivastava PK, Zhang S, Xian Y, Xu H, Rutan C, Alger HM, et al. Treatment and Outcomes of Patients With Ischemic Stroke During COVID-19: An Analysis From Get With The Guidelines-Stroke. Stroke. 2021;52(10):3225-32.
- 64.Beliard K, Ebekozien O, Demeterco-Berggren C, Alonso GT, Gallagher MP, Clements M, et al. Increased DKA at presentation among newly diagnosed type 1 diabetes patients with or without COVID-19: Data from a multi-site surveillance registry. J Diabetes. 2021;13(3):270-2.
- 65.Beran D, Aebischer Perone S, Castellsague Perolini M, Chappuis F, Chopard P, Haller DM, et al. Beyond the virus: Ensuring continuity of care for people with diabetes during COVID-19. Prim Care Diabetes. 2021;15(1):16-7.
- 66.Bhaskar S, Rastogi A, Chattu VK, Adisesh A, Thomas P, Alvarado N, et al. Key strategies for clinical management and improvement of healthcare services for cardiovascular disease and diabetes patients in the coronavirus (COVID-19) settings: recommendations from the REPROGRAM consortium. Front cardiovasc med. 2020;7:112.
- 67.Caballero AE, Ceriello A, Misra A, Aschner P, McDonnell ME, Hassanein M, et al. COVID-19 in people living with diabetes: An international consensus. J Diabetes Complications. 2020;34(9):107671-.
- 68.Chee YJ, Ng SJH, Yeoh E. Diabetic ketoacidosis precipitated by Covid-19 in a patient with newly diagnosed diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract. 2020;164:108166.
- 69.Clary L, Wang C, Byrne ME, Monaghan M. COVID-19 Pandemic-Related Practices and Policies Affecting the Continuity of Behavioral Health Care Among Children With Diabetes. Transl Behav Med. 2020;10(4):819-26.
- 70.Deogon GS, Robbins T, Randeva MS, Kyrou I, Sankar S, Randeva HS, et al. Managing high-acuity outpatient services during the COVID-19 pandemic: lessons from the acute diabetes foot service. Future Hosp J. 2020;7(3):77-9.

- 71.Gujral UP, Johnson L, Nielsen J, Vellanki P, Haw JS, Davis GM, et al. Preparedness cycle to address transitions in diabetes care during the COVID-19 pandemic and future outbreaks. *BMJ Open Diabetes Res Care.* 2020;8(1):e001520.
- 72.Kamrath C, Mönkemöller K, Biester T, Rohrer TR, Warncke K, Hammersen J, et al. Ketoacidosis in Children and Adolescents With Newly Diagnosed Type 1 Diabetes During the COVID-19 Pandemic in Germany. *JAMA.* 2020;324(8):801-4.
- 73.Lawrence C, Seckold R, Smart C, King BR, Howley P, Feltrin R, et al. Increased paediatric presentations of severe diabetic ketoacidosis in an Australian tertiary centre during the COVID-19 pandemic. *Diabet Med.* 2021;38(1):e14417.
- 74.Lim ST, Yap F, Chin X. Bridging the Needs of Adolescent Diabetes Care During COVID-19: A Nurse-Led Telehealth Initiative. *J Adolesc Health.* 2020;67(4):615-7.
- 75.Benzian H, Niederman R. A dental response to the COVID-19 pandemic—safer aerosol-free emergent (SAFER) dentistry. *Front Med.* 2020;7.
- 76.Lucaciu O, Boca A, Mesaros AS, Petrescu N, Aghiorghiesei O, Mirica IC, et al. Assessing SARS-CoV-2 Infection Rate among Romanian Dental Practitioners. *Int J Environ Res.* 2021;18(9):4897.
- 77.Feroz AS, Khoja A, Saleem S. Equipping community health workers with digital tools for pandemic response in LMICs. *Arch Public Health.* 2021;79(1):1.
- 78.Garg SK, Rodbard D, Hirsch IB, Forlenza GP. Managing New-Onset Type 1 Diabetes During the COVID-19 Pandemic: Challenges and Opportunities. *Diabetes Technol Ther.* 2020;22(6):431-9.
- 79.Odeh R, Gharaibeh L, Daher A, Kussad S, Alassaf A. Caring for a child with type 1 diabetes during COVID-19 lockdown in a developing country: Challenges and parents' perspectives on the use of telemedicine. *Diabetes Res Clin Pract.* 2020;168:108393.
- 80.Roy B, Nowak RJ, Roda R, Khokhar B, Patwa HS, Lloyd T, et al. Teleneurology during the COVID-19 pandemic: A step forward in modernizing medical care. *J Neurol Sci.* 2020;414:116930.-
- 81.West HJ. Telemedicine in oncology: delivering on an overdue promise in the COVID-19 era. *Front Oncol.* 2020;10:1870.
- 82.Hepkaya E, Kilinc AA, Cebi MN, Koyuncu Z, Cokugras H. General health status of children with asthma during the COVID-19 pandemic. *Int J Pediatr.* 2021;63(3):331-7.