

Assessment of hepatic fibrosis by transient elastography in rheumatoid arthritis patients receiving methotrexate

Nasrin Moghimi^{1,2}, Khaled Rahmani², Farshad Sheikhesmaili³, Asrin Babahajian⁴, Pezhman Sharifi⁵, Samireh Ramezani⁶

1. Assistant Professor, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran. ORCID ID: 0000-0002-9408-8431
2. Assistant Professor, Liver and Digestive Research Center, Research Institute for Health Development, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran. ORCID ID: 0000-0002-0860-8040
3. Assistant Professor, Liver and Digestive Research Center, Research Institute for Health Development, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran. ORCID ID: 0000-0002-4439-123X
4. Msc of Anatomical Sciences, Liver and Digestive Research Center, Research Institute for Health Development, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran. ORCID ID: 0000-0003-0278-1560
5. Msc of Microbiology, Sciences, Liver and Digestive Research Center, Research Institute for Health Development, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran. ORCID ID: 0000-0001-7953-9487
6. Assistant in Internal Medicine, Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran, (Corresponding Author), Tel: +98-87-33247855, Email: samirehramezani@gmail.com ORCID ID: 0000-0002-6606-8089

ABSTRACT

Background and Aim: Methotrexate (MTX) is commonly used in the treatment of diseases such as rheumatoid arthritis (RA) but, its hepatotoxicity potential, always has been a major concern. The aim of this study is to determine the rate of liver fibrosis by transient elastography (TE) method and its relationship with cumulative dose of MTX and duration of treatment, in rheumatoid arthritis patients receiving MTX.

Materials and Methods: This cross-sectional study included RA patients receiving MTX for more than 6 months. Hepatic fibrosis was determined by TE on the basis of the rate of liver stiffness. The patients were divided into 2 groups according to the results of liver stiffness measurement. Demographic, clinical and biochemical parameters were compared between the two groups. Correlation of the cumulative dose of MTX and duration of MTX treatment with the liver fibrosis was assessed.

Results: The study included 51patients, with a mean age of $52.53 \pm (9.95)$ years. 44(86.3%) patients were women. The cumulative dose of MTX was less than 4000 mg in 45 (88.2%) patients and more than 4000 mg in 6 (11.8%) patients with a mean treatment duration of $54.14 \pm (40.94)$ months. The median (IQR) value of liver stiffness was 4.70 (3.60 – 5.50) kPa. The presence of liver fibrosis was detected in 11 (21.6%) patients. There were no significant relationships between liver fibrosis and cumulative dose ($P= 0.21$) of MTX and also duration of MTX treatment ($P= 0.30$). The multivariate analysis demonstrated that only increased serum level of ALT was associated with presence of liver fibrosis ($OR = 1.07$; 95% CI: 1.01 to 1.13; $p = 0.01$).

Conclusion: According to the results of this study severe hepatic fibrosis was not common in the patients who had received methotrexate. Increasing the duration of methotrexate administration and the cumulative dose of the drug had no effect on the incidence of hepatic fibrosis. Increased serum ALT levels in RA patients were associated with high rate of liver stiffness and increased risk of hepatic fibrosis.

Keywords: Hepatic fibrosis, Rheumatoid arthritis, Transient elastography, Methotrexate

Received: May 12,2019

Accepted: Aug 27,2019

How to cite the article: Nasrin Moghimi, Khaled Rahmani, Farshad Sheikhesmaili, Asrin Babahajian, Pezhman Sharifi, Samireh Ramezani. Assessment of hepatic fibrosis by transient elastography in rheumatoid arthritis patients receiving methotrexate. SJKU 2020; 24 (6): 36-45

بررسی میزان فیروز کبدی با روش الاستوگرافی گذرا در بیماران مبتلا به آرتربیت روماتوئید تحت درمان با متواتر و کسات

نرسین مقیمی^۱, خالد رحمانی^۲, فرشاد شیخ اسماعیلی^۳, اسرین بابا حاجیان^۴, پژمان شریفی^۵, سمیره رمضانی^۶

۱. استادیار گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. کد ارکید: ۸۴۳۱-۸۴۰۲-۹۴۰۰-۰۰۰۰
 ۲. استادیار مرکز تحقیقات گوارش و کبد، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. کد ارکید: ۸۰۴۰-۸۰۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰
 ۳. استادیار مرکز تحقیقات گوارش و کبد، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. کد ارکید: ۱۲۳۳X-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰
 ۴. کارشناس ارشد علوم تشریعی، مرکز تحقیقات گوارش و کبد، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. کد ارکید: ۱۵۶۰-۰۷۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰
 ۵. کارشناس ارشد میکروب شناسی، مرکز تحقیقات گوارش و کبد، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. کد ارکید: ۹۴۸۷-۹۴۵۳-۷۹۵۳
 ۶. دستیار داخلی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. (مؤلف مسئول)، تلفن ثابت: ۳۳۶۶۴۶۵۸-۰۷-۰۸۷، کد ارکید: ۸۰۹۸-۸۰۸۰-۶۶۰۶-۰۰۰۰ samirehramezani@gmail.com

چند

زمینه و هدف: متواتر و کسات، به طور عمده در درمان بیماری‌های نظیر آرتربیت روماتوئید مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما پتانسیل سمیت کبدی آن همواره یک نگرانی مهم در مصرف این دارو بوده است. این مطالعه با هدف تعیین میزان فیبروز کبدی با استفاده از روش الاستونگرافی گذرا و ارتباط آن با دوز تجمیعی و مدت مصرف دارو در بیماران مبتلا به آرتربیت روماتوئید تحت درمان با متواتر و کسات انجام شده است.

روش بررسی: در این مطالعه که به صورت توصیفی- تحلیلی (مقطعی) طراحی شده بود، بیماران مبتلا به؛ آرتریت روماتوئید که بیش از ۶ ماه تحت درمان مت contro کسات بودند، وارد مطالعه شدند. فیروز کبدی با اندازه گیری سفتی کبد توسط روش الاستو گرافی گذرا (دستگاه فیرواسکن) تعیین شد. بیماران بر اساس اندازه گیری سفتی کبد به دو گروه با و بدون فیروز کبدی تقسیم و پارامترهای دمو گرافیک، بالینی و بیوشیمیابی بین آنها مقایسه گردید. ارتباط دوز تجمیعی و مدت زمان درمان با مت contro کسات با فیروز کبدی مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: بیماران شامل ۵۱ نفر با میانگین سنی $9/95 \pm 5/53$ سال بودند. ۴۴ نفر (۸۶٪) از آن‌ها زن بود. دوز تجمیعی متوتر و کسات در ۴۵ بیمار (۸۸٪) کمتر از ۴۰۰۰ میلی گرم، ۶ بیمار (۱۱٪) بیشتر از ۴۰۰۰ میلی گرم و میانگین مدت زمان مصرف دارو $40/94 \pm 54/14$ ماه محاسبه گردید. میانه سفتی کبد در آن‌ها $(5/50 - 4/70)$ کیلوپاسکال بود. وجود فیروز کبد در ۱۱ بیمار (۲۱٪) مشاهده شد. ارتباط معنی داری بین وجود فیروز کبدی با دوز تجمیعی ($P = 0/21$) و مدت زمان مصرف متوتر و کسات ($P = 0/30$) وجود نداشت. تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که با افزایش سطح سرمی ALT بروز فیروز کبدی در بیماران شسترن می‌شود ($OR = 1.07; 95\% CI: 1.01$ to 1.13 ; $p = 0.01$).

نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد فیروز قابل توجه و شدید کبدی در بیماران مبتلا به آرتیت روماتوئید تحت درمان با متوتروکسات شایع نیست. افزایش مدت زمان مصرف و دوز تجمیعی متوتروکسات تأثیری در بروز فیروز کبدی ندارد. با افزایش سطح ALT سه م در بیماران آرتیت روماتوئید، میزان سفته، کد افراش، و شانس، فسروز کبدی بسته می‌شود.

كلمات كلدي: فيروز كيدي، آرت بيت روماتئيد، الاستو گ اف، گذر، متون و کسات

وصول مقاله: ۹۸/۵/۲۳ اصلاحه نهایی: ۹۸/۶/۲۲

مقدمه

آرتیت روماتوئید (Rheumatoid Arthritis; RA) یک بیماری التهابی مزمن با تظاهرات مفصلی و خارج مفصلی است که معمولاً به دلیل تخریب غضروف مفصلی منجر به ناتوانی و معلولیت می‌شود. این بیماری ممکن است سیر آهسته و یا بسیار مخرب داشته باشد(۱). داروهای مختلفی که جهت درمان این بیماری به کار گرفته می‌شوند، در جهت سرکوب غیراختصاصی پدیده التهابی یا ایمونولوژیک با هدف فرونشاندن یا محدود کردن بیماری همراه با حفظ عملکردهای حرکتی و کنترل درد و جلوگیری از صدمه پیش‌روندۀ ساختمان‌های مفصلی، عمل می‌کنند(۲).

متوتکسات (Methotrexate; MTX) یکی از مؤثرترین داروهایی است که به طور شایع برای درمان RA و همچنین درمان لوپوس، آرتیت پسوریاتیک، میوزیت‌ها، واسکولیت‌ها و بعضی بیماری‌های دیگر روماتیسمی تجویز می‌شود(۳). یک داروی تضعیف کننده سیستم ایمنی و جزو داروهایی است که به عنوان داروهای ضد روماتیسمی تغییردهنده سیر بیماری (DMARD) شناخته می‌شوند که علاوه بر این بردن علائم بیماری، باعث کند شدن سیر بیماری نیز می‌شوند(۴).

سمیت کبدی و ایجاد فیروز از عوارض اصلی در استفاده طولانی مدت این دارو است(۶). هر چند با کاهش دوز دارو و تجویز هفتگی (۵ تا ۱۵ میلی گرم در هفته) به جای تجویز روزانه سمیت کبدی تا حدی کنترل شده است، ولی با این حال به دلیل مصرف گسترده و طولانی مدت این دارو به خصوص در آرتیت روماتوئید، موارد رو به گسترش از سمیت کبدی ناشی از مصرف این دارو مشاهده شده است که در صورت بی‌توجهی و نادیده گرفتن، می‌تواند منجر به سیروز و نارسایی کبد گردد(۷). در نتیجه پایش و تشخیص آسیب‌های کبدی ناشی از متوتکسات در طی دوره‌های درمان ضروری به نظر می‌رسد(۸).

روش بررسی

طراحی مطالعه: مطالعه حاضر که به صورت توصیفی- تحلیلی، طراحی شده بود، در کلینیک روماتولوژی بیمارستان توحید سنندج، ایران از اسفند سال ۱۳۹۶ تا پایان شهریور سال ۱۳۹۷ به انجام رسید. پروتکل اجرای مطالعه به تائید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی کردستان

بررسی‌های پاراکلینیکال: میزان استئاتوز و فیروز کبدی در افراد مورد مطالعه با متدهای استوگرافی گذرا (Transient Elastography) و با استفاده از دستگاه فیرواسکن (EchoSens, Paris, France) توسط فوق تخصص گوارش مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج فیروز به صورت کیلوپاسکال (kPa) گزارش شد و بر اساس cutoff value Tschoatzis و همکاران (۱۴) مطالعه برای وجود فیروز kPa ۶ در نظر گرفته شد. برای بررسی استئاتوز از تست (CAP; Controlled Attenuation Parameter) شده که نتایج به صورت (dB/m) گزارش گردید. سطوح سرمهی ALT و AST در تمام شرکت کنندگان مورد سنجش قرار گرفت. همچنین سونوگرافی جهت ارزیابی اکوژنیستیه کبد در بیماران انجام شد.

آنالیز آماری: تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ انجام شد. جهت بررسی نرمال بودن داده‌های کمی از آزمون Kolmograph - Smirnov استفاده شد. متغیرهای کیفی به صورت فراوانی (درصد)، متغیرهای کمی با توزیع نرمال با میانگین (انحراف معیار) و متغیرهای کمی با توزیع غیر نرمال با میانه (صدک ۷۵ - ۲۵) توصیف شدند. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای کمی و کیفی با فیروز کبدی به ترتیب از آزمون t مستقل (یا معادل ناپارامتریک آن یعنی آزمون من ویتنی) و آزمون مجذور کای استفاده شد. سپس مدل‌سازی با استفاده از رگرسیون لجستیک برای بررسی روابط بین متغیرها با هدف کنترل مخدوش گرهای احتمالی صورت گرفت. مقدار p.value کمتر از ۰/۰۵ به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

ویژگی‌های دموگرافیک، بالینی و بیوشیمیایی برای کلیه بیماران شرکت کننده در مطالعه در جدول ۱ نشان داده شده است. میانگین سنی بیماران $۵۲/۵۳ \pm ۹/۹۵$ با حداقل ۳۰ و

رسید (No. IR.MUK.REC.1396/297). از تمامی افراد شرکت کننده در مطالعه رضایت آگاهانه اخذ گردید و اصول محروم‌گی داده‌ها بر اساس معاهده هلسینکی توسط پژوهشگران رعایت شد.

شرکت کنندگان: معیارهای ورود به مطالعه شامل افراد مبتلا به RA (بر اساس معیارهای پیشنهادی سال ۲۰۱۰ انجمن روماتولوژی آمریکا / اتحادیه اروپایی علیه روماتیسم (ACR- EULAR) (۱۳)، تحت درمان با متotropicat کسات که بالای ۱۸ سال سن داشتند و حداقل ۶ ماه از درمان آن‌ها گذشته بود، مدنظر قرار گرفت. چنانچه در افراد علائم و نشانه‌های دیابت، سابقه ابتلا به بیماری‌های مزمن کبدی مانند هپاتیت‌های ویروسی و اتوایمیون، ایدز، نارسایی مزمن کلیه، نارسایی احتقانی قلب، سابقه مصرف (BMI) الكل بیش از ۱۰ گرم در روز و اضافه وزن (> ۲۸) وجود داشت از مطالعه حذف شدند.

روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد و از بین مراجعین دارای شرایط ورود به مطالعه با ایجاد چهارچوب نمونه‌گیری و دادن شماره‌ای به هر بیمار با استفاده از جدول اعداد تصادفی، انتخاب نمونه‌ها صورت گرفت. بر این اساس ۵۱ نفر بیمار وارد مطالعه شدند.

جمع آوری اطلاعات دموگرافیک و بالینی: داده‌های دموگرافیک، مدت زمان ابتلا به بیماری، مدت زمان مصرف MTX و دوز تجمیعی مصرف MTX توسط پزشک معالج با استفاده از پرسشنامه از بیماران جمع آوری گردید. میزان فعالیت بیماری بر اساس فرمول ۲۸ سنجیده شد که بر اساس تعداد مفاصل دارای تندرنس، تعداد مفاصل دارای ت سورم، میزان (ESR; Erythrocyte Sedimentation Rate (VAS; Visual Analog Scale) استفاده از روش (Sedimentation Rate محاسبه و ثبت گردید. فشار خون بر حسب (mmHg) نیز با فشارسنج دیجیتالی (Osaka, Japan) توسط پزشک معالج در همه شرکت کنندگان اندازه گیری شد.

بیمار مشاهده گردید. در یک نفر از این ۱۱ بیمار، فیبروز قابل توجه ($\text{FibroScan} > 7.2 \text{ kPa}$) و در دو نفر فیبروز شدید ($\text{FibroScan} > 9/6 \text{ kPa}$) مشاهده شد. هنگامی که بیماران بر اساس وجود فیبروز کبدی در آنها به ۲ گروه تقسیم شدند، سطح سرمهی ALT ($P < 0.01$) ، AST ($P = 0.01$) و وجود کبد چرب (تائید شده توسط سونوگرافی) ($P = 0.04$) در بیمارانی که فیبروز کبدی داشتند به طور معنی داری بیشتر از گروه دیگر بود. در حالی که در مقایسه دوز تجمیعی MTX ($P = 0.21$) و مدت زمان مصرف MTX ($P = 0.30$) در بین دو گروه اختلاف معنی داری مشاهده نشد (جدول ۲). نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک چند متغیره نشان داد که با افزایش میزان ALT، شانس بروز فیبروز در بیماران مبتلا به RA که تحت درمان با MTX هستند افزایش می‌یابد (OR = 1.07; 95% CI: 1.01 to 1.13; p = 0.01) (جدول ۳).

حداکثر ۶۸ سال بود. اکثر آنها (۸۶/۳٪) زن بودند. میانگین مدت زمان ابتلاء به بیماری در آنها ۶ سال (در محدوده ۲ تا ۹ سال) و میانه (صد ک ۷۵-۲۵) فعالیت بیماری اندازه گیری شده بر اساس DAS28 در بیماران (۲۰/۲-۳/۲۰) در ۱/۸۰-۳/۲۰ محاسبه گردید.

میانه (صد ک ۷۵-۲۵) سفتی کبد اندازه گیری شده در کلیه بیماران تحت درمان با MTX (۵/۵۰-۴/۷۰) کیلوپاسکال محاسبه گردید. دوز تجمیعی مصرف MTX در ۴۵ نفر از بیماران (۲/۸۸٪) کمتر از ۴۰۰۰ میلی گرم و در ۶ بیمار (۸/۱۱٪) بیش از ۴۰۰۰ میلی گرم بود. همچنین میانگین مدت زمان مصرف دارو در بیماران مورد مطالعه، ۵۴/۱۴ ± ۴۰/۹۴ ماه بود.

در بررسی رابطه بین متغیرهای مورد بررسی با فیبروز کبدی، نتایج نشان داد که وجود فیبروز کبدی که با مقدار سفتی کبد اندازه گیری شده در فیرواسکن برابر یا بیشتر از ۶ کیلو پاسکال در نظر گرفته شده بود در ۱۱ نفر (۶/۲۱٪) از ۵۱

جدول ۱. خصوصیات دموگرافیک، بالینی و بیوشیمیابی در بیماران مورد مطالعه

متغیرها	تمام بیماران (n=۵۱)
سن (سال)	۵۲/۵۳ ± ۹/۹۵
زن	۴۴ (۸۶/۳)
BMI, kg/m ²	۲۷/۰۲ ± ۳/۷۴
ALT, IU/L	۲۴/۰۰ (۱۸/۰۰-۳۱/۰۰)
AST, IU/L	۲۰/۰۰ (۱۶/۰۰-۲۷/۰۰)
ALK, IU/L	۱۶۳/۰۲ ± ۵۲/۷۸
DAS28	۲/۳۰ (۱/۸۰- ۳/۲۰)
مدت زمان مصرف MTX (ماه)	۵۴/۱۴ ± ۴۰/۹۴
سفتی کبد (kPa)	۴/۷۰ (۳/۶۰- ۵/۵۰)
استناتوز کبد (dB/m)	۲۳۴/۳۳ ± ۵۷/۳۳
کبد چرب (تائید شده توسط سونوگرافی)	۱۱ (۲۱/۶)
هپر تانسیون	۱۹ (۳۷/۳)

جدول ۲. مقایسه‌ای خصوصیات دموگرافیک، بالینی و بیوشیمیابی بین دو گروه از بیماران (بر اساس اندازه گیری سفتی کبد)

p-value	نمره فیبرواسکن		متغیرها
	(<۶) (n=۴۰)	(≥۶) (n=۱۱)	
.۰/۵۱	۵۲/۰.۵±۱۰/۰۶	۵۴/۲۷±۹/۸۱	سن (سال)
.۰/۴۷	۳۵/۵	۹/۲	جنسيت (مرد: زن)
.۰/۱۸	۲۶/۶۵±۳/۶۶	۲۸/۳۵±۳/۹۲	BMI (kg/m2)
.۰/۵۳	۶/۵۰ (۲/۲۵ - ۹/۰۰)	۵/۰۰ (۱/۰۰ - ۹/۰۰)	مدت زمان ابتلا به بیماری (سال)
.۰/۲۱	۳۴ (.۰/۸۵)	۱۱ (۱۰۰%)	دوز تجمیعی MTX
	۶ (.۰/۱۵)	.	>۴۰۰۰ mg
.۰/۳۰	۵۷/۲۵±۴۳/۲۹	۴۲/۸۲±۲۹/۸۸	مدت زمان مصرف MTX (ماه)
<.۰/۱	۴/۴۵ (۳/۴۵ - ۴/۸۰)	۶/۸۰ (۶/۷۰ - ۹/۵۰)	سفتی کبد (kPa)
.۰/۸۵	۲/۲۵ (۱/۸۰ - ۳/۲۰)	۲/۴۰ (۱/۶۰ - ۳/۱۰)	DAS ۲۸
<.۰/۱	۲۲/۰۰ (۱۶/۲۵ - ۳۰/۰۰)	۲۸/۰۰ (۲۷/۰۰ - ۴۵/۰۰)	ALT, IU/L
.۰/۰۱	۱۹/۵۰ (۱۶/۰۰ - ۲۵/۰۰)	۲۷/۰۰ (۲۰/۰۰ - ۳۱/۰۰)	AST, IU/L
.۰/۲۸	۱۵۸/۸۲±۵۳/۴۹	۱۷۸/۲۷±۴۹/۴۷	ALK, IU/L
.۰/۰۵	۱۱۵/۰۰ (۱۱۰/۰۰ - ۱۲۷/۵۰)	۱۳۰/۰۰ (۱۱۰/۰۰ - ۱۵۰/۰۰)	فشار خون سیستولیک (mmHg)
.۰/۸۱	۷۰/۰۰ (۷۰/۰۰ - ۸۰/۰۰)	۷۰/۰۰ (۷۰/۰۰ - ۸۰/۰۰)	فشار خون دیاستولیک (mmHg)
.۰/۱۶	۱۳ (.۰/۳۲/۵)	۶ (.۰/۵۶/۵)	هیپرتانسیون
.۰/۰۴	۶ (.۰/۱۵)	۵ (.۰/۴۵)	کبد چرب (تائید شده توسط سونوگرافی)
.۰/۱۶	۲۲۸/۵۵±۴۰/۲۴	۲۵۵/۹۱±۶۲/۲۸	استئاتوز کبد (dB/m)

جدول ۳. نتایج مربوط به تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک چند متغیره در مورد عوامل خطر مرتبط با فیروز کبدی

Pvalue	95% confidence interval (CI)	OR	متغیرهای مستقل
.۰/۱۲	.۰/۹۹ - ۱/۰۶	۱/۰۳	فشار خون سیستولیک
			بله / خیر
.۰/۲۷	.۰/۴۶ - ۱۵/۰۱	۲/۶۴	کبد چرب (تائید شده توسط سونوگرافی)
.۰/۸۰	.۰/۹۰ - ۱/۱۵	۱/۰۱	AST
.۰/۰۱	۱/۰۱ - ۱/۱۳	۱/۰۷	ALT

مطالعه برخلاف دو مطالعه قبلی افراد چاق و مصرف کننده الكل نیز مورد بررسی قرار گرفته بودند(۱۸)。 در مطالعه حاضر نیز مصرف طولانی مدت دارو با افزایش ریسک فیبروز کبدی در یافته های فیروساکن همراه نبود که با مطالعات انجام شده فوق همخوانی دارد.

در مطالعه حاضر در ۳ نفر (۰.۳٪) از بیماران فیبروز FibroScan score قابل توجه و شدید مشاهده گردید(۱۹) >7.2 Kappa در هیچ کدام از آن ها سیروز مشاهده نشد. در مطالعه مشابه نیز از ۱۶۰ بیمار مبتلا به RA تحت درمان طولانی مدت با MTX با میانه مصرف دوز تجمیعی (range ۲۳۴۰, ۱۸,۲۰۰ mg; IQR ۲۷۹۵) میلی گرم (۲۲۲۵، تنها در ۱۲ نفر (۰.۷٪) از آن ها فیبروز قابل توجه گزارش شد(۲۰)؛ بنابراین، بروز فیبروز شدید کبدی یا سیروز اندازه گیری شده در TE همانند مطالعه ما شایع نیست.

از طرفی در تعدادی از مطالعات انجام شده نیز در بیماران با مصرف طیف گسترده MTX از ۱۱۲۵ میلی گرم که تحت بیوپسی کبد قرار گرفته، فیبروز کبدی قابل توجه و سیروز کبد گزارش نشده است(۲۱-۲۲)؛ بنابراین یافته های این مطالعه با دیگر مطالعات که در آن فیبروز کبدی با بیوپسی سوزنی ارزیابی شده است تأیید می شود. با توجه به یافته های این مطالعه و دیگر مطالعات ذکر شده، به نظر می رسد که فیبروز کبدی قابل توجه یا سیروز کبد یک نگرانی عمده در درمان با MTX نیست. همچنین TE می تواند به عنوان یک ابزار غیر تهاجمی برای ارزیابی فیبروز کبدی مفید باشد.

شیوع پایین فیبروز قابل توجه را می توان توسط عوامل مختلفی توضیح داد. به نظر می رسد مکمل اسیدوفولیک باعث کاهش بروز افزایش در ترانس آمینازها می شود(۲۵). استفاده از دوز کمتر و مصرف هفتگی به صورت هفتگی دیگر عوامل است. مصرف دوز پایین به صورت هفتگی MTX ممکن است درجه کمتری از آسیب کبدی را ایجاد کند و زمان کافی برای کبد جهت بهبود و بازسازی

بحث

تأثیر مصرف طولانی مدت MTX بر فیبروز کبد همچنان بحث برانگیز است(۱۶)。 در مطالعه حاضر میزان سفتی کبد در ۵۱ نفر از بیماران مبتلا به RA که به طور میانگین (۴۰/۹۴±۵/۴) ماه (با حداقل و حداکثر ۶ تا ۱۸۰ ماه) تحت درمان با مصرف هفتگی MTX بودند، توسط متداشتگرافی گذرا مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های اصلی این مطالعه حاکی از این است که افزایش مدت زمان مصرف و دوز تجمیعی MTX تأثیری در بروز فیبروز کبدی ندارد؛ اما شانس بروز فیبروز کبدی با افزایش میزان ALT، افزایش می باشد و تفاوت معنی داری در مقادیر ALT سرمه بین بیماران با و بدون فیبروز کبد وجود دارد. Park و همکاران (۲۰۱۰) در مطالعه ای بر روی ۱۷۷ بیمار مبتلا به RA که تحت درمان با MTX به مدت بیش از سه سال بودند، افراد از نظر داشتن فیبروز کبدی توسط TE مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران در این مطالعه از نظر مصرف دوز تجمیعی دارو به دو گروه دریافت کننده دوز کمتر و بیشتر از ۴۰۰۰ میلی گرم تقسیم شدند. ارتباط معنی داری بین میزان درجه سفتی کبد (کاپا) در دو گروه مشاهده نشد. همچنین بین میزان درجه سفتی کبد اندازه گیری شده با TE و دوز تجمیعی مصرف دارو ارتباط معنی داری مشاهده نشد اما همبستگی معنی داری بین مقادیر Kumar سفتی کبد با AST وجود داشت(۱۲)。 در مطالعه و همکاران (۲۰۱۸) شامل ۱۶۰ بیمار مبتلا به RA که به مدت بیش از ۵ سال تحت درمان با دوز کم MTX بودند، ارتباط معنی داری بین مدت زمان مصرف و دوز تجمیعی دارو با فیبروز کبدی بررسی شده توسط TE مشاهده نشد(۲۰) Ghanaei و همکاران (۲۰۱۷) نیز با بررسی کبد TE ۱۰۱ نفر از بیماران مبتلا به پسوریاژیس و RA توسط TE که حداقل دو سال تحت درمان با متotropicas بودند، ارتباط معنی داری بین وجود فیبروز کبدی با دوز تجمیعی و مدت زمان مصرف متotropicas مشاهده نکردند. در این

بود. با توجه به عدم انجام فیبرو اسکن قبل از شروع درمان در بیماران تغییرات ایجاد شده در میزان سفتی کبدی در طی دوره درمان امکان پذیر نبود.

آسیب وجود داشته باشد(۲۶ و ۲۷). مصرف بیش از حد الکل، چاقی، وجود دیابت به عنوان عوامل خطر تأثیرگذار برای توسعه فیروز پیش رونده کبدی در بیماران مبتلا به RA که MTX دریافت می کنند شناخته شده اند(۳۱-۲۸) که در این مطالعه افرادی که این شرایط را دارا بودند از مطالعه خارج شده اند. TE (Fibroscan®) یک تست قابل اعتماد در ارزیابی فیروز و سیروز کبدی با اندازه گیری سفتی کبد با حساسیت ۶۰٪ و ویژگی ۸۰٪ در بیماران مبتلا به HCV، NASH و HBV و RA می باشد(۲۲ و ۲۸). با این حال چاقی و میزان بالای ALT سبب کاهش حساسیت این متند در شناسایی فیروز می شوند. ALT بیش از دو برابر طبیعی می تواند در اندازه گیری TE تداخل ایجاد کند(۳۴). در مطالعه ما سطح ALT در هیچ کدام از بیماران دو برابر حد نرمال نبود. در نتیجه مقادیر سفتی کبد تحت تأثیر سطح ALT نمی باشد.

نتایج مطالعه ما نشان داد که افزایش ALT یک عامل خطر مستقل برای افزایش میزان سفتی کبد اندازه گیری شده توسط TE می باشد و می تواند بیانگر این باشد که این نشانگر بیولوژیکی می تواند در پیش بینی افزایش سفتی کبد و پیشرفت فیروز کبدی کمک کننده باشد. یکی از محدودیت های مطالعه این بود که هیچ کدام از بیماران مورد مطالعه تحت بیوپسی کبدی قرار نگرفتند تا نتایج فیروواسکن با ارزیابی های بافت شناسی انتظام داده شود. از دیگر محدودیت های این مطالعه عدم وجود گروه کنترل و مقایسه نتایج فیروواسکن آنها با افراد تحت درمان

تشکر و قدردانی

این مقاله حاصل پایان نامه با عنوان «بررسی میزان فیروز کبد به وسیله فیروواسکن و ارتباط آن با دوز دارو و شدت بیماری در بیماران آرتربیوت روماتوئید تحت درمان با متورکسات» در بیماران آرتربیوت روماتوئید تحت درمان با متورکسات در IR.MUK.REC.1396/297 مقطع دستیاری با کد اخلاق سمیره رمضانی که با حمایت مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شده است.

References

- Turesson C, Matteson EL. Management of extra-articular disease manifestations in rheumatoid arthritis. *Curr Opin Rheumatol*. 2004; 16(3):206-11.
- Guo Q, Wang Y, Xu D, Nossent J, Pavlos NJ, Xu J. Rheumatoid arthritis: pathological mechanisms and modern pharmacologic therapies. *Bone Res*. 2018; 6:15 .
- Weinblatt ME. Methotrexate in rheumatoid arthritis: a quarter century of development. *Trans Am Clin Climatol Assoc*. 2013;124:16-25.
- Smolen JS, Landewé R, Breedveld FC, Buch M, Burmester G, Dougados M, et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs: 2013 update. *Ann Rheum Dis*. 2014; 73(3):492-509.

- 5.Singh JA, Furst DE, Bharat A, Curtis JR, Kavanaugh AF, Kremer JM, et al. 2012 update of the 2008 American College of Rheumatology recommendations for the use of disease-modifying antirheumatic drugs and biologic agents in the treatment of rheumatoid arthritis. *Arthritis Care Res (Hoboken)*. 2012; 64(5):625-39.
- 6.Aithal GP. Hepatotoxicity related to antirheumatic drugs. *Nat Rev Rheumatol*. 2011; 7(3):139.
- 7.Baghbanian M, Amirbaigy MK, Salmanroghani H, Baghbanian A. Methotrexate Hepatotoxicity the Danger Not to Be Ignored. *SSU_Journals*. 2013; 21(2):257-64.
- 8.Te Helen S, Schiano TD, Kuan SF, Hanauer SB, Conjeevaram HS, Baker AL. Hepatic effects of long-term methotrexate use in the treatment of inflammatory bowel disease. *The Am J Gastroenterol*. 2000; 95(11):3150-6.
- 9.Castera L. Invasive and non-invasive methods for the assessment of fibrosis and disease progression in chronic liver disease. *Best Pract Res Clin Gastroenterol*. 2011; 25(2):291-303.
- 10.Jung KS, Kim SU. Clinical applications of transient elastography. *Clin Mol Hepatol*. 2012; 18(2):163.
- 11.Arena U, Stasi C, Mannoni A, Benucci M, Maddali-Bongi S, Cammelli D, Assarat A, Marra F, Pinzani M. Liver stiffness correlates with methotrexate cumulative dose in patients with rheumatoid arthritis. *Dig Liver Dis*. 2012; 44(2):149-53.
- 12.Park SH, Choe JY, Kim SK. Assessment of liver fibrosis by transient elastography in rheumatoid arthritis patients treated with methotrexate. *Joint Bone Spine*. 2010; 77(6):588-92.
- 13.Villeneuve E, Nam J, Emery P. 2010 ACR-EULAR classification criteria for rheumatoid arthritis.
- 14.Tsochatzis EA, Gurusamy KS, Ntaoula S, Cholongitas E, Davidson BR, Burroughs AK. Elastography for the diagnosis of severity of fibrosis in chronic liver disease: a meta-analysis of diagnostic accuracy. *J Hepatol*. 2011; 54(4):650-9.
- 15.Bray AP, Barnova I, Przemioslo R, Kennedy C. Liver fibrosis screening for patients with psoriasis taking methotrexate: a cross-sectional study comparing transient elastography and liver biopsy. *Br J Dermatol*. 2012;166(5):1125-7.
16. Tang H, Neuberger J. Methotrexate in gastroenterology—dangerous villain or simply misunderstood? *Aliment Pharmacol Ther*. 1996 Oct;10(6):851-8.
- 17.Kumar A, Vasdev V, Manrai M, Bhayana A, Hegde A, Arjun MN, Kishore K. Assessment of hepatic fibrosis in patients with rheumatoid arthritis on long-term methotrexate therapy using transient elastography. *Indian J Rheumatol*. 2018; 13(4):246.
18. Mansour-Ghanaei F, Erfani A, Shafaghi A, Joukar F, Hajiabasi A, et al. Transient Elastography in Methotrexate Administered Patients. *Hepat Mon*. 2017; 17(8):e57917.
19. Kremer JM, Tolman K, Samowitz W. Long-term prospective sequential liver biopsies in patients with rheumatoid arthritis on weekly oral methotrexate. *Arthritis Rheum*. 1990;33(suppl 9):S40.
- 20.Brick JE, Moreland LW, Al-Kawas F, Chang WW, Layne RD, DiBartolomeo AG. Prospective analysis of liver biopsies before and after methotrexate therapy in rheumatoid patients. InSeminars in arthritis and rheumatism 1989 Aug 1 (Vol. 19, No. 1, pp. 31-44). WB Saunders.
- 21.Rau R, Karger T, Herborn G, Frenzel H. Liver biopsy findings in patients with rheumatoid arthritis undergoing longterm treatment with methotrexate. *J Rheumatol*. 1989; 16(4):489-93
22. Sherry WJ, Polisson RP, Caldwell DS, Rice JR, Pisetsky DS, Allen NB. Methotrexate-associated hepatotoxicity: retrospective analysis of 210 patients with rheumatoid arthritis. *Am J Med*. 1988; 85(6):771-4.

23. Willkens RF, Leonard PA, Clegg DO, Tolman KG, Ward JR, Marks CR, et al. Liver histology in patients receiving low dose pulse methotrexate for the treatment of rheumatoid arthritis. *Ann Rheum Dis.* 1990; 49(8):591-3.
24. Kremer JM, Lee RG, Tolman KG. Liver histology in rheumatoid arthritis patients receiving long-term methotrexate therapy. A prospective study with baseline and sequential biopsy samples. *Arthritis Rheum.* 1989; 32(2):121-7.
25. Van Ede AE, Laan RF, Rood MJ, Huizinga TW, Van De Laar MA, Denderen CJ, et al. Effect of folic or folinic acid supplementation on the toxicity and efficacy of methotrexate in rheumatoid arthritis: A forty-eight-week, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study. *Arthritis Rheum.* 2001 Jul;44(7):1515-24.
26. Hall PD, Jenner MA, Ahern MJ. Hepatotoxicity in a rat model caused by orally administered methotrexate. *Hepatol.* 1991;14:906-10.
27. Kaplan MM. Methotrexate hepatotoxicity and the premature reporting of Mark Twain's death: Both greatly exaggerated. *Hepatol.* 1990;12:784-6.
28. Laharie D, Zerbib F, Adhoute X, Boue-Lahorgue X, Foucher J, Castera L, et al. Diagnosis of liver fibrosis by transient elastography (FibroScan) and non-invasive methods in Crohn's disease patients treated with methotrexate. *Aliment Pharmacol Ther.* 2006; 23(11): 1621 -8.
29. Schmajuk G, Miao Y, Yazdany J, Boscardin WJ, Daikh DI, Steinman MA. Identification of risk factors for elevated transaminases in methotrexate users through an electronic health record. *Arthritis Care Res (Hoboken).* 2014; 66:1159-1166.
30. Salliot C, van der Heijde D. Long-term safety of methotrexate monotherapy in patients with rheumatoid arthritis: a systematic literature research. *Ann Rheum Dis.* 2009; 68:1100-1104.
31. Sotoudehmanesh R, Anvari B, Akhlaghi M, Shahraeeni S, Kolahdoozan S. Methotrexate hepatotoxicity in patients with rheumatoid arthritis. *Middle East J Dig Dis.* 2010; 2:104-109
32. Berends MA, Snoek J, de Jong EM, et al. Liver injury in long-term methotrexate treatment in psoriasis is relatively infrequent. *Aliment Pharmacol Ther.* 2006; 24:805 -811
33. Maybury CM, Jabbar-Lopez ZK, Wong T, Dhillon AP, Barker JN, Smith CH. Methotrexate and liver fibrosis in people with psoriasis: a systematic review of observational studies. *Br J Dermatol.* 2014;171:17-29.
34. European Association for the Study of the Liver. EASLE-ALEH Clinical practice guidelines: non-invasive tests for evaluation of liver disease severity and prognosis. *J Hepatol.* 2015; 63:237-264.