

Prevalence of menstrual disorders and its related factors in the students of Kurdistan University Of Medical Science in 2018

Roonak Shahoei¹, Bijan Nouri², Nazila Darvishi³, Khadijeh Rezaie⁴, Hiva Zandi⁵, Sheno Bayazidi⁶, Fatemeh Khezrnezhad⁷

1. Associate Professor of Midwifery Education, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran. ORCID ID: 0000-0002-5509-4257
2. Assistant Professor of Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for Health Development, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran. ORCID ID: 0000-0002-2932-5058
3. MD, PhD of Nutrition, Sanandaj, Iran. ORCID ID: 0000-0003-1597-0838
4. Midwifery student, Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran. ORCID ID: 0000-0002-2094-6966
5. Public health student, Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran. ORCID ID: 0000-0002-7369-2939
6. Msc student of Epidemiology, Student Research Committee, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. ORCID ID: 0000-0001-6167-3688
7. Public health student, Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran., (Corresponding Author), Tel: 988138398609, Email: f.xezrnezhad72@gmail.com, ORCID ID: 0000-0003-1378-9613

ABSTRACT

Background and Aim: Menstrual disorders are one of the most common complaints of women, they have a wide range including delayed periods to painful periods. They are common and benign and can lead to decreased quality of life. The aim of this study was to determine the prevalence of menstrual disorders and its related factors in the students of Kurdistan University of Medical Sciences.

Material and Method: This was a descriptive-analytical study. The statistical population included students of Kurdistan University of Medical Sciences. We used cluster sampling and selected 300 students. Research tools included a questionnaire consisted of 10 demographic questions, 26 main questions and a chart for measurement of the amount of menstrual bleeding in a period. Data were introduced into STATA 12 and SPSS 22 softwares and analyzed by independent t-test, χ^2 and Fisher's test.

Results: The prevalence of menstrual disorders in the study population was 15.3%. The most and least common disorders were dysmenorrhea and hypomenorrhea. Dysmenorrhea had significant relationships with, body mass index ($P = 0.044$) and age ($P = 0.021$). There was also a significant relationship between marital status and mastalgia ($P = 0.015$). We found a significant relationship between menorrhagia and age ($P = 0.026$), and also between hypermenorrhea and age ($P = 0.045$).

Conclusion: The results of this study showed presence of at least one type of menstrual disorder among the students of Kurdistan University of Medical Sciences as an example of society, which is a threat to the individual and social life of women and girls.

Keywords: Menstrual Disorders, Related Factors, Student, Kurdistan

How to cite the article: Roonak Shahoei, Bijan Nouri, Nazila Darvishi, Khadijeh Rezaie, Hiva Zandi, Sheno Bayazidi, Fatemeh Khezrnezhad. Prevalence of the Menstrual Disorders and its Related Factors in Students of Kurdistan University of Medical Sciences in 2018. JKU. 2020;25(4):31-41.

شیوع اختلالات قاعده‌گی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان
در سال ۱۳۹۷

روناک شاهویی^۱، بیژن نوری^۲، نازیلا درویشی^۳، خدیجه رضایی^۴، هیوا زندی^۵، شنو پاییزیدی^۶، فاطمه خضرانزاد^۷

۱. دانشیار آموزش مامایی، گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. کد ارکید: ۴۲۵۷-۴۹۰۶-۵۵۰۲-۰۰۰۰-۰۰۰۰
 ۲. استاد بار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. کد ارکید: ۵۰۵۸-۵۰۳۲-۲۹۳۲-۰۰۰۰-۰۰۰۰
 ۳. پژوهشکار دکتری تخصصی (PhD) تغذیه، سنندج، ایران. کد ارکید: ۰۸۳۸-۱۵۹۷-۰۳-۰۰۰۰-۰۰۰۰
 ۴. دانشجوی رشته مامایی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. کد ارکید: ۶۹۶۶-۰۹۴-۲۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰
 ۵. دانشجوی رشته بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. کد ارکید: ۲۹۳۹-۷۳۶۹-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰
 ۶. دانشجوی رشته اپیدمیولوژی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران. کد ارکید: ۳۶۸۸-۱۶۶۷-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰
 ۷. دانشجوی رشته بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران (نویسنده مستول)، تلفن: ۰۸۱-۳۸۳۹۸۶۰۹، پست الکترونیک: f.xezrnezhad72@gmail.com، کد ارکید: ۹۶۱۳-۱۳۷۸-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰

چکیدہ

زمینه و هدف: اختلالات و مشکلات قاعدگی از شایع ترین شکایات زنان می‌باشد که از سیکل‌های به تعویق افتاده تا سیکل‌های دردناک، اغلب شایع و خوش‌خیم و دارای طیف وسیعی می‌باشند که باعث کاهش کیفیت زندگی این بیماران می‌باشند. هدف از این مطالعه تعیین شیوه‌های پیشگیری از اختلالات قاعدگی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است و جامعه آماری آن را دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرستان تشکیل می‌دهد، نمونه‌گیری از نوع خوشه‌ای بوده و با این روش تعداد ۳۰۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید، ابزار پژوهش شامل؛ پرسشنامه‌ای مشکل از ۱۰ سوال دموگرافیک و ۲۶ سوال اصلی و چارت مربوط به اندازه گیری میزان خونریزی قاعدگی در یک دوره پریودی بود. تحلیل داده‌ها با نرم افزار آماری STATA نسخه ۱۲ و SPSS نسخه ۲۲ انجام شد و توسط آزمون های تی مستقل، χ^2 و Fisher-Test تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: شیوه اختلالات قاعدگی در جمعیت مورد مطالعه $\frac{1}{3}$ درصد بوده که بیشترین اختلال دیسمنوره ($\frac{75}{33}$ درصد) و کمترین هایپومنوره ($\frac{1}{33}$ درصد) بود. نتایج مطالعه،

رابطه معنی داری بین دیسمنوره و شاخص توده بدنی ($P=0.021$) و سن ($P=0.044$) نشان داده شد. همچنین رابطه معنی داری بین وضعیت تاهمل - ماستالژی ($P=0.015$)، منوراژی - سن ($P=0.026$) و هایپرمنوره - سن ($P=0.045$) وجود داشت.

نتیجه گیری: نتایج کلی مطالعه حاضر نشان داد که حداقل یکی از انواع اختلالات قاعده‌گی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان به عنوان نمونه ای از جامعه، وجود دارد که این تهدیدی برای زندگی فردی و اجتماعی زنان و دختران می‌باشد.

کلمات کلیدی: اختلالات قاعده‌گی، عوامل مرتبط، دانشجو، کردستان

وصول مقاله: ۹۸/۴/۷ اصلاحیه نهایی: ۹۹/۳/۱۰ پذیرش: ۹۹/۳/۱۷

وجود دیسمونره یکی از عوامل اصلی مختل کننده کیفیت زندگی و فعالیتهای اجتماعی زنان جوان می‌باشد.^(۱۳، ۱۴) درد قاعده‌گی در تعدادی از زنان منجر به اختلال در انجام امور از جمله خانه‌داری، دشواری در انجام امور شغلی و فعالیتهای مربوط به تحصیل در طی چند روز در هر سیکل قاعده‌گی می‌شود. همچنین این درد می‌تواند منجر به از دست رفتن زمان مطالعه و تحصیل و کار در زنان به خصوص در سنین نوجوانی گردد.^(۱۱) الیگومونره زمانی رخ می‌دهد که فواصل بین سیکل‌های قاعده‌گی بیش از ۳۵ روز طول بکشید یا تعداد سیکل‌ها ۵-۷ بار در یک سال باشد. در دهه‌های اخیر به دلیل تغییر سبک زندگی، افزایش شیوع چاقی، کاهش فعالیت فیزیکی، تغذیه ناسالم و استرس‌های عاطفی شیوع این اختلال رو به افزایش است.^(۱۶) آمنوره به قطع کامل قاعده‌گی بیش از شش ماه در زنانی که قاعده‌گی نامرتب دارند و نبود قاعده‌گی درسه سیکل متوالی در زنانی که قاعده‌گی مرتب دارند، گفته می‌شود.^(۱۷) سندرم تخدمان پلی کیستیک شایع ترین اختلال غدد داخلی زنان در دوران باروری است. تظاهرات بالینی این سندرم می‌تواند بسیار مختلف باشد به همین دلیل تعریف واحدی از وجود ندارد.^(۱۸) منوارثی به معنای از دست دادن PCOS هشتاد سی سی خون در هر سیکل قاعده‌گی است و شایعترین دلیل کم خونی فقر آهن در زنان می‌باشد.^(۱۱) وضعیت‌های پاتولوژیکی ایجاد شده ناشی از اختلالات قاعده‌گی از جمله؛ ناباروری و کاهش باروری، بدخیمی‌ها (پستان و آندومتر)، خونریزی غیرطبیعی رحمی، بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت، هیرسوتیسم، افسردگی و عوارض متعاقب آنها موجب مشکلات سلامتی دختران و زنان جوان و کاهش کیفیت زندگی آنها می‌گردد. که تشخیص و درمان به موقع آن حائز اهمیت بیشتری است.^(۱۶، ۱۷) برای رفع این مساله ابتدا باید اختلالات را شناسایی کرده و سپس آموزش‌های لازم در این زمینه جهت کاهش تنش‌های روحی احتمالی به آنها داده شود.^(۳) نتایج بررسی شیوع

مقدمه

چرخه قاعده‌گی شامل فعالیت و تعامل هورمون‌هایی است که از هیپوتالاموس، هیپوفیز و تخدمان‌ها منتشر شده و بر اندومرتی (رحم) تاثیر می‌گذارد. در الگوی طبیعی قاعده‌گی سن منارک کمتر از ۱۶ سال، طول دوره قاعده‌گی بین ۲۴ تا ۳۲ روز، طول جریان ۳-۷ روز و مقدار جریان خون در این دوره ۸۰ میلی‌لیتر است.^(۱) فاصله بین سیکل‌ها ۹۱ تا ۹۱ روز می‌باشد، زنانی که با دفعات زودتر از ۲۹ روز یکبار و یا دفعات دیرتر از ۹۱ روز یکبار قاعده می‌شوند و زنانی که به طور ثابت ۷ روز یا بیشتر خونریزی دارند و یا میزان خونریزی آن‌ها در هر ماه بیشتر از ۸۰ میلی‌لیتر است، نیاز به بررسی دارند.^(۲) اختلالات قاعده‌گی شامل سیکل‌های به تعویق افتاده تا سیکل‌های دردناک است که می‌توانند منجر به ناباروری گردد و شیوع آن در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله بیشتر است.^(۳-۸) انواع اختلالات قاعده‌گی شامل بی‌نظمی‌های قاعده‌گی (طول یا مدت زمان)، هایپرمنوره، هایپومنوره، پلیمنوره، الیگومونوره، دیسمونوره، آمنوره، منوارثی و سندرم پیش از قاعده‌گی می‌باشد.^(۹، ۸، ۱) شایع ترین علل مراجعه دختران نوجوان به مراکز بهداشتی درمانی آمنوره، خونریزی شدید و دیسمونوره است.^(۴، ۱۱، ۱۰) شیوع کلی اختلالات قاعده‌گی ۱۰-۱۵درصد ذکر شده است که در ۷۵درصد دختران الگوی طبیعی قاعده‌گی در دو سال اول پس از شروع قاعده‌گی ایجاد می‌گردد.^(۳) عوامل خطر قاعده‌گی دردناک شامل: سن کمتر از بیست سال، رژیم‌های لاغری، کاهش وزن، افسردگی، اضطراب و جدایی روابط (مانند؛ طلاق، مهاجرت، فوت افراد صمیمی و...). می‌باشد.^(۱۰) اختلالات قاعده‌گی بسته به دوره سنی دارای تشخیص‌های افتراقی است؛ بنابراین روش‌های تشخیصی و درمانی آن متفاوت می‌باشد.^(۲) شدت، مدت و نوع فرکانس تمرین ورزشی، دریافت انرژی کمتر و نوع تمرینات، ازدیگر عوامل موثر بر اختلالات قاعده‌گی زنان ورزشکار معرفی شده‌اند.^(۴)

$$n = \left(\frac{Z_{1-\alpha/2}}{d} \right)^2 p \times (1-p)$$

پرسشنامه شامل ۱۰ سوال در مورد خصوصیات دموگرافیک: (سن، وضعیت تأهل، BMI، محل سکونت، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی) و ۲۶ سوال اصلی شامل سوالات مربوط به اختلالات قاعده‌گی (دیسمنوره، پلی منوره، آمنوره، هایپومنوره، هایپرمنوره، ماستالزی، الیگومنوره، منوراژی، منومتروراژی، PCOD، سابقه عفونت تناسلی) و چارت مربوط به اندازه گیری میزان خونریزی قاعده‌گی در یک دوره پریودی بود برای تایید پایایی پرسشنامه پس از طراحی بصورت پایلوت بروی ۳۰ نفر از نمونه‌ها، از طریق آلفای کرونباخ ۰/۸۶ تایید شد. همچنین روایی پرسشنامه نیز توسط دو نفر متخصص زنان تایید گردید. در نهایت پرسشنامه توسط محققان (دو نفر کارشناس بهداشت عمومی و مامایی) به کلاس‌ها برده شد و پس از توجیه مخاطبین پر و جمع آوری گردید. برای تعیین میزان حجم خونریزی یک دوره پریودی نیز پس از کسب رضایت شفاهی از دانشجویان چارت اندازه گیری میزان خونریزی در اختیار دانشجویان قرار گرفت تا در طول یک دوره پریودی به صورت دقیق میزان خونریزی شان را اندازه گرفته و ارجاع دهنند. اطلاعات جمع آوری شده وارد نرم افزار آماری STATA نسخه ۱۲ و SPSS نسخه ۲۲ شد و توسط آزمون‌های تی مستقل، χ^2 و Fisher-Test تجزیه و تحلیل گردید.

اختلالات قاعده‌گی؛ دارای ۱۰ ستون روزانه و سه سطر مقدار خون روی نوارهای بهداشتی (به صورت کم، متوسط و شدید) و دو سطر تعداد لخته‌های خونی کوچک و بزرگ می‌باشد، هر فرد با خط چوب یا عدد مشخص می‌کند که در هر روز از پریود خود چه تعداد نوار بهداشتی و به چه مقدار خون (کم، متوسط و شدید) را مصرف می‌کند و اینکه در طول پریودی اش چه تعداد لخته خونی و باچه اندازه‌ای را

اختلالات قاعده‌گی در دانش آموزان دوره راهنمایی و دبیرستان زنجان نشان داد که ۳۷.۷ درصد از این جمیعت دارای اختلالات قاعده‌گی بودند^(۱۹). به علت شرایط سنی دانشجویی که معمولاً بین ۱۸ تا ۲۶ سال می‌باشد، پتانسیل ازدواج و باروری آنها بالاست، از طرفی زنان غالباً قاعده‌گی را دلیل سلامت باروری خود می‌دانند و اختلال آن باعث حساسیت آنها می‌شود، لذا بررسی وضعیت کلی این اختلالات در دانشجویان و انکاس آن می‌تواند بر کاهش حساسیت آنها اثر داشته باشد^(۲۰). لذا از این مطالعه تعیین شیوع اختلالات قاعده‌گی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان می‌باشد..

مواد و روش‌ها

این مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی می‌باشد. جامعه آماری و معیار رود شامل؛ کلیه دانشجویان دختر در کلیه ترم‌های تحصیلی سال ۱۳۹۷ دانشگاه علوم پزشکی کردستان مشغول به تحصیل که مایل به شرکت در مطالعه بودند را تشکیل داد. معیار خروج؛ شامل، افرادی که مایل به شرکت در تحقیق نبودند، دانشجویان باردار، دانشجویان رزیدنت (به علت عدم دسترسی)، دانشجویان دارای مشکلات تیروئیدی و یا میوم (نیروم) (به دلیل اینکه موجب بی‌نظمی قاعده‌گی و خونریزی می‌شوند) بودند. در ابتدا با دانشجویان هماهنگی شده و توضیحات لازم ارائه داده شد همچنین این اطمینان به آنها داده شده که اطلاعاتشان محترمانه خواهد ماند. روش نمونه‌گیری در این مطالعه به صورت خوش‌های با تخصیص مناسب بود. دانشگاه علوم پزشکی کردستان دارای پنج دانشکده می‌باشد که هر دانشکده یک خوش‌هه محسوب شد. با در نظر گرفتن شیوع اختلالات قاعده‌گی متوسط ۴۳/۲۵ (درصد) و سطح اطمینان ۹۵ درصد، و خطای ۵ درصد، حجم نمونه مورد نیاز جهت تحقق اهداف مطالعه با استفاده از رابطه زیر و براساس مطالعه مشابه برابر ۳۰۰ نفر بود^(۲۱).

ساکنین خوابگاهها (۵۷/۶۸ درصد) در پر کردن این پرسشنامه داشت. از نظر گروه سنی دانشجویان ۲۱ تا ۲۵ سال، (۳۹/۵۴ درصد) از نظر قد دانشجویان با قد ۱۶۱ تا ۱۷۰ سانتی متر (۰/۰۳)، از نظر وزنی گروه وزنی ۴۶ تا ۶۰ کیلوگرمی (۵۵/۵۳ درصد) بیشترین بودند؛ و در نهایت ۵۷/۰۷ درصد دانشجویان دارای BMI (نمایه توده بدنی) نرمال در محدوده ۱۸/۵-۲۵ بودند. پس از جمع آوری اطلاعات نتایج نشان داد که بیشترین اختلالات قاعده‌گی در سنین کمتر از بیست سال (۲۰-۱۸) مشاهده گردید. همچنین ارتباط بین سن و میزان شیوع اختلالات قاعده‌گی معنی دار گزارش گردید (p=۰/۰۲۶). اطلاعات تكمیلی مربوط به داده‌های دموگرافیک در جدول شماره ۱ با در نظر گرفتن

ریزش آورده شده است.

داشته است. امتیاز نهایی هرفرد با توجه به ضریب‌های مشخص شده محاسبه شد (به این ترتیب که برای نوار بهداشتی با خون کم ضریب ۱، نوار بهداشتی باخون متوسط ضریب ۵ و برای نوار بهداشتی باخون شدید ضریب ۲۰، برای لخته خون کوچک ضریب ۱، برای لخته خون بزرگ ضریب ۵ در نظر گرفته شده است)؛ در نهایت تعداد هر نوار بهداشتی با مقدارهای متفاوت خون در هر سطر جمع شد و در ضریب مخصوص به خود ضرب گردید و برای لخته‌های خونی نیز به همان صورت انجام شد و کل محاسبات را جمع کرده و امتیاز نهایی برای هرفرد بدست آمد.

یافته‌ها

با بررسی نتایج این مطالعه، از نظر ویژگی‌های دموگرافیک نشان از اکثریت بودن دانشجویان مجرد (۸۸/۹۲ درصد) و

جدول ۱. مشخصات دموگرافیک جمعیت مورد مطالعه

تعداد (درصد)	مشخصات دموگرافیک	تعداد (درصد)	مشخصات دموگرافیک
۱۳(۴/۶۱)	وزن <۴۵	۱۱۰ (۳۶/۶)	سن ≤ ۲۰
۱۵۱(۵۳/۵۵)	۴۶-۶۰	۱۵۵ (۵۴/۳۹)	۲۱-۲۵
۱۰۵(۳۷/۲۳)	۶۱-۷۵	۹(۳/۱۶)	۲۶-۳۰
۱۲(۴/۲۶)	۷۶-۹۰	۱۱(۳/۸۶)	≥ ۳۱
۱(۰/۳۵)	>۹۰		
	BMI		قد
۳۵(۱۲/۴۱)	$< ۱۸/۵$	۴(۱/۴۱)	۱۴۰-۱۵۰
۱۹۹(۷۰/۵۷)	۱۸/۵-۲۵	۷۳(۲۵/۷۰)	۱۵۱-۱۶۰
۴۲(۱۴/۸۹)	۲۶-۳۰	۱۷۹(۶۳/۰۳)	۱۶۱-۱۷۰
۵(۱/۷۷)	۳۱-۳۵	۲۸(۹/۸۶)	۱۷۱-۱۸۰
	محل سکونت		وضعیت تا هل
۱۵۴(۵۷/۶۸)	خوابگاه	۲۶۱(۹۲/۸۸)	مجرد
۱۱۳(۴۲/۳۲)	منزل	۲۰(۱۲/۷)	متاهل

خونریزی ۵ میلی لیتر بود که میانگین امتیاز اندازه خونریزی قاعده‌گی ۱۴۲/۵ محاسبه گردید. با توجه به Menstrual Assessment Chart (چارت تعیین اختلالات قاعده‌گی) و محاسبات انجام شده، امتیاز نهایی هر فرد محاسبه شده است. بیشترین مدت خونریزی قاعده‌گی ۱۰ روز و کمترین مدت ۱ روز بود و میانگین مدت خونریزی قاعده‌گی ۵/۸۲ روز گزارش شد.

همچنین میزان شیوع ابتلا به عفونت تناسلی و ادراری درصد گزارش شد. طبق یافته‌های پژوهش (جدول شماره ۲) دیسمنوره با ۷۵/۳۳ درصد دارای بیشترین شیوع، و کمترین شیوع مریوط به هایپومنوره با ۱/۳۳ درصد بود. برای اختلال آمنوره موردی یافت نشد. نتایج نشان داد که کمترین سن شروع قاعده‌گی ۱۰ سال و بیشترین سن ۱۸ سال و میانگین سن شروع قاعده‌گی افراد ۱۳ سال بود. بیشترین میزان خونریزی قاعده‌گی ۴۶۸ میلی لیتر بود و کمترین میزان

جدول ۲. توزیع فراوانی اختلالات قاعده‌گی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان

انواع اختلال	تعداد	درصد
پلی منوره	۱۵	۵
ماستالزی	۳۰	۱۰
دیسمنوره	۲۶۶	۷۵/۲۳
هایپومنوره	۴	۱/۳۳
الیگومنوره	۳۳	۱۱
منوراژی	۶۱	۲۰/۳۳
مونومتروراژی	۸	۲/۶۷
هایپرمنوره	۳۶	۱۲
PCOS	۶۳	۲۱/۲۱
آمنوره	.	.
ابتلا به عفونت تناسلی و ادراری	۷۱	۲۷

پارامترها ارتباط معنی داری با شیوع اختلالات مختلف قاعده‌گی نداشتند همچنین رابطه معنی داری بین منوراژی و سن ($P = 0.02$) و هایپرمنوره و سن ($P = 0.04$) وجود داشت. از بین افرادی که دارای الگوی طبیعی قاعده‌گی بودند ۲۸ درصد برای منظم شدن دوره قاعده‌گی خود دارو مصرف می‌کردند.

معنی دار بودن پارامترها با شیوع اختلالات قاعده‌گی در جدول شماره ۳ آورده شده است؛ همانطور که مشاهده می‌شود، ارتباط معنی داری بین میزان شیوع اختلالات قاعده‌گی با پارامترهای وضعیت تا هل، BMI، سن وجود داشت. رابطه معنی داری بین وضعیت تا هل و ماستالژی ($P = 0.01$) و همچنین بین دیسمنوره و BMI ($P = 0.04$) و دیسمنوره و سن ($P = 0.02$) وجود داشت و سایر

جدول ۳. ارتباط بین متغیرها و اختلالات قاعده‌گی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان

P value										
PCOS	هایپرمنوره	منومتروراژی	منوراژی	الیگومونوره	هایپومنوره	دیسمنوره	ماستالژی	پلی منوره	متغیر	
۰/۱۳۶	۰/۴۶۱	۰/۲۹۱	۰/۱۹۸	۰/۱۵۱	۰/۸۷۹	۰/۹۶۷	۰/۱۸۶	۰/۴۸۱	دانشکده	
۰/۳۳۷	۰/۶۲۷	۰/۰۵۹	۰/۱۳۴	۰/۵۸۰	۰/۷۰۰	۰/۰۵۹	۰/۳۶۱	۰/۲۷۰	مقطع	
۰/۹۸۰	۰/۹۱۰	۰/۱۵۹	۰/۵۱۶	۰/۴۶۲	۰/۹۷۱	۰/۶۴۰	۰/۵۳۷	۰/۴۳۴	معدل	
۰/۱۵۶	۰/۰۵۱	۰/۷۲۳	۰/۰۷۴	۰/۹۳۵	۰/۵۸۴	۰/۵۹۰	۰/۹۱۴	۰/۶۹۱	وزن	
۰/۹۴۹	۰/۵۴۸	۱/۰۰۰	۰/۵۱۳	۰/۲۰۰	۰/۲۵۶	۰/۳۵۴	۰/۸۲۰	۰/۴۸۲	قد	
۰/۲۴۶	۰/۰۸۱	۰/۲۶۹	۰/۳۱۴	۰/۱۹۳	۰/۱۵۵	۰/۰۴۴	۰/۱۵۵	۰/۷۳۲	نمایه توده بدنی	
۰/۵۳۹	۰/۰۴۵	۰/۵۴۹	۰/۰۲۶	۰/۳۷۵	۰/۹۹	۰/۰۲۱	۰/۲۶۸	۰/۸۱۱	سن	
۱/۰۰۰	۰/۳۷۲	۱/۰۰۰	۰/۱۸۶	۰/۷۰۹	۰/۹۹	۰/۰۸۷	۰/۰۱۵	۰/۹۹	وضعیت تا هل	
۰/۴۳۴	۰/۱۲۰	۱/۰۰۰	۰/۲۴۲	۰/۴۵۴	۰/۹۹	۰/۴۴۷	۰/۳۰۴	۰/۷۷۴	محل سکونت	

بحث

شایع ترین اختلال قاعده‌ی در این مطالعه دیسمنوره با شیوع ۷۵/۲۳ درصد بود که با میزان شیوع دیسمنوره در مطالعات Strinic و همکاران (۲۰۰۳)، Herlow و همکاران (۲۰۰۶)، حیدری (۱۳۹۰) و سامانی (۲۰۱۸) نیز مطابقت داشت (۲۱-۲۴). البته شواهد موجود نشان می‌دهد که شیوع دیسمنوره در دهه‌های اخیر به دلیل عوامل محیطی و ژنتیکی در حال گسترش می‌باشد. Sundell و همکاران (۱۹۹۰) معتقدند که سیکل‌های طولانی قاعده‌ی در بروز دیسمنوره مؤثر است (۲۵). علت دیسمنوره را به ترشحات پروستاگلاندین در طول سیکل‌های همراه با تخمک‌گذاری مرتبط می‌دانند (۲۶). همچنین گزارش شده است که آلدگی‌های صوتی در محیط کار، استرس‌های روانی، ورزش شدید و نوع تغذیه نیز از عوامل تأثیرگذار بر شیوع و شدت دیسمنوره می‌باشد (۲۵، ۲۳). در مطالعه کاظمی و همکاران (۲۰۱۵) نیز دیسمنوره شایع ترین اختلال بود ولی میزان شیوع آن ۶۷/۵ درصد بود (۲۷).

نتایج مطالعه نشان داد که میانگین سن شروع قاعده‌ی ۱۳ سال بود که با نتایج مطالعه فرشباف و همکاران (۱۳۹۶) (۱۲/۸۸) مطابقت داشت. اما با میانگین گروه‌های هدف نیجریه (۱۳/۷) و ایوپی (۱۶) سال تفاوت داشت که تفاوت در زمینه ژنتیکی، مسائل جغرافیایی و تغذیه می‌تواند از دلایل احتمالی توجیه این تفاوت‌ها باشد، از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند سن شروع قاعده‌ی کاهش یافته و بلوغ زودرس در حال افزایش است (۲۹، ۲۸). میزان شیوع پلی منوره در مطالعه حاضر ۵ درصد بود که تقریباً مشابه نتایج مطالعه سامانی و همکاران (۲۰۱۸) (۱۴/۶ درصد) مطابقت نداشت (۲۴، ۳۰).

بدول با نتایج مطالعه زرنشان و همکاران (۱۳۹۲) و مطالعه فتحی‌زاده و همکاران (۱۹/۱) مانند استرس، ورزش در دوره‌های متوسط BMI در ارتباط با اختلالات قاعده‌ی می‌باشد و می‌توانند دوره‌های

قاعده‌ی همراه با تخمک‌گذاری را تحت تاثیر قرار دهند (۳۰).

هیپومنوره؛ خونریزی قاعده‌ی در فواصل منظم و طول مدت کم (۲-۱ روز) می‌باشد. میزان شیوع هایپومنوره در مطالعه حاضر ۱۳۳ درصد بود که این میزان کمترین شیوع از بین کل اختلالات قاعده‌ی در گروه هدف بود. این نتیجه مشابه نتایج مطالعه شاه غیبی و همکاران (۱۳۸۸) (۳۰ درصد) بود که با نتایج مطالعه فتحی‌زاده و همکاران (۱۳۸۰) (۱۲/۹ درصد) و نتایج مطالعه سامانی و همکاران (۲۰۱۸) (۱۲/۹۴ درصد) مطابقت نداشت همکاران (۳، ۲۴، ۳۰). تفاوت در میزان خونریزی قاعده‌ی در مطالعات موجود می‌تواند به دلایل مختلف باشد. در برخی مطالعات، شیوع خونریزی بر اساس مصاحبه‌های صورت گرفته یا استفاده از پرسشنامه‌های خود گزارش شده است؛ در حالی که در برخی از مطالعات دیگر، از ابزار استاندارد مانند چارت تصویری ارزیابی خون و یا روش‌های عینی مانند hematin قلایابی استفاده می‌شود (۲۶).

میزان شیوع ماستالری در مطالعه حاضر ۱۰ درصد بود که این اختلال در مطالعات قبلی به ندرت بررسی شده و آن در مطالعه‌های متعدد متفاوت است که این از نقاط قوت مطالعه حاضر می‌باشد. مطالعه‌های انجام گرفته در خارج از کشور آن را بین ۴۱ تا ۶۹ درصد ذکر نموده‌اند. مطالعات زیادی در ایران در مورد شیوع ماستالری وجود ندارد، شارمی و همکاران شیوع این مشکل را در زنان شاغل ۱/۲۲ درصد و در افراد غیر شاغل ۷/۲۰ درصد بیان کردند (۳۱). افراد مبتلا به درد پستان دوره‌های در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به تغییرات فیروکبیوتیک پستان، اختلال در فعالیت‌های شغلی، اجتماعی و روابط خانوادگی هستند. این اختلال به صورت عدم تسلط بر خود در برخوردهای شخصی، کج خلقی، ناسازگاری و سنتی روابط عاطفی دیده می‌شود (۳۲).

همکاران (۱۳۹۷) متفاوت بود که علت این تفاوت می‌تواند مربوط به تفاوت سنی گروه‌های هدف می‌باشد (۱۷). نتایج این مطالعه میزان شیوع تخدمان پلی کیستیک را ۲۱/۲۱ درصد نشان داد که با نتایج مطالعه رحمنپور و همکاران (۱۳۸۸) (۲/۹ درصد) در دختران دیبرستانی ۱۸-۱۴ سال زنجان، متفاوت بود علت تغییر می‌تواند تفاوت در گروه هدف مطالعه و سن کم گروه هدف باشد (۱۸). در آمریکا براساس توصیه انتیتوی ملی رشد و سلامت در سال ۱۹۹۰، هیپرآندرولوژیسم یا هیپرآندرولوژنی و اختلال تخمک‌گذاری در غیاب هیپرپلازی غیرکلاسیک آدرنال، معیارهای تشخیصی بیماری به شمار می‌روند. در حالی که این معیارها در اروپا عبارت است از: وجود تخدمان‌های پر از کیست در سونوگرافی به همراه یک یا چند علامت از قبیل: الیگومنوره، هیپرآندرولوژنیسم، چاقی، افزایش تستوسترون یا LH سرم. به این دلیل شیوع بیماری در نقاط مختلف دنیا براساس معیارهای تشخیصی مورد استفاده بین ۱۷ تا ۲۲ درصد گزارش شده است (۳۳).

نتیجه‌گیری

نتایج این مطالعه نشان داد فاکتورهای سن، BMI و وضعیت تاهل از جمله مهمترین پارامترهای تاثیرگذار بر شیوع اختلالات قاعده‌گی می‌باشد. میزان شیوع اختلالات قاعده‌گی در داشجویان دانشگاه علوم پزشکی در مواردی مانند دیسمنوره دارای آمار بالایی (۷۵/۲۳ درصد) بوده و برخلاف تصور که این اختلالات بیشتر سینین جوانی را در بر می‌گیرد ثابت کرد. لذا برقراری بستر و شرایطی جهت کاهش این اختلالات می‌تواند موثر باشد. معاینات پزشکی، مدیریت استرس، تغییر سبک زندگی، رعایت بهداشت فردی، حمایت‌های خانوادگی، رژیم غذایی و آرامش روانی می‌تواند باعث کاهش این اختلالات گردد.

تشکر و قدردانی

میزان شیوع الیگومنوره در مطالعه حاضر ۱۱ درصد بود که شیوع آن در مطالعات مختلف در سطح دنیا، ۱۲-۱۵/۳ درصد و در ایران حدود ۱۵ درصد گزارش شده است (۱۶). نتایج مطالعه حاضر مشابه نتایج مطالعه شاه غیبی و همکاران (۱۳۸۸) (۱۲/۹۲ درصد) و نتایج مطالعه سامانی و همکاران (۲۰۱۸) (۱۱/۱۱ درصد بود (۲۴). ولی با نتایج مطالعه فتحی زاده و همکاران (۱۳۸۰) (۲۴/۶ درصد) در دانش آموزان ۱۴-۱۷ سال متفاوت بود (۳۰). تفاوت در درصد شیوع الیگومنوره می‌تواند مربوط به تفاوت در گروه هدف و در نتیجه تفاوت سنی جامعه نمونه و همچنین تفاوت در تعریف فاصله بین دوره‌های قاعده‌گی باشد. به طور معمول این اختلال یکی از نشانه‌های سندروم PCOS (سندروم تخدمان پلی کیستیک) است که باید پیگیری شود (۲۷).

میزان شیوع منواری در مطالعه حاضر ۲۰.۳۳ درصد بوده این پارامتر در مطالعه فتحی زاده (۱۳۸۰) هم مورد بررسی قرار گرفت که میزان شیوع آن بین ۱۱ تا ۲۵ درصد اعلام شد (۳۰). در یک بررسی بر روی کشورهای در حال توسعه Herlow و همکاران (۲۰۰۶) فراوانی خونریزی غیر طبیعی رحم بین ۵ تا ۱۵ درصد گزارش شده است و پس از آن شیوع آن با پیشرفت سن افزایش می‌یابد. مطالعات اندکی به بررسی میزان خونریزی غیرطبیعی رحم در کشورهای در حال توسعه پرداخته است. با این حال، همه آنها شیوع ۱۵ تا ۲۰ درصد را گزارش کرده‌اند (۲۲، ۳۰).

در مطالعه حاضر، الیگومنوره دارای شیوع ۱۱ درصد بود. که با نتایج مطالعه کاظمی و همکاران (۱۳۹۴) (۱۲/۳ درصد) و مطالعه مروری سامانی و همکاران (۲۰۱۸) (۱۳/۱۱ درصد) متفاوت بود (۲۴). علت تفاوت در این میزان می‌تواند مربوط به تفاوت در سن یا تفاوت در تعریف فاصله بین دوره‌های قاعده‌گی باشد (۲۷).

همچنین اختلال آمنوره در مطالعه حاضر وجود نداشت و شیوع آن صفر درصد بود که با نتایج مطالعه مکبری نژاد و

نویسنده‌گان این مقاله از معاونت تحقیقات و فناوری و کمیته

تحقیقات دانشجویی، پشتیبان مالی این پژوهه با شماره طرح

منابع

1. Eunice Olowokere A, Oginni M, Olajubu A, William A, Irinoye O. Menstrual disorders: The implications on health and academic activities of female undergraduates in a federal university in Nigeria. *J Nurs Educ.* 2014;4:126-135.
2. Mohammadi B, Azamian Jazi A , Faramarzi M and Fathollahi Shourabeh. The Effect of Aerobic Exercise Training and Detraining on Some of the Menstrual Disorders in Non-athlete Students in Lorestan Universities. *Ofogh-e-Danesh.* 2012;18(2):5-12.
3. Shahghaibi SH, Darvishi N, Yousefinejad V, Moghbel N, Shahsavari S. Investigation of the incidence rate of menstrual disorders in 17 and 18 year old high school female students in Sanandaj city. *SJKU.* 2009;14(3):20-24 Persian).
4. Zarneshan A, Salehzadeh K, Ghorbanian B, Sharabiani S, Shirpour S. The Role of Exercise Indices on Menstrual Dysfunctions in Female College Athletes. *IJOGI.* 2013;46(16):20-27 Persian)
5. Nazarpour S, KHazai K. The study of correlation between body image and coping styles with severity of primary dysmenorrhea. *Journal of Fundamentals of Mental Health.* 2013;4(56):344-55 (Persian)
6. Jalili Z, Safizadeh HR, Shamsipoor N. Prevalence of primary dysmenorrhea in college students in Sirjan, Kerman. *Payesh.* 2005;1(4) ;61-67.(Persian).
7. Teshome Shiferaw M, Wubshet M, Tegabu D. Menstrual problems and associated factors among students of Bahir Dar University, Amhara National Regional State, Ethiopia. *PAMJ.* 2014;17: 1-9.
8. Karout N. Prevalence and pattern of menstrual problems and relationship with some factors among Saudi nursing students. *J Nurs Educ.* 2015;5(12):1-8.
9. Olalekan Adebimpe W, Oludele Farinloye E, Ajao Adeleke N. Menstrual Pattern and Disorders and Impact on Quality of Life Among University Students in South-Western Nigeria. *JBCRS.* 2016; 5(1):27-32.
10. Akhavanakbari P, Ahangar Davoudi SH. Dysmenorrhea Frequency and Severity and Its Related Factors in Students of Ardabil University of Medical Science. *j.h.*2010;1(3):41-47 (Persian)
11. Soltani F, Shobeiri F. Menstrual Patterns and its Disorders in High School Girls. *IJOGI .*2011; 1(14): 28-33(Persian) .
12. Delara M, Borzuei H, Montazeri A. Premenstrual Disorders: Prevalence and Associated Factors in a Sample of Iranian Adolescents. *Iran Red Crescent Med J.* 2013;15(8):695-700.
13. Yashwant Aher J, Mahendra Rajole K. A Cross-Sectional Study of Prevalence of Dysmenorrhea among Adolescent Girls. *Sch. J. App. Med. Sci.* 2016;4(9):3421-3423.
14. Hui Cheng SH, Shih CH, Kuang Yang Y, Chen K, Chang Y, Yang Y. Factors associated with premenstrual syndrome -A survey of new female university students. *KJMS.* 2013; 29 (2):100-5.
15. Farokh-Eslamlou H, Nabilou B, Oshnoee S, Akbari E. The Prevalence Of Premenstrual Syndrome and ITS Associated Factors Among Medical Students Of Urmia University Of Medical Sciences. *Urmia Med J.*2013; 24(9):702-710 (Persian).
16. Falahat F, Tavakkoli M, Mokaberinejad R, Ayati S, Feyzabadi Z, Natural Treatment of Oligomenorrhea Based on Iranian Medicinea. *IJOGI.*2018; 21:55-66. (Persian)
17. Mokaberinejad R, Zafarqandi N, A review of the causes and effects of amenorrhea (reticulum) in traditional Iranian medicine. *ACECR.* 2018; 3(1):19-30 (Persian)

18. Rahmanpour H, Heidari R, Mousavinasab SN, Sharifi F, Fekri S. The Prevalence of Polycystic Ovarian Syndrome in 14-18 year old girls of Zanjan High Schools. *J Adv Med Biomed Res.* 2009;17(67): 79-88 (Persian).
19. Ahmadnia E, Maleki A, Moosavinasab N. Menstrual cycle pattern, its related disorders and associated factors in students of Zanjan, Iran. *Qom Univ Med Sci J.* 2014;8(2):51-58. (Persian).
20. Torkmanejad M, Mohebbi Dehnavi Z, Rad M, mohebbi dehnavi Z. Association Between Menstrual Disorders and Obesity-Related Anthropometric Indices in Female High School Students: A Cross-Sectional Study. *J SCHOOL HEALTH,* 2018; 5(2):1-8.
21. Strinic T, Bukovic D, Pavelic L, Fajdic J, Herman I, Stipic I. Anthropological and clinical characteristics in adolescent women with dysmenorrhea. *Coll Antropol.* 2003; 27(2):707-11.
22. Sibn D, Herlow. A longitudinal study of risk factors for the occurrence duration and severity of menstruan cramps in a cohort college women. *BJOG.* 2006;103:1134-1142 .
23. Haidari F, Akrami A, Sarhadi M, Mohammad Shahi M. Prevalence and Severity of Primary Dysmenorrhea and its Relation to Anthropometric Parameters . *Hayat.* 2011;17(1):70-77.
24. Oman Samani R, Almasi Hashiani A, Razavi M, Vesali S, Rezaeinejad M, Maroufizadeh S . The prevalence of menstrual disorders in Iran: A systematic review and meta-analysis. *IJRM;* 2018; 16(11):665-678.
25. Sundell G, Milsom I, Andersch B. Factors influencing the prevalence and severity of dysmenorrhoea in young women. *Br J Obstet Gynaecol.* 1990; 97(7):588-94.
26. Rostami Dovom M, Ramezani Tehrani F, Farahmand M, Hashemi S, Rezaee N, Azizi F. Prevalence of Menstrual Disorders and its Related Factors in 18-45 year-old Iranian Women in Four Selected Provinces. *Hakim Health Sys Res.* 2014;17(3):192- 199.
27. Kazemi jaliseh H, Ramezani Tehrani F, Behboudi-Gandevani S, Khalili D2, Hosseinpanah F, Azizi F. The Prevalence of Menstrual Disorders in Reproductive Aged Women and its Related Factors. *IJEM.* 2015;17(2):105-112 .
28. Farshbaf Manei Sefat F , Abolghasemi A, Barahmand U, Hajloo N, A Survey of Menstruation Pattern and Prevalence of Dysmenorrhea in Ardabil Second High School Students. *IJE* 2017;13(3):235-243.
29. Kordi M, Mohamadirizi S, Shakeri M. The Survey of menarche, dysmenorrhea and menstruation characteristics menstruation in Mashhad's high school girls in the year of 2010; *IJOGI.* 2011;15:10-18.
30. Fathizadeh N, Faraji L, Khodakarami N, Nahidi F. Investigating of menstruation disorder in the beginning of girls puberty(14-17 years old) in Tehran selecting schools. *J Shahrekord Univ Med Sci.* 2001;3(1):41-46 (Persian).
31. Sharami S, Sobhani A, Asgharnia M, Shabaani M. Prevalence of Cyclic Mastalgia and It's Relation With Age, Marriage and Employment Outside the House . *jour guilan uni med sci.* 2000; 9(33):111-116.
32. Fakhravar S, Bahrami N, Olfati F, Effect of individual counseling on pain quality in the women with cyclic mastalgia: a clinical trial. *JQUMS.* 2018; 22(4):22-30
33. Naderi T, AkbarzadehM, Dabbaghmanesh MH, Tabatabaei HR. Prevalence of various phenotypes of polycystic ovarian syndrome among high school girls of Shiraz. *JQUMS.* 2012;15(4):60-67.