

Investigation of the effect of hydroalcoholic mumie extract on expression of osteoprotegerin (OPG) and receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL)

Yosra Azizpour¹, Monireh Azizi², Khairollah Asadollahi³, Naser Abbasi⁴, Ali Aidy⁵, Elahe Karimi⁶

1. MSc of Epidemiology, Department of Epidemiology, Faculty of Health, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran. ORCID ID: 0000-0002-3875-3871

2. Assistant Professor, Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran, (Corresponding Author), Tel: 084-32235716, Email: azizi-m@medilam.ac.ir. ORCID ID: 0000-0003-3090-867X

3. Professor, Department of Social Medicine, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran. ORCID ID: 0000-0003-2797-2814

4. Associate Professor, Biotechnology and Medicinal Plants Research Center, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran. ORCID ID: 0000-0003-4457-3997

5. MSc of Biochemistry, Biotechnology and Medicinal Plants Research Center, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran. ORCID ID: 0000-0001-5624-4184

6. Assistant Professor, Biotechnology and Medicinal Plants Research Center, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Ilam University of Medical Sciences, Ilam, Iran. ORCID ID: 0000-0003-0482-1554

ABSTRACT

Background and Aim: Osteoporosis is one of the most common bone diseases that is caused by an imbalance between the activity of osteoblasts and osteoclasts. Osteoprotegerin (OPG) plays an active role in inhibiting osteoclasts by binding to the receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL). The balance in the OPG/RANKL ratio is important in bone remodeling. The current study investigated and compared the effects of mumie extract and chemical drugs on cell proliferation, expression of OPG and RANKL in MG63 cells.

Materials and Methods: The effects of 100, 200 and 300 µg/ml of mumie extract on cell proliferation, expression of OPG and RANKL in MG63 cells were investigated in experimental groups, positive and negative control groups. Data were analyzed by ANOVA test.

Results: Significant increases were observed in the proliferation of MG63 cells after exposure to 100 and 200 µg/ml concentrations of mumie extract. 200 µg/ml concentration of the extract significantly decreased the expression of RANKL and increased the expression of OPG. It also increased OPG/RANKL ratio significantly in the experimental groups, compared to those in the negative control groups. Although the effects of 100 µg/ml and 200 µg/ml concentrations were similar to each other, they showed no significant effects on the variables. 300 µg/ml concentration of the extract showed a reverse and insignificant effect.

Conclusion: 200 µg/ml concentration of mumie extract had a significant effect on the expression of two important factors in bone remodeling. Therefore, individuals susceptible to osteoporosis can use mumie extract as an alternative to chemical drugs.

Keywords: Mumie extract, Osteoporosis, Osteoblasts

Received: July 7, 2019

Accepted: Oct 26, 2019

How to cite the article: Yosra Azizpour, Monireh Azizi, Khairollah Asadollahi, Naser Abbasi, Ali Aidy, Elahe Karimi. Investigation of the effect of hydroalcoholic mumie extract on expression of osteoprotegerin (OPG) and receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand (RANKL). SJKU 2020; 24 (6): 120-129

بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی مو میابی (Mumie) بر بیان استئوپروتگرین (OPG) و گیرنده فعال فاکتور هسته ای کاپا بتا لیگاند (RANKL)

یوسفی عزیزپور^۱، منیره عزیزی^۲، خیرالله اسدالهی^۳، ناصر عباسی^۴، علی ایدی^۵، الله کریمی^۶

۱. کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران. کد ارجید: ۳۸۷۱-۲۳۸۷۵-۰۰۰۲.

۲. استادیار، گروه آناتومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران. (مؤلف مسئول)، تلفن ثابت: ۰۸۴-۳۲۲۳۵۷۱۶، پست الکترونیک: azizi.m@medilam.ac.ir کد ارجید: X-۰۸۶۷-۰۹۰-۳۰۹۰.

۳. استاد، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران. کد ارجید: ۲۸۱۴-۲۷۹۷-۰۰۰۳.

۴. دانشیار، مرکز تحقیقات زیست‌شناسی و گیاهان دارویی، گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران. کد ارجید: ۰۹۹۷-۳۴۵۷-۰۰۰۳.

۵. کارشناسی ارشد بیوشیمی، مرکز تحقیقات زیست‌شناسی و گیاهان دارویی، گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران. کد ارجید: ۴۱۸۴-۵۶۲۴-۰۰۰۱.

۶. استادیار، مرکز تحقیقات زیست‌شناسی و گیاهان دارویی، گروه فارماکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران. کد ارجید: ۱۵۵۴-۰۸۴۲-۰۰۰۳.

چکیده

زمینه و هدف: پوکی استخوان از رایج‌ترین بیماری‌های استخوانی است که به دلیل عدم تعادل فعالیت سلول‌های استئوبلاست و استئوکلاست ایجاد می‌گردد. استئو پروتگرین (OPG) با اتصال به گیرنده فعال فاکتور هسته‌ای کاپا بتا لیگاند (RANKL) سبب مهار سلول‌های استئو کلاست می‌گردد. تعادل در نسبت OPG/RANKL نقش مهمی در بازسازی استخوان دارد. در مطالعه حاضر، تأثیر مو میابی بر میزان تکثیر سلولی، بیان RANKL در سلول‌های شبه استئوبلاست MG63 در مقایسه با داروهای شیمیابی مورد بررسی قرار گرفت.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی، تأثیر غلظت‌های ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ $\mu\text{g}/\text{ml}$ عصاره مو میابی بر تکثیر سلولی، بیان OPG و RANKL در سلول‌های MG63 در گروه‌های آزمایش، کنترل مثبت و منفی بررسی گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش آماری ANOVA انجام شد.

یافته‌ها: افزایش معنی‌داری در تکثیر سلول‌ها بعد از مواجهه با دوزهای ۱۰۰ و ۲۰۰ $\mu\text{g}/\text{ml}$ مو میابی مشاهده شد. دوز ۲۰۰ $\mu\text{g}/\text{ml}$ سبب کاهش معنی‌دار بیان RANKL و افزایش معنی‌دار بیان OPG و نسبت OPG/RANKL در مقایسه با گروه کنترل منفی گردید. دوز ۱۰۰ $\mu\text{g}/\text{ml}$ مو میابی اگرچه همانند دوز ۲۰۰ $\mu\text{g}/\text{ml}$ عمل نمود؛ اما میزان تأثیر بر هیچ کدام از متغیرها معنی‌دار نبود. دوز ۳۰۰ $\mu\text{g}/\text{ml}$ نیز تأثیر معکوس غیر معنی‌داری را نشان داد.

نتیجه‌گیری: غلظت ۲۰۰ $\mu\text{g}/\text{ml}$ مو میابی تأثیر قابل توجهی بر بیان دو عامل مهم بازسازی استخوان دارد، لذا به نظر می‌رسد افرادی که در معرض پوکی استخوان قرار دارند می‌توانند از این ماده به عنوان جایگزین داروهای شیمیابی استفاده نمایند.

کلمات کلیدی: مو میابی، پوکی استخوان، استئو بلاست

وصول مقاله: ۹۸/۸/۱۶ اصلاحیه نهایی: ۹۸/۷/۲۸ پذیرش: ۹۸/۸/۴

مقدمه

ترابی نیز استفاده می شود(۹)؛ اما روش های ذکر شده به طور یقین دارای عوارض جانبی برای بیماران هستند(۱۰). استفاده از روش های سنتی، از جمله استفاده از داروهای گیاهی جزو روش هایی است که به لحاظ طبیعی بودن می توانند خطرات کمتری برای بدن داشته باشند، از جمله ای این مواد می توان ماده مویایی را نام برد. ماده مویایی در زبان هندی (Shilajit, ral-yahudi)، در زبان عربی (Myemu and mumie)، در زبان روسی (ul-musa)، در زبان فارسی (Momiai-faqurul-yahud)، در زبان آلمانی (Mumie or salhumin)، در زبان انگلیسی (Asphalt, mineral pitch، jews pitch، Asphalt)، در زبان لاتین (Asphaltum و bitumen) و در زبان سنگ های روسی به آرامی نفوذ می کند و دارای رنگ سیاه - قهوه ای یا قهوه ای رنگ پریده است(۱۲). از درهم آمیختن مواد معدنی و فیرهای گیاهی با ماتریس چسبنده (آدامس مانند) یک توده فشرده شده معدنی - گیاهی با نام مویایی ایجاد می شود که در ترکیبات خود به عنوان یک ضد التهاب دارای عناصر کلسیم، میزیم، آهن، فسفر، پتاسیم، سیلیسیم، صمغ، رطوبت، نیتروژن، اسید تانیک، اسید بنزوئیک، آدامس، آلومینیوید، گوگرد، آهن، کلرید، گلیکوزید، تعدادی از ویتامین ها، آنزیم ها و ید است(۱۳ و ۱۴). مویایی در طب سنتی برای درمان امراض مختلف از جمله بیماری های استخوانی استفاده می شود(۱۵).

لذا در این پژوهش تأثیر عصاره هیدرولکلی ماده مویایی بر میزان تکثیر سلولی، بیان استئوپروتگرین (OPG) و گیرنده فعال فاکتور هسته ای کاپا بتا لیگاند (RANKL) در سلول های MG63 در مقایسه با داروهای شیمیایی زولدرونیک اسید (بیسفسفونات) و استرادیول والرات به عنوان گروه های کنترل مثبت مورد بررسی قرار گرفته است.

بیماری پوکی استخوان با کاهش حجم توده استخوان و تغییرات در ساختار استخوان همراه است که سبب افزایش خطر شکستگی به خصوص در ناحیه ستون فقرات و ران می گردد(۱). در کاهش توده استخوانی توازن فعالیت بین سلول های استئوبلاست و استئوکلاست به هم خورده و میزان فعالیت سلول های استئوکلاست افزایش می یابد(۲). سلول های استروم ال / استئوبلاست سبب بیان گیرنده فعال فاکتور هسته ای کاپا بتا لیگاند (RANKL) می شوند. اتصال RANKL به گیرنده خود (RANK) در سطح سلول های استئوکلاست، سبب فعال شدن این سلول ها و شروع عملیات تخریب استخوان می گردد. از طرف دیگر اتصال استئوپروتگرین (OPG) بیان شده توسط سلول های استئوکلاست به RANKL، مانع از فعال شدن بیش از حد استئوکلاست می شود. حفظ نسبت OPG/RANKL برای استحکام استخوان ضروری است(۳). پوکی استخوان می تواند به صورت اولیه و یا ثانویه باشد. نوع اولیه در افراد سالخورده (هر دو جنس) و زنان یائسه رخ می دهد؛ اما شرایط خاص بالینی باعث ایجاد پوکی استخوان ثانویه می گردد و حتی می تواند گروه های جوان را نیز در گیر نماید(۲). شیوع پوکی و کاهش تراکم استخوان در ایران در زنان و مردان بالای ۵۰ سال به ترتیب ۷۰ و ۵۰ درصد ذکر شده است، که عمر مفید از دست رفته به دلیل این بیماری در ایران ۳۴ هزار سال بوده است(۴)، دامنه شیوع این بیماری در ناحیه کمری - لگنی و لگن در جهان در زنان از ۹ تا ۲۸ درصد و در مردان از ۱ تا ۸ درصد متغیر بوده است(۵). تجربه شکستگی استخوان در زنان و مردان بالای ۵۰ سال مبتلا به این بیماری تقریباً به ترتیب ۵۰ و ۲۲ درصد بوده است(۶). برآورد شده است که سالانه حدود ۱۷-۲۰ بیلیون دلار صرف هزینه های پزشکی این بیماری می شود(۷).

بیسفسفونات ها از جمله داروهای مورد استفاده در درمان پوکی استخوان می باشند(۸). البته در زنان یائسه از هورمون

منتقل شده و درنهایت در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد و دی اکسید کربن ۵٪ انکوبه گردیدند. لازم به ذکر است که هر ۳ روز یک بار محیط کشت تعویض گردید و درنهایت جدا- سازی سلول‌ها از کف فلاسک و پاساژ آن‌ها با استفاده از ترپسین_EDTA (Gibco) ۰.۲۵٪. Trypsin_EDTA گروه‌های آزمایش و کنترل: در این بخش تعداد ۵۰۰۰۰ سلول MG63 به داخل هریک از چاهک‌های پلیت خانه منتقل شد. شش گروه آزمایشی مورد بررسی قرار گرفت. در ۳ گروه آزمایشی عصاره هیدروالکلی مومیایی، به ترتیب دوزهای ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ $\mu\text{g}/\text{ml}$ و در دو گروه کنترل مثبت، داروهای زولدرونیک اسید و استرادیول والرات با غلظت mg/ml ۱ به چاهک‌های حاوی سلول‌های MG63 اضافه شد و در گروه کنترل منفی، چاهک‌ها فقط حاوی سلول‌های MG63 بود و هیچ ماده‌ای به آن‌ها اضافه نشد. لازم به ذکر است که در همه گروه‌ای آزمایشی، تعداد چاهک‌ها و سلول‌های MG63 موجود در آن‌ها مشخص و مساوی بود. سپس پلیت‌های حاوی گروه‌های آزمایش و کنترل به انکوباتور با دمای ۳۷ درجه سانتی گراد و ۵٪ CO_2 جهت بررسی زمان‌های ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت منتقل شدند، درنهایت پس از بررسی نتایج، زمان ۴۸ ساعت به عنوان زمان مناسب برای ادامه آزمایش‌های مورد تائید قرار گرفت.^(۱۶)

تست حیات زیستی: میزان تأثیر عصاره مومیایی (در گروه‌های آزمایش) و زولدرونیک اسید و استرادیول والرات (در گروه‌های کنترل مثبت) بر میزان تکثیر سلول‌های MG63 در مقایسه با گروه کنترل منفی، با استفاده از تست-[3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl) 2, 5-diphenyltetrazolium bromide] MTT (Sigma Aldrich) مورد بررسی قرار گرفت. تعداد سلول‌های استفاده شده در هر چاهک (۵۰.۰۰۰) سلول بود. جهت انجام آزمایش MTT ۲۰ μL , ۵ mg/mL به هر چاهک اضافه نموده و به مدت ۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد و ۵٪ CO_2 انکوبه گردیدند. سپس با خارج

روش بورسی

جمع آوری و عصاره گیری: در این مطالعه تجربی، ماده گیاهی - معدنی مومیایی با حالت جامد و رنگ قهوه‌ای متمایل به سیاه، پس از جمع آوری از کوههای استان ایلام توسط متخصص فارماکوگنوزی تائید گردید. مومیایی جمع آوری شده پس از تقسیم به قطعات کوچک، به وسیله دستگاه آسیاب گردید، سپس ۴۰ گرم از پودر حاصل برای عصاره گیری با روش استخراج پیوسته با دستگاه سوکسوله (شامل ۵٪ حلال الکل و ۵٪ آب به میزان ۲۵۰ میلی لیتر) جدا و عصاره گیری در دمای ۸۰ درجه سانتی گراد انجام شد. جهت حذف آب و الکل، حلال به دست آمده به دستگاه تبخیر در خلا (روتاری مدل IKA RV 10 digital) با دور ثابت ۴۰ و دمای ۶۰ درجه سانتی گراد به مدت ۶۰ دقیقه منتقل شد. سپس عصاره مورد نظر با انتقال به آون با دمای ۴۰ درجه به مدت دو ساعت خشک گردید و به صورت پودر در ظروف شیشه‌ای دربسته در یخچال نگهداری شد، درنهایت از ۴۰ گرم از ماده مومیایی اولیه حدود ۱۳/۴ گرم عصاره مومیایی به دست آمد.^(۱۷)

کشت سلولی: رده‌های سلول‌های شبه استئوبلاست انسانی MG63 با کد خریداری C-555 از انسیتیو پاستور به روش زیر کشت داده شدند. ابتدا محیط کشت رویی سلول‌های خریداری شده دور ریخته شد و جداسازی سلول‌ها از کف فلاسک با اضافه نمودن ۰.۲۵٪ Trypsin_EDTA (Gibco) صورت گرفت. سپس با اضافه نمودن سرم جینین گوساله (Gibco) ۱۰٪ (FBS) خشی سازی تریپسین انجام شد. پس از آن، سلول‌ها در ۳ سی سی محیط کشت Dulbecco's DMEM (Gibco)(modified Eagle medium) به مدت ۵ دقیقه با دور ۱۵۰۰ سانتیفیوژ گردیدند. سپس با دور ریختن محلول رویی، سلول‌ها به سه فلاسک حاوی ۵ سی سی محیط کشت، ۱۰٪ FBS (Gibco) ۱۰۰ U/mL پنی سیلین (Gibco) و ۱۰۰ $\mu\text{g}/\text{mL}$ استرپتومایسین (Gibco) اسپرتو می‌گردند.

داده‌ها با استفاده از تست آماری ANOVA انجام شد و $P < 0.05$ به عنوان سطح اختلاف معنی‌دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها

تست حیات زیستی: بر اساس نتایج به دست آمده از تست MTT، عصاره هیدروالکلی مو میابی با غلظت‌های ۱۰۰ و $200 \mu\text{g}/\text{ml}$ سبب افزایش معنی‌دار تکثیر سلول‌های MG63 شد؛ اما غلظت $300 \mu\text{g}/\text{ml}$ عصاره سبب کاهش معنی‌دار تکثیر سلول‌ها در مقایسه با گروه کنترل منفی گردید ($P < 0.05$) (گروههای کنترل مثبت زلدرونیک اسید و استراديول والرات نیز سبب افزایش معنی‌دار تکثیر سلولی نسبت به گروه کنترل منفی شدند ($P < 0.05$) (نمودار ۱).

بررسی بیان زمان استئوپروتگرین (OPG) و گیرنده فعال فاکتور هسته ای کاپا بتا لیگاند (sRANKL): همان‌طور که نمودار ۲ نشان می‌دهد غلظت‌های ۱۰۰ و $200 \mu\text{g}/\text{ml}$ عصاره مو میابی به ترتیب سبب افزایش غیر معنی‌دار و افزایش معنی‌دار بیان استئوپروتگرین (OPG) در مقایسه با گروه کنترل منفی می‌گردد که در این خصوص مشابه با استراديول والرات عمل نموده است ($P < 0.05$). در حالی که غلظت $300 \mu\text{g}/\text{ml}$ عصاره مو میابی در مقایسه با گروههای کنترل منفی و کنترل مثبت به ترتیب به صورت غیر معنی‌دار و معنی‌دار سبب کاهش بیان استئوپروتگرین گردیده است.

غلظت‌های ۱۰۰ و $200 \mu\text{g}/\text{ml}$ عصاره مو میابی به ترتیب سبب کاهش غیر معنی‌دار ($p = 0.226$) و معنی‌دار ($p = 0.046$) بیان RANKL در مقایسه با گروه کنترل منفی شده‌اند. در حالی که این کاهش بیان برای هر دو غلظت مذکور در مقایسه با گروههای کنترل مثبت، معنی‌دار نبودند ($P > 0.05$). غلظت $300 \mu\text{g}/\text{ml}$ عصاره مو میابی نیز به صورت غیر معنی‌دار سبب افزایش بیان RANKL نسبت به گروه کنترل منفی شده بود (نمودار ۳).

بررسی نسبت OPG/RANKL: غلظت $100 \mu\text{g}/\text{ml}$ عصاره مو میابی در مقایسه با گروههای کنترل منفی و مثبت OPG/RANKL سبب افزایش غیر معنی‌دار در نسبت


(Sigma DMSO $150 \mu\text{L}$ محلول Aldrich) به چاهک‌ها اضافه شد و جهت مخلوط شدن محلول با نمونه‌ها از دستگاه شیکر استفاده گردید. سپس پلیت‌ها برای خوانش توسط دستگاه الایزا-ELX 800 در طول موج 570 نانومتر مورد ارزیابی قرار گرفتند (۱۶و۱۸).

بررسی بیان زمانی استئوپروتگرین (OPG) و گیرنده فعال فاکتور هسته ای کاپا بتا لیگاند (sRANKL): ابتدا محلول Human OPG diluents Bioassay Technology Laboratory, China رقیق نموده و از آن غلظت‌های $1-10/5 \text{ ng}/\text{ml}$ تهیه گردید. پس از قرار دادن پلیت‌های چاهک دار حاوی غلظت‌های استاندارد و نمونه‌های مورد آزمایش بر روی دستگاه شیکر، انکوبه نمودن در دمای 37°C درجه به مدت یک ساعت انجام شد. سپس چاهک‌ها ۵ بار با محلول مخصوص شستشو کیت شستشو داده شدند و در پایان میزان بیان OPG پلیت‌ها با استفاده از دستگاه الایزا (Biotek- ELX 800) در طول موج 450 نانومتر قرائت گردید. هم‌چنین جهت بررسی بیان sRANKL ابتدا محلول استاندارد sRANKL diluents Bioassay Human sRANKL diluents Bioassay Technology Laboratory, China آن غلظت‌های $1600-800-400-200-100-50 \text{ ng}/\text{ml}$ تهیه شد. پلیت‌های حاوی غلظت‌های استاندارد و نمونه‌های مورد آزمایش را ابتدا بر روی دستگاه شیکر قرار داده، سپس به انکوباتور با دمای 37°C درجه سانتی‌گراد به مدت یک ساعت منتقل گردیدند. پس از ۵ بار شستشوی چاهک‌ها با محلول مخصوص شستشو کیت، میزان بیان sRANKL نمونه‌ها توسط دستگاه الایزا (Biotek- ELX 800) در طول موج 450 نانومتر ارزیابی گردید (۱۹).


روش‌های آماری: در این مطالعه آزمایش‌های مربوط به OPG و RANKL هر کدام ۳ بار تکرار گردید. تجزیه و تحلیل

سبب کاهش غیر معنی دار نسبت OPG/RANKL در مقایسه با همه گروه های کنترل مثبت و منفی گردید (نمودار ۴).


گردید در حالی که برای دوز $200 \mu\text{g}/\text{ml}$ عصاره این افزایش نسبت فقط در مقایسه با گروه کنترل منفی معنی دار بود ($p=0.022$). غلظت $300 \mu\text{g}/\text{ml}$ عصاره مو میابی نیز




نمودار ۱. بررسی حیات سلولی در گروه های مختلف مورد مطالعه بعد از ۴۸ ساعت. در این نمودار گروه های آزمایش (غلظت های 100 ، 200 و $300 \mu\text{g}/\text{ml}$ مومیابی) با گروه های کنترل مثبت (استرادیول والرات و زولدرورونیک اسید) و گروه کنترل منفی (سلول به تنها بی) مقایسه گردیده اند. $* < 0.05$ در مقایسه با گروه کنترل منفی، $** < 0.01$ در مقایسه با گروه زولدرورونیک اسید و $*** < 0.001$ در مقایسه با گروه استرادیول والرات انجام شده است.



نمودار ۲. بررسی بیان استئوپروتگرین در گروه های مختلف مورد مطالعه بعد از ۴۸ ساعت. در این نمودار گروه های آزمایش (غلظت های 100 ، 200 و $300 \mu\text{g}/\text{ml}$ مومیابی) با گروه های کنترل مثبت (استرادیول والرات و زولدرورونیک اسید) و گروه کنترل منفی (سلول به تنها بی) مقایسه گردیده اند. $* < 0.05$ در مقایسه با گروه کنترل منفی، $** < 0.01$ در مقایسه با گروه زولدرورونیک اسید و $*** < 0.001$ در مقایسه با گروه استرادیول والرات انجام شده است.



نمودار ۳. بررسی بیان گیرنده فعال فاکتور هسته ای کاپا بتا لیگاند در گروه های مختلف مطالعه بعد از ۴۸ ساعت. در این نمودار گروه های آزمایش (غلظت های ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ $\mu\text{g}/\text{ml}$ مومیایی) با گروه های کنترل مثبت (استرادیول والرات و زولدرونیک اسید) و گروه کنترل منفی (سلول به تنها) مقایسه شده اند. $* < 0.05$, $** < 0.01$ در مقایسه با گروه کنترل منفی، P در مقایسه با گروه زولدرونیک اسید انجام شده است.



نمودار ۴. بررسی بیان نسبت OPG/RANKL در گروه های مختلف مطالعه بعد ۴۸ ساعت تیمار. در این نمودار گروه های آزمایش (غلظت های ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ $\mu\text{g}/\text{ml}$ مومیایی) با گروه های کنترل مثبت (استرادیول والرات و زولدرونیک اسید) و کنترل منفی (سلول به تنها) مقایسه شده اند. $* < 0.05$, $** < 0.01$, $*** < 0.005$ در مقایسه با گروه کنترل منفی، P در مقایسه با گروه زولدرونیک اسید، $** < 0.01$ در مقایسه با گروه استرادیول والرات هست.

تحریک کننده تشکیل کلنی (CSF) سبب تحریک و تشکیل سلول های استئوکلاست می گردند و به عنوان عامل کلیدی در روند استخوان سازی شناخته می شوند (۲۰).

بحث
سلول های استئوبلاست علاوه بر نقش داشتن در استخوان سازی، با الکا RANKL و همچنین عامل

پژوهش حاضر را تائید می‌نماید. لازم به ذکر است با افزایش نسبت OPG/RANKL عمل استخوان‌سازی بیشتر از جذب استخوان شده که این امر در افراد مبتلا به پوکی استخوان حائز اهمیت می‌باشد. زیرا در افراد مبتلا به پوکی به علت کاهش تکثیر استئوپلاست‌ها میزان ترشح OPG نیز کاهش یافته، در نتیجه RANKL به گیرنده خود بر روی سلول‌های استئوپلاست (RANK) متصل گردیده و سبب فعال شدن این سلول‌ها و در نتیجه افزایش میزان استخوان خواری می‌گردد؛ بنابراین بدن توانایی کمتری برای ساخت استخوان جایگزین خواهد داشت. ماده گیاهی-معدنی مومیایی سبب افزایش تکثیر استئوپلاست و به دنبال آن افزایش بیان OPG می‌شود و با افزایش نسبت OPG/RANKL کفه ترازو به سمت استخوان سازی تغییر پیدا می‌کند. از طرف دیگر در این مطالعه از دو داروی شیمیایی استرادیول والرات و زولدرونیک اسید (بیسفسفونات) به عنوان گروه کنترل مثبت استفاده گردید. بیسفسفونات‌ها سبب مهار فعالیت استئوپلاست می‌شوند^(۲۳). در زنان یائسه به علت نبود استروژن فعالیت استئوپلاست‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته و حجم توده استخوانی کاهش می‌یابد. هورمون تراپی با مکانیسم مهار کردن فعالیت استئوپلاست از کاهش حجم استخوان جلوگیری می‌کند. استرادیول والرات که دارویی استروژنی است نیز برای درمان پوکی استخوان در بعد از یائسگی زنان کاربرد دارد^(۲۴). زولدرونیک اسید نیز برای درمان استئوپروز در زنان یائسه به کار می‌رود^(۲۵).

در مطالعه حاضر دوز ۲۰۰ µg/ml مومیایی سبب افزایش OPG/RANKL معنی دار بیان OPG و همچنین نسبت OPG/RANKL در مقایسه با گروه‌های کنترل مثبت است. لذا نتایج به دست آمده مشابه با گروه‌های کنترل مثبت است. لذا نتایج به دست آمده نشان می‌دهد، غلظت ۲۰۰ µg/ml مومیایی تأثیر قابل توجهی بر بیان دو عامل مهم در بازسازی استخوان دارد و به نظر می‌رسد افرادی که در معرض پوکی استخوان قرار

طرف دیگر استئوپروتگرین بیان شده توسط استئوپلاست‌ها / سلول‌های استروممال از طریق اتصال به RANKL از پیوند RANKL با RANK جلوگیری می‌نماید^(۲۱). در مطالعه ما دوز ۱۰۰ و ۲۰۰ µg/ml مومیایی سبب افزایش معنی دار تکثیر سلول‌های استئوپلاست گردید، همچنین دوز ۲۰۰ µg/ml عصاره به صورت معنی دار سبب افزایش سلول‌های استئوپلاست (RANK) متصل گردید MG63 شد در حالی که دوز ۳۰۰ µg/ml آن نسبت OPG/RANKL را به صورت غیر معنی دار کاهش داد. این نتیجه بیانگر آن است که با افزایش دوز عصاره (بیش از ۲۰۰ µg/ml) میزان سمیت عصاره بر روی سلول‌های استئوپلاست افزایش یافته و به تبع آن میزان بیان OPG در این سلول‌ها کاهش می‌یابد. در تائید این نتیجه، مطالعه عباسی و همکاران^(۲۰۱۹) است که نشان دادند غلظت‌های پایین لوتوپلین که فراوان‌ترین فلاونوئید موجود در مومیایی می‌باشد سبب کاهش و غلظت‌های بالای آن سبب افزایش مرگ سلول‌های استئوپلاست (IC50,34±2/33µM) در شرایط گلوکز می‌گردد^(۱۶).

در مطالعه Ren و همکاران^(۲۰۱۲)، ترکیب ۱۰۰ µmol/L آناسترازول و ۱۲ mg/ml گیاه ستی چینی با نام shuganjiangu بر سلول‌های OPG گردید در حالی که دوز ۱۲ mg/ml این گیاه به تنها یک سبب کاهش بیشتر بیان RANKL در مقایسه با گروه کنترل شد^(۲۲). نتایج مطالعه‌ی Li و همکاران^(۲۰۱۲) در مورد بررسی اثر اچیناکوسید در بیان OPG و سلول‌های استئوپلاست MC3T3-E1 افزایش معنادار بیان استئوپروتگرین را در غلظت‌های ۱-۱ nmol/L-۱ اچیناکوسید بعد از ۳ و ۵ روز نسبت به گروه کنترل نشان داد. در حالی که فقط غلظت‌های ۱ nmol/L-۱ و ۱۰ nmol/L-۱ اچیناکوسید در طی ۵ روز سبب کاهش معنادار بیان RANKL گردیدند^(۹). نتایج مطالعه این محققین، نتایج حاصل از

آزمایش‌های درون‌تنی در حیوانات آزمایشگاهی و سپس در انسان ضروری به نظر می‌رسد.

دارند با مصرف این ماده بتوانند از گسترش روند پوکی و متعاقباً ایجاد شکستگی‌های متعدد و مکرر جلوگیری نمایند.

تشکر و قدردانی

نویسنده‌گان مقاله از حمایت‌های مالی دانشگاه علوم پزشکی ایلام از طرح تحقیقاتی با کد ۹۴۱۰۲۷/۱۶۳ و کد اخلاق ir.medilam.rec.1394.167) تشرکر و قدردانی می‌نمایند. لازم به ذکر است محل انجام آزمایش‌ها، مرکز تحقیقات زیست‌شناسی و گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام بوده است.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه که به صورت برونتنی انجام شده است مؤید این نکته است که ماده گیاهی معدنی مومنیابی می‌تواند در درمان پوکی استخوان جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیابی با عوارض جانبی بالا و مورد استفاده‌ی حال حاضر باشد؛ اما از آنجایی که این مطالعه فقط به صورت برونتنی انجام شده است، لذا جهت اثبات بیشتر این مدعای انجام

References

- Shariatzadeh H, Modaghegh BS, Mirzaei A. The Effect of Dynamic Hyperextension Brace on Osteoporosis and Hyperkyphosis Reduction in Postmenopausal Osteoporotic Women. Arch Bone Jt Surg. 2017;5(3):181-5.
- Johnell O. Advances in osteoporosis: better identification of risk factors can reduce morbidity and mortality. J Intern Med. 1996;239(4):299-304.
- Boyce BF, Xing L. Biology of RANK, RANKL, and osteoprotegerin. Arthritis Res Ther. 2007;9 Suppl 1:S1.doi:10.1186/ar2165.
- Hemmati F, Sarokhani D, Sayehmiri K, Motdayen M. Prevalence of Osteoporosis in Postmenopausal Women in Iran: A Systematic Review and Meta-Analysis. IJOGI. 2018;21(3):90-102.
- Wade SW, Strader C, Fitzpatrick LA, Anthony MS, O'Malley CD. Estimating prevalence of osteoporosis: examples from industrialized countries. Arch Osteoporos 2014;9:182.
- Shuid Nazrun A, Nizam Tzar M, Afian Mokhtar S, Naina Mohamed I. A systematic review of the outcomes of osteoporotic fracture patients after hospital discharge: morbidity, subsequent fractures, and mortality. Ther Clin Risk Manag. 2014;10:937-48.
- Becker D, Kilgore ML, Morrisey MA. The societal burden of osteoporosis. Curr Rheumatol Rep. 2010;12(3):186-91.
- Lucinda LM, Vieira BJ, Oliveira TT, Sá RC, Peters VM, Reis JE, et al. Evidences of osteoporosis improvement in Wistar rats treated with Ginkgo biloba extract: a histomorphometric study of mandible and femur. Fitoterapia. 2010;81(8):982-7.
- Li F, Yang Y, Zhu P, Chen W, Qi D, Shi X, et al. Echinacoside promotes bone regeneration by increasing OPG/RANKL ratio in MC3T3-E1 cells. Fitoterapia. 2012;83(8):1443-50.
- Leung PC, Siu WS. Herbal Treatment for Osteoporosis: A Current Review. J Tradit Complement Med. 2013;3(2):82-7.
- Wilson E, Rajamanickam GV, Dubey GP, Klose P, Musial F, Saha FJ, et al. Review on shilajit used in traditional Indian medicine. J Ethnopharmacol. 2011;136(1):1-9.
- Biswas TK, Pandit S, Mondal S, Biswas SK, Jana U, Ghosh T, et al. Clinical evaluation of spermatogenic activity of processed Shilajit in oligospermia. Andrologia. 2010;42(1):48-56.
- Park JS, Kim GY, Han K. The spermatogenic and ovogenic effects of chronically administered Shilajit to rats. J Ethnopharmacol. 2006;107(3):349-53.

- 14.Goel RK, Banerjee RS, Acharya SB. Antiulcerogenic and antiinflammatory studies with Shilajit. *J Ethnopharmacol.* 1990;29(1):95-103.
- 15.Abbasi Teshnizi M, Akhavan Rezayat A, Zojaji SA, Zirak N, Javadi B, Nami SR, et al. Effect of Mummy on pain and wound healing of midian sternotomy in patients undergoing off-pump coronary artery bypass grafting surgery. The International Congress on Complementary and Alternative Medicine. 2015 Oct. 154-155.Mashhad.Iran.
- 16.Abbasi N, Azizpour Y, Azizi M, Karimi E, Aidy A, Asadollahi K. The effects of mumie extract on cell proliferation and enzyme expression of human osteoblast-like cells (MG63). *JSRM.* 2019;15(2):P1-6.
- 17.Izadpanah E, Hassanzadeh K, Yousefinejad V, Shahveisi K, Fatahi N, M.R M. Effect of selegiline on liver cholestasis induced by bile duct ligation in rat. *SJKU.* 2016;21(5):20-30.
- 18.Abbasi N, Khosravi A, Aidy A, Shafie iM. Biphasic Response to Luteolin in MG-63 Osteoblast-Like Cells under High Glucose-Induced Oxidative Stress. *Iran J Med Sci.* 2016;41(2):118-25.
- 19.Moloudi MR, Hassanzadeh K, Rouhani S, Zandi F, Ahmadi A, Khalwatian P, et al. Effect of chloroformic extract of Cichorium intybus on liver function tests and serum level of TNF- α in obstructive cholestasis in rat. *SJKU.* 2014;9(4):10-9.
- 20.Costa-Rodrigues J, Teixeira CA, Fernandes MH. Paracrine-mediated osteoclastogenesis by the osteosarcoma MG63 cell line: is RANKL/RANK signalling really important? *Clin Exp Metastasis.* 2011;28(6):505-14.
- 21.Liu JZ, Ji ZL, Chen SM. [The OPG/RANKL/RANK system and bone resorptive disease]. *Sheng Wu Gong Cheng Xue Bao.* 2003;19(6):655-60.
- 22.Ren Y, Han SY, Li PP. Effects of anastrozole combined with Shuganjiangu decoction on osteoblast-like cell proliferation, differentiation and OPG/RANKL mRNA expression. *Chin J Cancer Res.* 2012;24(2):151–6.
- 23.Sun J, Song F, Zhang W, Sexton BE, Windsor LJ. Effects of alendronate on human osteoblast-like MG63 cells and matrix metalloproteinases. *Arch Oral Biol.* 2012;57(6):728-36.
- 24.Warren MP, Shu AR, Dominguez JE. Menopause and Hormone Replacement. Endotext [Internet]. 2015 Feb. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279050/>
- 25.Lambrinoudaki I, Vlachou S, Galapi F, Papadimitriou D, Papadias K. Once-yearly zoledronic acid in the prevention of osteoporotic bone fractures in postmenopausal women. *Clin Interv Aging.* 2008;3(3):445-51.