

A Comparative Study on the Effect of Aloe Vera and Nitroglycerin Ointment on the Incidence and Severity of Phlebitis Caused by the Peripheral Catheter

Samira Mohammadian¹, Jamal Seidi², Bijan Nouri³, Mohammad Fathi⁴

1. Student Research Committee, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran. ORCID ID: 0000-0002-2707-5358

2. Associate Professor, Clinical Care Research Center, Health Development Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran. ORCID ID: 0000-0003-4048-8154

3. Assistant Professor of Biostatistics, Social Determinants of Health Research Center, Research Institute for Health Development, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran. ORCID ID: 0000-0003-0064-0094

4. Assistant Professor, Clinical Care Research Center, Health Development Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran., (Corresponding Author), Tel: 087-33627636, Email: mohammad.fathi@muk.ac.ir, ORCID ID: 0000 -0001-9624-4760

ABSTRACT

Background and Aim: In addition to modern medical advances, intravenous treatment has become an essential part of patient care. Intravenous treatment like other invasive techniques has its own side effects. Phlebitis and infection are the most serious complications of the intervention. The purpose of this study was to compare the effect of aloe vera and nitroglycerin on the incidence and severity of phlebitis induced by peripheral catheter.

Materials and Methods: This blinded randomized clinical trial was conducted on 150 patients admitted to the internal ward of Kowsar Hospital in Sanandaj in 2019. Patients were randomly divided into three groups including nitroglycerin, aloe vera, and control. The data gathering tool was a phlebitis grading scale. After venipuncture, the ointment was applied to the upper part of the catheter and covered with a sterile coating. Patients were evaluated at intervals of 12 hours to 48 hours after sedation, and the incidence and severity of phlebitis were assessed within 48 hours. For data analysis, Fisher's exact tests, chi-square, Cochran and Maxwell-Stover test, and STATA version 12 software were used.

Results: Three groups showed a significant reduction in the intensity of phlebitis in the first 12 hours ($P = 0.000$), 24 hours ($P = 0.000$), 36 hours ($P = 0.001$) and 48 hours ($P = 0.001$) after the catheterization. This reduction in phlebitis in the Aloe Vera group was higher than the Nitroglycerin group.

Conclusion: According to the results of this study, it is recommended to use nitroglycerin ointment and aloe vera to reduce phlebitis, although Aloe vera ointment is more effective in reducing phlebitis.

Keywords: Phlebitis, Vascular inflammation, Peripheral venous catheter, Nitroglycerin, Aloe Vera

Received: July 21, 2019

Accepted: Dec 8, 2019

How to cite the article: Samira Mohammadian, Jamal Seidi, Bijan Nouri, Mohammad Fathi. A comparative Study on the Effect of Aloe Vera and Nitroglycerin ointment on the incidence and severity of phlebitis caused by the peritoneal catheter. SJKU 2020;25(2):44-53.

بررسی مقایسه‌ای تأثیر پماد آلوئه ورا و نیتروگلیسرین بر میزان بروز و شدت فلیت ناشی از کاتتر وریدهای محیطی

سمیرا محمدیان^۱، جمال صیدی^۲، بیژن نوری^۳، محمد فتحی^۴

۱. کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. کد ارکید: ۰۰۰۰۰۲-۰۷۰۷-۵۳۵۸

۲. دانشیار، مرکز تحقیقات مراقبت بالینی، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. کد ارکید: ۰۰۰۰۰۳-۴۰۴۸-۸۱۵۴

۳. استادیار آمار زیستی، مرکز تحقیقات سلامت، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. کد ارکید: ۰۰۰۰۰۳-۶۴۰۰۹۴

۴. استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت بالینی، پژوهشکده توسعه سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران (تویینده مسئول)، تلفن: ۰۸۷۳۳۶۲۷۶۳۶، کد ارکید: ۰۰۰۰۰۱-۹۶۲۴-۴۷۶۰، پست الکترونیک: mohammad.fathi@muk.ac.ir

چکیده

زمینه و هدف: در کنار پیشرفت‌های مدرن داخل وریدی، درمان داخل وریدی به بخش ضروری مراقبت از بیمار تبدیل شده است.

درمان وریدی مانند هر روش تهاجمی دیگر دارای عوارض جانبی است. فلیت شایع‌ترین و عفونت خطرناک‌ترین عارضه می‌باشد.

هدف از این مطالعه مقایسه تأثیر پماد آلوئه ورا و نیتروگلیسرین بر میزان بروز و شدت فلیت ناشی از کاتتر وریدهای محیطی بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی یک سو کور تصادفی سازی شده بود که بر روی ۱۵۰ بیمار استری در بخش‌های داخلی بیمارستان کوثر سنندج در سال ۱۳۹۷ انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به سه گروه «نیتروگلیسرین»، «آلوئه ورا» و «کنترل» تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده‌ها مقیاس درجه‌بندی فلیت بود. پس از انجام رگ‌گیری پماد در قسمت بالاتر از کاتتر استعمال و با پوشش استریل پوشیده شد. بیماران در فاصله زمانی هر ۱۲ ساعت تا ۴۸ ساعت بعد از رگ‌گیری مورد ارزیابی قرار گرفتند و بروز و شدت فلیت طی ۴۸ ساعت بررسی شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کوکران، مجزور کای، تحلیل واریانس یک‌طرفه با تست تعقیبی توکی و آزمون اندازه‌گیری مجدد استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نسخه ۱۲ نرم‌افزار STATA مورد تحلیل قرار گرفتند و سطح معنی‌داری ۰/۰۵ در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: سه گروه از لحظه کاهش شدت فلیت در ۱۲ ساعت اول ($P < 0/005$)، (۲۴ ساعت ($P < 0/001$) و ۴۸ ساعت بعد از کاتتر گذاری ($P < 0/001$) تفاوت معنی‌داری داشتند. این میزان کاهش فلیت در گروه آلوئه ورا از گروه نیتروگلیسرین بیشتر بود.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می‌شود جهت کاهش فلیت از پماد نیتروگلیسرین و پماد آلوئه ورا استفاده شود هر چند استعمال پماد آلوئه ورا در کاهش فلیت مؤثرتر است.

کلمات کلیدی: فلیت، التهاب عروق، کاتتر ورید محیطی، نیتروگلیسرین، آلوئه ورا

وصول مقاله: ۹۸/۴/۳۰ اصلاحیه نهایی: ۹۸/۸/۲۱ پذیرش: ۹۸/۹/۱۷

مقدمه

وریدی را به تعویق می‌اندازد و مدت اقامت در بیمارستان را افزایش می‌دهد(۸).

نتایج حاصل از چندین کارآزمایی بالینی کاتر شده تصادفی نشان داد که استفاده از فیلترهای هیدروکورتیزون، هپارین، کورتیکواستروئیدهای موضعی، ژل ضد التهابی موضعی در محل تزریق وریدی می‌تواند میزان فلیبت ناشی از کاتر را کاهش دهد(۹، ۱۰). با این وجود، هیچ یک از این روش‌ها به علت نگرانی در مورد هزینه‌های اقتصادی و اینمی آن‌ها به طور کامل قابل قبول نبوده است. بر این اساس، روش‌های ساده‌تر، امن‌تر و مقرنون به صرفه‌تر مورد نیاز است(۱۱). یکی از این روش‌ها، اقدامات غیر تهاجمی و موضعی مثل استفاده از پمادهای مختلف مانند آلوئه ورا است. مکانیسم عمل آلوئه ورا شامل خواص درمانی، فعالیت ضد التهابی، اثرات بر سیستم ایمنی، اثرات مرطوب کننده و ضد پیری و اثرات آنتی سپتیک است(۱۲). همچنین استفاده از نیتروگلیسیرین یکی از روش‌های کاهش فلیبت است. نیتروگلیسیرین سبب اتساع عروق و افزایش جریان خون می‌شود. نیتروگلیسیرین با توجه به خاصیت گشاد کننده عروقی، برای پیشگیری از فلیبت و افزایش طول مدت ماندگاری آنژیوکت‌ها برای بیمارانی که نیاز طولانی مدت به آنژیوکت دارند مفید است(۱۳).

باقری و همکاران(۱۳۹۳) مطالعه‌ای به منظور مقایسه تأثیر محلول نیتروگلیسیرین ۲٪ و محلول کلرهگزیدین ۲٪ در پیشگیری از فلیبت مرتبط با کاتر انجام دادند. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، محققین استفاده از پماد نیتروگلیسیرین ۲٪ موضعی و محلول کلرهگزیدین ۲٪ برای کاهش فلیبت مرتبط با کاتر وریدی را توصیه می‌نمودند و گزارش کردند استفاده از پماد نیتروگلیسیرین ۲٪ نسبت به محلول کلرهگزیدین مؤثرتر است(۱۴).

Binarti و همکاران(۲۰۱۶) مطالعه‌ای به منظور تأثیر ژل آلوئه ورا بر فلیبت در بیماران بستری انجام دادند. در نتیجه گیری از این مطالعه مشخص گردید که درمان آلوئه ورا می‌تواند برای کاهش فلیبت مورد استفاده قرار گیرد(۱۵).

درمان داخل وریدی بخش مهمی در مراقبت از بیمار است(۱). امروزه ۸۰٪ از بیماران بستری در بیمارستان، در طول بستری خود درمان وریدی دریافت می‌کنند(۲). در پژوهشی که در کالیفرنیا انجام شد، شیوع فلیبت ۰/۱ تا ۶۳/۳٪ گزارش شده است(۳). در ایران درصد بروز فلیبت، بین ۷۰ تا ۲۷٪ گزارش شده است(۴).

هر چند درمان وریدی جان بسیاری از بیماران را نجات می‌دهد، ولی نباید فراموش کرد که مانند هر روش تهاجمی دیگر دارای عوارض جانبی است. گروه بزرگی از بیماران که درمان وریدی دریافت می‌کنند در معرض عوارضی که عمدتاً فلیبت می‌باشند قرار دارند(۵). از جمله این عوارض برای بیمار، می‌توان به نشت مایع، التهاب وریدی (فلیبت)، تجمع مایعات در بدن، خونریزی و عفونت ناحیه تزریق اشاره کرد که فلیبت شایع‌ترین و عفونت خطرناک ترین عارضه است(۶).

فلیبت، التهاب سلول‌های ورید است که در آن لایه داخلی فلیبت، التهاب سلول‌های ورید است که در آن لایه داخلی ورید، زیر و خشن شده و منجر به چسبندگی پلاکتی می‌شود، ورید به صورت موضعی گشاد شده و نفوذپذیری مویرگی افزایش می‌یابد که به هدایت مایعات داخل عروقی به فضای میان بافتی کمک می‌نماید. گرانولوسیت‌ها و مونوسیت‌ها وارد فضای میان بافتی می‌شوند، سیستم ماکروفائز در نتیجه تولیدات بافتی فعال و سلول بافت‌های تخریب شده را فاگوسیت می‌نماید و در نتیجه قرمزی، تورم و سفتی مسیر وریدی ایجاد می‌شود(۷).

فلیبت علاوه بر اینکه می‌تواند طول عمر کاتر را کاهش دهد، باعث تشکیل لخته به صورت ترومبوفلیبت و آمبولی و در واقع تهدید کننده حیات است؛ بنابراین، یکی از دلایل اصلی برداشتن کاتر محیطی، فلیبت است؛ که باعث افزایش هزینه مراقبت‌های بهداشتی، اتلاف وقت پرستاران و مشکلاتی مانند عفونت، ناراحتی، برداشتن زود هنگام کاتر و کاتر گذاری مجدد می‌شود. کاتر گذاری مجدد، به نوبه خود، تعداد دفعات کاتر گذاری مناسب را محدود می‌کند، تزریق داروهای

عدم وجود فلیت در محل قبل از جایگذاری کاتر، عدم مصرف داروهای ضد انعقاد، استفاده از الکل به عنوان ضد عفونی کننده قبل از کاربرد کاتر، عدم سابقه بیماری‌های عروقی، سیستمیک، دیابت، بیماری پوستی، بیماری‌های عفونی حاد و مزمن، آنمی شدید، گلوكوم، هیپوتانسیون (فشار سیستول کمتر از ۱۰۰ میلی‌متر جیوه)، عدم نقص سیستم ایمنی، عدم شیمی درمانی، عدم تغذیه وریدی، نوع کاتر آثربوکت باشد و به هپارین لاک متصل نباشد.

معیارهای خروج از مطالعه شامل: ترخص از بیمارستان قبل از دو روز از شروع مداخله، عدم تعایل به ادامه همکاری در مطالعه، عدم استفاده درست و به موقع از پماد آلوئه ورا و نیتروگلیسرین در طی مطالعه، پارگی یا خارج شدن کاتر قبل از ۴۸ ساعت، بدحال شدن بیمار به هر دلیل و گرفتن خط وریدی مجدد در همان دست بود.

ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش شامل دو بخش پرسشنامه ثبت اطلاعات دموگرافیک، طبی و چک لیست فلیت بود. پرسشنامه ثبت اطلاعات دموگرافیک و طبی پژوهشگر ساخته شامل سن، جنس، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات، وضعیت اشتغال، تشخیص بیماری، سابقه بیماری‌های زمینه‌ای، مدت زمان بستری، داروهای تزریقی، مدت زمان تعبیه کاتر و محل آناتومیکی تعبیه کاتر بود. چک لیست فلیت انجمن پرستاری ایران جهت بررسی درجه فلیت استفاده شد. این ابزار دارای مقیاس درجه‌بندی در ۵ سطح است:

درجه صفر: فاقد علائم بالینی.

درجه ۱: وجود یکی از علائم درد یا قرمزی.

درجه ۲: وجود درد، قرمزی یا ادم در محل، مشخص بودن حدود رگ، طنابی بودن ورید در لمس.

درجه ۳: وجود درد، قرمزی یا ادم در محل، مشخص بودن حدود رگ، طنابی بودن ورید در لمس.

درجه ۴: وجود درد و اریتم یا ادم در محل، مشخص بودن حدود رگ و طنابی بودن ورید در لمس (۱۶-۱۸).

این پرسش که یکی از بهترین و کم عارضه‌ترین روش‌های پیشگیری از فلیت کدام است همواره توسط پرستاران مطرح شده است. لذا جهت کاهش فلیت، هزینه بیمارستانی، افزایش رضایت بیماران و با توجه به وجود اختلاف نظر در کاربرد سایر روش‌های ذکر شده و اینکه آلوئه ورا یک گیاه سنتی و طبیعی است و نیتروگلیسرین دارویی شیمیابی است و هر کدام مزایا و معایبی دارد، این مطالعه با هدف مقایسه تأثیر پماد آلوئه ورا و نیتروگلیسرین بر میزان بروز و شدت فلیت ناشی از کاتر وریدهای محیطی در بخش‌های داخلی بیمارستان کوثر سنتدج سال ۱۳۹۷ انجام شد.

مواد و روش‌ها

این پژوهش به صورت کارآزمایی بالینی یک سو کور بر روی ۱۵ نفر از بیماران بستری در بخش‌های داخلی بیمارستان کوثر سنتدج انجام شد. حجم نمونه با توجه به مطالعه Akbari و همکاران (۲۰۱۴) (۱۳) و بر اساس فرمول
$$\frac{\left(z_{\frac{1-\alpha}{2}} + z_{1-\beta} \right)^2}{\left(\mu_1 - \mu_2 \right)^2}$$
، با در نظر گرفتن سطح اطمینان ۹۵٪ و توان آزمون ۸۰٪ و اندازه اثر حداکثر برابر با $0.45/\text{Effect}$ و استفاده از نموگرام آلتمن ۴۸ نفر در هر گروه محاسبه گردید. با توجه به احتمال ریزش در نمونه‌ها، در هر گروه ۵۰ نفر و در کل مطالعه ۱۵۰ نفر به عنوان نمونه وجود داشت. در طی مطالعه ۲ نفر در گروه نیتروگلیسرین به دلیل ترس از آسیب از ادامه پژوهش خودداری کردند. بیماران به روش نمونه‌گیری آسان انتخاب شدند و به صورت تشخیص تصادفی ساده در گروه‌ها با استفاده از نرم‌افزار بلوک چهارتایی به سه گروه الف (نیتروگلیسرین)، ب (آلوئه ورا)، ج (کنترل) تقسیم شدند.

معیارهایی که برای انتخاب نمونه به منظور ورود به این مطالعه در نظر گرفته شد؛ شامل بستری در بخش داخلی حداقل به مدت ۴۸ ساعت، مشارکت داوطلبانه در مطالعه، سن ۲۰ تا ۷۰ سال، دارای اندام فوقانی سالم، نیاز به ۴۸ ساعت کاتر وریدی،

فلیست در ناحیه تعییه کاتر در فاصله زمانی ۱۲ ساعته بعد از رگ‌گیری در ساعت‌های ۱۲، ۲۴، ۴۸، ۳۶ با استفاده از مقیاس درجه‌بندی فلیست صرفاً توسط پژوهشگر و یکی دیگر از همکاران صورت گرفت تا پایایی بین دو ارزیاب رعایت شود. اطلاعات در چک‌لیست مربوط ثبت گردید. در این روش به ۴ بار پانسمان در اولین ساعت جایگذاری ۱۲، ۲۴، ۳۶ ساعت بعد از آن نیاز بود. همچنین داروهای موضعی بر اساس نوع گروه بیمار برای ۴ مرتبه، در اولین ساعت جایگذاری شروع به کار و پوشیدن دستکش یک‌بارمصرف، انتخاب محل و ورید مناسب، کوتاه کردن موهای ناحیه تزریق با قیچی، ضد عفونی کردن ناحیه حداقل به مدت ۳۰ ثانیه با الکل (۷۰٪) با کاتر صورتی شماره ۲۰ ساخت کارخانه هاریانا کشور هند به طور یکسان انجام شد. در صورتی که برای گرفتن رگ، بیش از دو بار اقدام می‌شد و محل جدیدی هم برای رگ‌گیری انتخاب می‌شد.

بیماران بر طبق گروهی که در آن قرار داده شدند، پس از انجام رگ‌گیری به میزان ۱/۵ سانتی‌متر (حدود ۲ گرم)، در گروه (الف) از پماد نیتروگلیسرین ساخت شرکت توریکا با غلظت ۲٪ و در گروه (ب) از پماد آلوئه ورا ساخت شرکت آریان کیمیا تک برنده مای در قسمت بالاتر از کاتر در وسعت ۴×۲ سانتی‌متر مالیله و با پوشش استریل (چسب کاتر) پوشیده شد. در گروه کنترل هیچ اقدامی انجام نشد و فقط اقدامات مراقبتی معمول مرکز را دریافت کردند.

برای اینکه یک سوکورسازی پژوهش رعایت شود، تمام مراحل رگ‌گیری و استعمال پماد توسط یک نفر پژوهشگر انجام شد. به بیماران در نگهداری از محل رگ‌گیری آموزش داده شد. به علت اینکه در بعضی تحقیقات تعویض سرت سرم را در بروز فلیست مؤثر دانسته‌اند، در این پژوهش در سه گروه ست سرم هر ۲۴ ساعت به طور یکسان تعویض شد. انجمن پرستاران کنترل عفونت، جهت جلوگیری از ایجاد فلیست مدت زمان نگهداری کاتر وریدی محیطی را ۴۸ تا ۷۲ ساعت عنوان نموده است^(۱۹). با توجه به اینکه پروتکل اجرایی در مرکز محل پژوهش ۴۸ ساعت بود، حداکثر زمان نگهداری کاتر ۴۸ ساعت در سه گروه بود. بروز و شدت

یافته‌ها

برای بررسی پایایی ابزار مربوط به تعیین درجه فلیست نیز از روش پایایی تعادل (equivalence) یا همان پایایی بین دو ارزیاب (Inter rater reliability) استفاده شد.

با توجه به معیارهای ورود، نمونه‌ها در سه گروه یکسان بودند. پس از انتخاب بیماران و قرارگیری در گروه‌ها به صورت تصادفی، رگ‌گیری و پانسمان در تمام بیماران توسط پژوهشگر با رعایت اصول علمی^(۶) (شیستن دست‌ها قبل از شروع به کار و پوشیدن دستکش یک‌بارمصرف، انتخاب محل و ورید مناسب، کوتاه کردن موهای ناحیه تزریق با قیچی، ضد عفونی کردن ناحیه حداقل به مدت ۳۰ ثانیه با الکل (۷۰٪) با کاتر صورتی شماره ۲۰ ساخت کارخانه هاریانا کشور هند به طور یکسان انجام شد. در صورتی که برای گرفتن رگ، بیش از دو بار اقدام می‌شد و محل جدیدی هم برای رگ‌گیری انتخاب می‌شد).

بیماران بر طبق گروهی که در آن قرار داده شدند، پس از انجام رگ‌گیری به میزان ۱/۵ سانتی‌متر (حدود ۲ گرم)، در گروه (الف) از پماد نیتروگلیسرین ساخت شرکت توریکا با غلظت ۲٪ و در گروه (ب) از پماد آلوئه ورا ساخت شرکت آریان کیمیا تک برنده مای در قسمت بالاتر از کاتر در وسعت ۴×۲ سانتی‌متر مالیله و با پوشش استریل (چسب کاتر) پوشیده شد. در گروه کنترل هیچ اقدامی انجام نشد و فقط اقدامات مراقبتی معمول مرکز را دریافت کردند.

برای اینکه یک سوکورسازی پژوهش رعایت شود، تمام مراحل رگ‌گیری و استعمال پماد توسط یک نفر پژوهشگر انجام شد. به بیماران در نگهداری از محل رگ‌گیری آموزش داده شد. به علت اینکه در بعضی تحقیقات تعویض سرت سرم را در بروز فلیست مؤثر دانسته‌اند، در این پژوهش در سه گروه ست سرم هر ۲۴ ساعت به طور یکسان تعویض شد. انجمن پرستاران کنترل عفونت، جهت جلوگیری از ایجاد فلیست مدت زمان نگهداری کاتر وریدی محیطی را ۴۸ تا ۷۲ ساعت عنوان نموده است^(۱۹). با توجه به اینکه پروتکل اجرایی در مرکز محل پژوهش ۴۸ ساعت بود، حداکثر زمان نگهداری کاتر ۴۸ ساعت در سه گروه بود. بروز و شدت

کنترل ۴۴ مورد (۸۴/۶٪) فلیت با شدت‌های مختلف دیده شد؛ که این تفاوت به لحاظ آماری معنی‌دار نبود ($P=0/105$). در ۴۸ ساعت بعد از کاتترگزاری در گروه نیتروگلیسرین ۳۹ مورد (۸۱/۳٪)، در گروه آلولئ ورا ۳۸ مورد (۷۶٪) و در گروه کنترل ۴۷ مورد (۹۰/۴٪) فلیت با شدت‌های مختلف دیده شد؛ که این تفاوت به لحاظ آماری معنی‌دار نبود ($P=0/165$). توزیع فراوانی شدت فلیت در گروه‌های مورد مطالعه به تفکیک مدت‌زمان سپری شده از کاتترگزاری بررسی شد. در ۱۲ ساعت اول بعد از کاتترگزاری در گروه نیتروگلیسرین شدت فلیت به طور میانگین ۰/۵۲ و انحراف معیار ۰/۶۲۵، در گروه آلولئ ورا به طور میانگین ۰/۲۲ و با انحراف معیار ۰/۴۶۵ و در گروه کنترل شدت فلیت به طور میانگین ۰/۷۵ و با انحراف معیار ۰/۷۶۴، این اختلاف معنی‌دار بود ($P<0/005$). در ۲۴ ساعت اول بعد از کاتترگزاری در گروه نیتروگلیسرین شدت فلیت به طور میانگین ۰/۷۷ و با انحراف معیار ۰/۸۳۱ در گروه آلولئ ورا به طور میانگین ۰/۴۸ و با انحراف معیار ۰/۶۴۶ و در گروه کنترل شدت فلیت به طور میانگین ۱/۱۲ و با انحراف معیار ۰/۸۷۸، این اختلاف معنی‌دار بود ($P<0/005$). در ۳۶ ساعت بعد از کاتترگزاری در گروه نیتروگلیسرین شدت فلیت به طور میانگین ۱/۲۵ و با انحراف معیار ۱/۰۴۲ در گروه آلولئ ورا به طور میانگین ۱/۰۴ و با انحراف معیار ۰/۹۰۳ و در گروه کنترل شدت فلیت به طور میانگین ۱/۷۹ و با انحراف معیار ۰/۹۹۷، این اختلاف معنی‌دار بود ($P=0/001$). در ۴۸ ساعت اول بعد از کاتترگزاری در گروه نیتروگلیسرین شدت فلیت به طور میانگین ۱/۹۶ و با انحراف معیار ۱/۳۶۸ در گروه آلولئ ورا به طور میانگین ۱/۵۶ و با انحراف معیار ۱/۱۲۸ و در گروه کنترل شدت فلیت به طور میانگین ۲/۴۶ و با انحراف معیار ۱/۱۲۸، این اختلاف معنی‌دار بود ($P=0/001$)

یافته‌های پژوهش در خصوص بررسی همسانی گروه‌ها از نظر توزیع سنی بیماران نشان داد که تفاوتی در میانگین گروه‌های مورد مطالعه به لحاظ آماری دیده نشد ($P=0/883$). میانگین سنی گروه نیتروگلیسرین ۵۰/۹۱، گروه آلولئ ورا ۵۱/۱۸ و گروه کنترل ۵۰/۰۹ بود.

در خصوص بررسی همسانی گروه‌ها از نظر توزیع جنس بیماران، تفاوتی در گروه‌های مورد مطالعه به لحاظ آماری دیده نشد ($P=0/909$). در گروه نیتروگلیسرین ۵۲/۰۸٪ زن و بقیه مرد بودند و گروه کنترل ۵۵/۷۷٪ زن و بقیه مرد بود.

در خصوص محل جایگذاری کاتتر، تفاوتی در گروه‌های مورد مطالعه به لحاظ آماری دیده نشد ($P=0/805$). در سه گروه ۲۲٪ روی دست، ۲۰٪ مج، ۲۸/۶۷٪ ساعد و ۲۹/۳۳٪ محل کاتترشان خم آرنج بود.

فراوانی فلیت با هر درجه‌ای در زمان‌های مختلف بعد از کاتترگزاری در سه گروه مورد مطالعه با یکدیگر مقایسه شد. ۱۲ ساعت بعد از کاتترگزاری در گروه نیتروگلیسرین ۲۱ مورد (۴۳/۸٪)، در گروه آلولئ ورا ۱۰ مورد (۲۰٪) و در گروه کنترل ۲۹ مورد (۵۵/۸٪) فلیت با درجات مختلف دیده شد؛ تفاوت در بروز فلیت در ۱۲ ساعت اول به تفکیک نوع مداخله دریافتی به لحاظ آماری معنی‌دار بود ($P=0/001$).

در ۲۴ ساعت بعد از کاتترگزاری در گروه نیتروگلیسرین ۲۶ مورد (۵۴/۲٪)، در گروه آلولئ ورا ۲۰ مورد (۴۰٪) و در گروه کنترل ۳۷ مورد (۷۱/۲٪) فلیت با شدت‌های مختلف دیده شد؛ که این تفاوت به لحاظ آماری معنی‌دار نبود ($P=0/006$).

در ۳۶ ساعت بعد از کاتترگزاری در گروه نیتروگلیسرین ۳۳ مورد (۶۶/۸٪)، در گروه آلولئ ورا ۳۴ مورد (۶۸٪) و در گروه

جدول ۱. توزیع فراوانی اطلاعات دموگرافیک بیماران

P-Value	کنترل	آلوفه ورا	نیترو‌گلیسرین	سطوح	متغیر
	۰/۸۸۳	۵۰/۰۹ (۱۱/۴۲)	۵۱/۱۸ (۱۲/۲۶)	۵۰/۹۱ (۱۰/۵۹)	میانگین (انحراف معیار)
۰/۹۰۹	۲۹ (%۵۵/۷۷)	۲۶ (%۵۲)	۲۵ (%۵۲/۰۸)	زن	جنس
	۲۳ (%۴۴/۲۳)	۲۴ (%۴۸)	۲۳ (%۴۷/۹۲)	مرد	
۰/۹۸۹	۷ (%۱۳/۴۶)	۶ (%۱۲)	۵ (%۱۰/۴۲)	مجرد	وضعیت تأهل
	۳۷ (%۷۱/۱۵)	۳۷ (%۷۴)	۳۴ (%۷۰/۸۳)	متاهل	
۰/۶۲۶	۳ (%۵/۷۷)	۲ (%۴)	۴ (%۸/۳۳)	مطلقه	تحصیلات
	۵ (%۹/۶۲)	۵ (%۱۰)	۵ (%۱۰/۴۲)	بیوه	
۰/۸۹۴	۱۷ (%۳۲/۶۹)	۱۳ (%۲۶)	۱۷ (%۳۵/۴۲)	بی‌سواد	ابتدایی
	۱۱ (%۲۱/۱۵)	۱۵ (%۳۰)	۱۱ (%۲۲/۹۲)	متوسطه	
۰/۸۹۴	۸ (%۱۵/۳۸)	۵ (%۱۰)	۴ (%۸/۳۳)	دیپلم	دانشگاهی
	۸ (%۱۵/۳۸)	۱۰ (%۲۰)	۱۳ (%۲۷/۰۸)	بازنشسته	
۰/۸۹۴	۸ (%۱۵/۳۸)	۷ (%۱۴)	۳ (%۶/۲۵)	شغل	بیکار
	۶ (%۱۱/۵۴)	۴ (%۸)	۴ (%۸/۳۳)	خانهدار	
۰/۸۹۴	۲۵ (%۴۸/۰۸)	۲۵ (%۵۰)	۲۰ (%۴۱/۶۷)	کارمند	کارمند
	۵ (%۹/۶۲)	۳ (%۶)	۲ (%۴/۱۷)	شغل آزاد	
۰/۸۹۴	۱۴ (%۲۶/۹۲)	۱۶ (%۳۲)	۲۰ (%۴۱/۶۷)	بازنشسته	بازنشسته
	۲ (%۳/۸۵)	۲ (%۴)	۲ (%۴/۱۷)		

جدول ۲. توزیع فراوانی بروز فلیبت در گروه‌های مورد مطالعه به تفکیک مدت زمان بعد از کانولاسیون

P-Value	کنترل	آلوفه ورا	نیترو‌گلیسرین	گروه
	بروز فلیبت	بروز فلیبت	بروز فلیبت	
	تعداد (%)	تعداد (%)	تعداد (%)	
۰/۰۰۱	۲۹ (۵۵/۸)	۱۰ (۲۰)	۲۱ (۴۳/۸)	بعد از ۱۲ ساعت
۰/۰۰۶	۳۷ (۷۱/۲)	۲۰ (۴۰)	۲۶ (۵۴/۲)	بعد از ۲۴ ساعت
۰/۱۰۵	۴۴ (۸۴/۶)	۳۴ (۶۸)	۳۳ (۶۶/۸)	بعد از ۳۶ ساعت
۰/۱۶۵	۴۷ (۹۰/۴)	۳۸ (۷۶)	۳۹ (۸۱/۳)	بعد از ۴۸ ساعت

جدول ۳. توزیع فراوانی شدت فلیبت در گروه‌های مورد مطالعه به تفکیک مدت زمان بعد از کانولاسیون

P-Value	کنترل	آلوفه ورا	نیترو‌گلیسرین	گروه
	شدت فلیبت	شدت فلیبت	شدت فلیبت	
	میانگین (انحراف معیار)	میانگین (انحراف معیار)	میانگین (انحراف معیار)	
۰/۰۰۰	۰/۷۵ (۰/۷۶)	۰/۲۲ (۰/۴۶)	۰/۵۲ (۰/۶۲)	بعد از ۱۲ ساعت

بعد از ۲۴ ساعت	۰/۷۷ (۰/۸۳)	۰/۴۸ (۰/۶۴)	۱/۱۲ (۰/۸۷)	۰/۰۰
بعد از ۳۶ ساعت	۱/۲۵ (۱/۰۴)	۱/۰۴ (۰/۹۰)	۱/۷۹ (۰/۹۹)	۰/۰۰۱
بعد از ۴۸ ساعت	۱/۹۶ (۱/۳۶)	۱/۵۶ (۱/۱۲)	۲/۴۶ (۱/۱۲)	۰/۰۰۱

بحث

نیتروگلیسرین بود که حاکی از مؤثرتربودن پماد آلوئه ورا نسبت به نیتروگلیسرین است.

مشابه با مطالعه حاضر در یک کارآزمایی بالینی که نمونه‌ها به دو دسته نیتروگلیسرین و کلرهگزیدین تقسیم شدند، نتایج نشان داد اختلاف معنی‌داری بین شیوع فلیبت در گروه کلرهگزیدین ۲٪ و نیتروگلیسرین ۲٪ در ۷۲ ساعت وجود نداشت؛ اما اختلاف معنی‌داری بین شیوع فلیبت در دو گروه در ۴۸ ساعت وجود داشت. ۲۲٪ در گروه نیتروگلیسرین فلیبت داشتند. ۳۲٪ در گروه کلرهگزیدین فلیبت داشتند. بر اساس این نتایج، محققین استفاده از پماد نیتروگلیسرین ۰.۲٪ موضعی و محلول کلرهگزیدین ۰.۲٪ برای کاهش فلیبت مرتبط با کاتتر وریدی را توصیه می‌نمودند و گزارش کردند استفاده از پماد نیتروگلیسرین ۰.۲٪ نسبت به محلول کلرهگزیدین مؤثرer است(۱۴). از نظر میزان ابتلاء به فلیبت یافته‌های تحقیق حاضر نیز حاکی از مؤثربودن پماد نیتروگلیسرین در کاهش فلیبت بود با این تفاوت که استفاده از پماد آلوئه ورا در کاهش فلیبت مؤثرتر بود.

در مطالعه دیگر(۱۳) درصد فلیبت در سه گروه کلوبتاژول، نیتروگلیسرین و کنتر مقایسه شد. سه گروه از لحاظ کاهش شدت فلیبت در دو زمان ۲۴ ساعت اول و ۴۸ ساعت اول بعد از جایگذاری کاتتر تفاوت معنی‌داری نداشتند؛ اما در ۷۲ ساعت بعد از جایگذاری کاتتر بین گروه‌های مداخله و کنتر معنی‌دار بود و این میزان در گروه نیتروگلیسرین از گروه کلوبتاژول بیشتر بود. بر اساس این نتایج استفاده از داروهای نیتروگلیسرین در پیشگیری از بروز فلیبت سطحی ناشی از آنزیوکت از داروی کلوبتاژول مؤثرتر بوده است. نتایج این مطالعه با نتایج تحقیق حاضر مطابقت داشته و بر تأثیر نیتروگلیسرین در کاهش فلیبت تأکید می‌شود. نتایج این مطالعه

پژوهش حاضر نشان داد که پماد آلوئه ورا و نیتروگلیسرین در مقایسه با گروه کنتر به طور معنی‌داری می‌تواند سبب کاهش بروز و شدت فلیبت در نمونه‌های مورد پژوهش شوند. بر اساس جدول شماره ۲ این تأثیر در گروه آلوئه ورا بیشتر از گروه نیتروگلیسرین بوده است.

یافته‌های این تحقیق در خصوص هدف کلی پژوهش نشان داد که میزان بروز فلیبت در ۱۲ ساعت اول بعد از جایگذاری کاتتر در گروه نیتروگلیسرین ۴۳/۸٪، آلوئه ورا ۲۰٪ و کنتر ۵۵/۸٪ بود. در هر سه گروه این تفاوت به لحاظ آماری معنی‌دار بود. ۲۴ ساعت بعد از کاتتر گذاری در گروه نیتروگلیسرین فلیبت با شدت‌های مختلف دیده شد. این تفاوت به لحاظ آماری معنی‌دار نبود. در ۳۶ ساعت بعد از کاتتر گذاری در گروه نیتروگلیسرین ۶۶/۸٪، آلوئه ورا ۴۰٪ و کنتر ۷۱/۲٪ فلیبت با درجات مختلف دیده شد. این تفاوت به لحاظ آماری معنی‌دار نبود. در ۴۸ ساعت بعد از کاتتر گذاری در گروه نیتروگلیسرین ۸۱/۳٪، آلوئه ورا ۷۶٪ و کنتر ۹۰/۴٪ فلیبت با درجات مختلف دیده شد. این تفاوت به لحاظ آماری معنی‌دار نبود. بر اساس این نتایج بروز فلیبت در گروه نیتروگلیسرین بیشتر از گروه آلوئه ورا بوده است. هرچند که میزان بروز فلیبت در هر دو گروه نیتروگلیسرین و آلوئه ورا نسبت به گروه کنتر کمتر بوده است.

میزان شدت فلیبت در گروه‌های مداخله در چهار زمان ۱۲، ۲۴، ۳۶ و ۴۸ ساعت بعد از کاتتر گذاری نسبت به گروه کنتر کاهش داشت که این میزان از نظر آماری معنی‌دار بود. این میزان کاهش در گروه آلوئه ورا به مراتب بیشتر از گروه

۱. این پژوهش در حجم نمونه بیشتر و در سایر بخش‌های بیمارستان تکرار شود.
۲. پیشه‌هاد می‌گردد از ۴۸ ساعت بعد اثر آن سنجدیده شود یا در بخش مراقبت‌های ویژه که بیماران به مدت طولانی تر بستری هستند انجام شود.
۳. بررسی تأثیر داروهای پیشگیری کننده از فلیبت در بیمارانی که داروهای مسبب فلیبت دریافت می‌کنند.
۴. مقایسه تأثیر داروهای پیشگیری کننده از فلیبت با سایر روش‌های پیشگیری از فلیبت.

نتیجه‌گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از پماد آلوئه ورا و نیتروگلیسیرین در کاهش فلیبت سطحی ناشی از کاتتر وریدهای محیطی مؤثر است؛ اما پماد آلوئه ورا نسبت به نیتروگلیسیرین مؤثرتر بوده است؛ بنابراین پیشه‌هاد می‌شود که از پماد آلوئه ورا به منظور کاهش فلیبت در بیمارانی که نیاز به استفاده از کاتتر دارند، استفاده شود.

تشکر و قدردانی

این مطالعه بخشی از نتایج پایان‌نامه دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی است؛ که در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی کردستان با کد شماره IR.MUK.REC.1397.261 به تصویب رسید. از معاونت محترم تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان به عنوان حمایت‌کننده مالی تقدیر و تشکر به عمل می‌آید. همچنین از کمیته تحقیقات دانشجویی تشکر و سپاسگزاری می‌گردد. از کارکنان محترم بخش‌های داخلی زنان و مردان بیمارستان کوثر سندج که در مدت جمع‌آوری داده‌ها صمیمانه با پژوهشگران همکاری داشتند سپاسگزاری می‌گردد. همچنین از تمامی بیمارانی که در این پژوهش شرکت کرده اند؛ سپاسگزاری می‌شود.

با نتایج تحقیق حاضر مطابقت داشته و هر دو مطالعه حاکی از مؤثر بودن تأثیر نیتروگلیسیرین بر بروز و شدت فلیبت است. در ارتباط با تأثیر آلوئه ورا در یک مطالعه (۱۵) نتایج نشان داد که درجه فلیبت به طور معنی‌داری از میانگین $60/3$ قبل از درمان آلوئه ورا به میانگین $20/1$ بعد از درمان آلوئه ورا کاهش یافت. در نتیجه‌گیری از این مطالعه مشخص گردید که درمان آلوئه ورا می‌تواند برای کاهش فلیبت مورد استفاده قرار گیرد. در مطالعه حاضر همانند مطالعه مذکور پماد آلوئه ورا در کاهش فلیبت مؤثر بود.

نیتروگلیسیرین دارویی است که باعث اتساع عروق و افزایش جریان خون و در نتیجه رقیق شدن مایع و خشی شدن محلول تزریقی می‌شود (۲۰). از آنجا که احتمال داده می‌شود فلیبت با اسپاسم ورید در ناحیه تزریق آغاز می‌شود نیتروگلیسیرین می‌تواند با اتساع عروقی و تسريع در ستر پروستاگلاندین‌های موجود در سلول‌های اندوتیال سبب حفظ یک غلظت مؤثر از پروستاگلاندین، شل شدن عضلات صاف و انقباض عروق شود (۲۱). آلوئه ورا هم با توجه به خاصیت ضد زخم و ضد التهابی و آنتی باکتریال و آنتی اکسیدانی که دارد باعث به تأخیر افتادن بروز فلیبت و کاهش شدت فلیبت در بیمارانی که کاتتر ورید محیطی دارند می‌شود.

محدودیت‌ها و متغیرهای قابل کنترل شامل عدم همکاری بیماران در حین انجام پژوهش که با حذف نمونه از پژوهش رفع گردید، مصرف داروهای متفاوت در حین بستره که با یکسان‌سازی رفع گردید، شرایط محیطی بخش‌ها که با نمونه-گیری فقط در بخش داخلی مردان و زنان رفع گردید. محدودیت‌ها و متغیرهای غیرقابل کنترل نیز شامل تفاوت‌های فردی در نوع و میزان مقاومت افراد نسبت به عوارض ناشی از تزریق وریدی، تحرک بیمار و محرک‌های محیطی بخش بود. در راستای نتایج به دست آمده پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت استفاده از پمادهای آلوئه ورا و نیتروگلیسیرین بر پیشگیری از فلیبت ناشی از کاتتر، پیشه‌هاد می‌شود که در پژوهش‌های آینده موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد:

منابع

- 1.Ghorbani S, Foadoddini M, Hasanpour Fard M, Mahdiabadi MA, Kazem Vejdan SA. The Effects of Quercetin Topical Cream on Phlebitis Caused by Peripheral Intravenous Catheters: A Randomized Controlled Trial. *Mod Care J.* 2016;13(2):e8857.
- 2.Zheng GH, Yang L, Chen HY, Chu JF, Mei L. Aloe vera for prevention and treatment of infusion phlebitis. *The Cochrane Database Syst. Rev.* 2014; 4(6):CD009162.
- 3.Helm RE, Klausner JD, Klemperer JD, Flint LM, Huang E. Accepted but unacceptable: peripheral IV catheter failure. *J Infus Nurs.* 2015; 38(3):189-203.
- 4.Sarani Ali Abadi P, Etemadi S, Abed Saeedi Z. Investigating role of mechanical and chemical factors in the creation of peripheral vein inflammation in hospitalization patients in hospital in Zahedan, Iran. *Life Sci J.* 2013;1(10)10:379-83
- 5.Wu MA, Casella F. Is clinically indicated replacement of peripheral catheters as safe as routine replacement in preventing phlebitis and other complications? *Intern Emerg Med.* 2013 Aug;8(5):443-4. PubMed PMID: 23564486. Epub 2013/04/09. eng.
- 6.Koh DBC. Exploration of the patterns of microbial colonization of intravascular devices in severely ill patients [dissertation]: University of Tasmania; 2011.
- 7.Netto S, Secoti SR. Phlebitis as a local complication of intravenous therapy: a review study. *Rev Paul Enferm.* 2004;23(3/4):254-9.
- 8.Cokmez A, Gur S, Genc H, Deniz S, Tarcan E. Effect of transdermal glyceryl trinitrate and anti - inflammatory gel in infusion phlebitis. *ANZ J Surg.* 2003;73(10):794-6.
- 9.Hay E, Blaer Y, Shlyakhover V, Katz A, Jafari J. Acute transient phlebitis during eptifibatide intravenous injection: Case report. *Heart & Lung. J Trauma Acute Care Surg.* 2010;39(3):235-6.
- 10.Di Nisio M, Wickers IM, Middeldorp S. Treatment for superficial thrombophlebitis of the leg. *Database Syst. Rev.* 2013 30(4):CD004982.
- 11.Roca GM ,Bertolo CB, Lopez PT, Samaranach GG, Ramirez MCA, Buqueras JC, et al. Assessing the influence of risk factors on rates and dynamics of peripheral vein phlebitis: an observational cohort study. *Med Clin.* 2012;139(5):185-91.
- 12.Surjushe A, Vasani R, Saple D. Aloe vera: a short review. *Indian J. Dermatol.* 2008;53(4):163.
- 13.Akbari H, Raufi S, Anbari K. Comparing the effect of nitroglycerin and clobetazol ointments on prevention of superficial intravenous catheter induced phlebitis. *EBCJ.* 2014;4(1):71-80.
- 14.Bagheri NM, Khodadadian MJ, Yazdani CJ, Tabiban S, Ala S. The Comparison Of 2% Nitroglycerin Ointment And 2% Chlorhexidine Solution Effect In Preventing Catheter-Related Phlebitis.JBUMS. 2014, 16(6): 7-15
- 15.Wahyuningsi BD, Akbar A ,editors. The Effect of Aloe Vera Gel on Phlebitis among in-Patients. International Conference on Public Health 2016: Sebelas Maret University.
- 16.Vaughn TE, McCoy KD, Beekmann SE, Woolson RF, Torner JC, Doebling BN. Factors promoting consistent adherence to safe needle precautions among hospital workers. *Infect Cont Hosp Ep.* 2004;25(7):548-55.
17. Poormohamadi M, Farsi Z, Rajai N .The Effect of 2% Chlorhexidine Gluconate Solution on Prevention of Phlebitis Related to Peripheral Venous Catheter in Patients Hospitalized in Cardiac Care Units of a Military Hospital. *MCS* 2017, 4(1): 19-29.
- 18.dos Reis PED, Silveira RCdCP, Vasques CI, de Carvalho EC. Pharmacological interventions to treat phlebitis: systematic review. *J Infus Nurs.* 2009;32(2):74-9.
- 19.Celik Z, Anil C. Complications of intravenous administration. *Daily J Gastroenterol.* 2004;8(2):158-64.
- 20.Hecker J. Potential for extending survival of peripheral intravenous infusions. *BMJ.* 1992;304(6827):619.
- 21.Katzung BG MS, Trevor AJ. Basic and clinical pharmacology. 8th ed. Philadelphia: Lippincott 2008.P.468-90