

Predisposing factors of phlebitis in children treated with vancomycin

Niloufar Bahrami¹, Maryam Tork-Torabi², Sedigheh Talakoub³, Mahboobeh Namnabati⁴

1. MSc of Pediatric Nursing, Nursing and Midwifery Care Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, Orcid ID: 0000-0002-4328-5523

2. MSc of Pediatric Nursing, Nursing and Midwifery Care Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, Orcid ID: 0000-0001-8420-7970

3. Master degree of Pediatric/ Department of Pediatric and Neonatal Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, Orcid ID:0000-0001-6912-4907

4. Associate Professor of Pediatric Nursing/ Nursing and Midwifery Care Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, (Correspondence author), Tel: 031-37927507, E-mail: namnabat@nm.mui.ac.ir, Orcid ID: 0000-0001-9956-5519

ABSTRACT

Background and Aim: Considering widespread use of vancomycin in children and the occurrence of phlebitis related peripheral intravenous catheters (PIVC); we decided to determine Predisposing factors of phlebitis in the children receiving vancomycin.

Methods and Materials: This cross-sectional descriptive-analytic study included 145 children older than 1 month who had been admitted to a medical education center in Isfahan and were under treatment with vancomycin. The sampling method was convenience and phlebitis measuring instruments were used 24, 48 and 72 hours, after the peripheral intravenous catheter insertion for every child. Chi-square test and multinomial logistic regression tests were used to analyze the data.

Results: Chi-Square test showed a significant relationship between phlebitis and catheter place, catheter size and washing catheter with 0.09%NaCl ($p<0.05$). Multinomial logistic regression indicated that age ($p=0.009$), male gender ($p=0.009$), catheter placement in upper extremity ($p=0.005$), catheter No.24 ($p=0.04$), washing catheter with 0.09%NaCl ($p<0.001$), vancomycin concentration of <5mg/ml ($p=0.004$) and infusion of total peripheral nutrition ($p=0.017$) and cephalosporins ($p=0.025$) significantly influenced incidence of phlebitis.

Conclusion: nurses can prevent phlebitis by selecting appropriate catheter considering the ratio of catheter to vein size, washing catheter with 0.09%NaCl and use of the upper extremities for catheter insertion. The concentration of vancomycin should also be <5 mg/ml and the infusion rate should not exceed 5-10 mg/min. These factors have considerable importance when children receive total peripheral nutrition and cephalosporins along with vancomycin.

Key words: Incidence, Phlebitis, Pediatric, Vancomycin, Peripheral intravenous catheter (PIVC).

Received: July 8, 2019

Accepted: Mar 10, 2020

How to cite the article: Niloufar Bahrami, Maryam Tork-Torabi, Sedigheh Talakoub, Mahboobeh Namnabati. Predisposing factors of phlebitis in children treated with vancomycin. SJKU 2021;26(2):64-78.

عوامل مستعد کننده فلیت در کودکان بیمار تحت درمان با ونکومایسین

نیلوفر بهرامی^۱، هرمیم ترک ترابی^۲، صدیقه طلاکوب^۳، محبوبه نم نباتی^۴

۱. کارشناس ارشد پرستاری کودکان/ مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران،
شناسه ارکید: ۵۵۲۳-۴۳۲۸-۰۰۰۲-۰۰۰۰

۲. کارشناس ارشد پرستاری کودکان/ بیمارستان آموزشی درمانی امام حسین (ع)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران،
شناسه ارکید: ۷۹۷۰-۸۴۲۰-۰۰۰۰-۱

۳. کارشناس ارشد پرستاری/ گروه پرستاری و نوزادان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران،
شناسه ارکید: ۶۹۱۲-۴۹۰۷-۰۰۰۱-۰۰۰۰

۴. دانشیار گروه پرستاری کودکان و نوزادان/ مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
(نویسنده مسئول)، تلفن ثابت: ۰۳۱۳۷۹۲۷۵۰، پست الکترونیک: namnabat@nm.mui.ac.ir، شناسه ارکید: ۵۵۱۹-۹۹۵۶-۰۰۰۱-۰۰۰۰

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به مصرف چشمگیر ونکومایسین در کودکان و بروز فلیت در کاتترهای ورید محیطی؛ این مطالعه با هدف تعیین عوامل مستعد کننده فلیت در کودکان تحت درمان با ونکومایسین انجام شد.

روش بررسی: این یک مطالعه مقطعی، از نوع توصیفی-تحلیلی بود که بر روی ۱۴۵ کودک بزرگتر از ۱ ماه، تحت درمان با ونکومایسین و بسترهای در یک مرکز آموزشی درمانی در اصفهان، انجام گرفت. نمونه‌ها به روش آسان انتخاب و ابزار اندازه‌گیری فلیت؛ ۴۸، ۲۴ و ۷۲ ساعت بعد از تعییه کاتتر برای هر کودک تکمیل شد. داده‌ها توسط آزمون کایاسکوئر و رگرسیون لجستیک چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: بر اساس نتایج آزمون کایاسکوئر، بین بروز فلیت با محل تعییه، شماره کاتتر و شستشوی کاتتر با نرمال سالین $<0.9\%$ ارتباط معنادار یافت شد ($p=0.05$). بر اساس آزمون رگرسیون لجستیک چندگانه، سن ($p=0.09$)، جنس مذکور ($p=0.09$)، قرارگیری کاتتر در اندام فوقانی ($p=0.05$)، کاتتر شماره ۲۴ ($p=0.04$)، شستشوی کاتتر با نرمال سالین $<0.9\%$ ($p=0.01$)، غلظت $5\text{mg}/\text{ml}$ ونکومایسین ($p=0.04$)، انفوژیون تغذیه کامل وریدی ($p=0.017$) و سفالوسپورین‌ها ($p=0.025$)، به طور معناداری بر روی احتمال بروز فلیت تأثیرگذار بودند.

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها، پرستاران می‌توانند با درنظر گرفتن نسبت کاتتر به رگ و انتخاب کاتتر مناسب، استفاده از اندام فوقانی و شستشوی کاتتر با نرمال سالین، از بروز فلیت پیشگیری کنند. بعلاوه لازم است غلظت نهایی ونکومایسین $<5\text{mg}/\text{ml}$ بوده و سرعت انفوژیون آن از $10-5\text{ mg/min}$ تجاوز نکند. زمانی که کودکان به جز ونکومایسین، محلول‌های تغذیه وریدی و سفالوسپورین‌ها را نیز دریافت می‌کنند، این موارد اهمیت دوچندان می‌یابد.

واژه‌های کلیدی: بروز، فلیت، کودکان، ونکومایسین، کاتتر ورید محیطی.

وصول مقاله: ۹۸/۴/۱۷ اصلاحیه نهایی: ۹۸/۱۲/۲۰ پذیرش: ۹۸/۱۰/۷

مقدمه

و انرژی آن‌ها و ایجاد نارضایتی از خود را به دنبال دارد که می‌تواند سبب کاهش کیفیت عملکرد پرستاران شود (۹). در راستای شناسایی عوامل مرتبط با فلیبت، پیشگیری از آن و افزایش طول عمر کاتترها، مطالعاتی در ایران انجام گرفته که اکثرًا در بزرگسالان بوده است (۱۰-۱۵)؛ اما با توجه به تفاوت‌های فیزیولوژیکی و روحی روانی کودکان نسبت به بالغین، مثل عروق باریک، حساس بودن گردنخون، احتمال وجود کم‌آبی، نسبت بالاتر سطح بدن به وزن، متابولیسم بالاتر، توانایی کمتر دفع کلیوی، ناتوانی در کاتابولیسم دارو، خطر مسمومیت دارویی، اضطراب کودکان و همکاری ضعیف آن‌ها، که خطر فلیبت و عوارض رگ‌گیری مکرر را افزایش می‌دهند (۲ و ۱۶) و همچنین مصرف چشمگیر و نکومایسین به عنوان استاندارد درمانی عفونت‌های کودکان که خود به عنوان عامل تسريع کننده فلیبت شناخته شده است (۲)، این مطالعه با هدف تعیین عوامل مستعد کننده فلیبت در کودکان تحت درمان با و نکومایسین انجام گرفت.

روش بررسی

پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی و به روش مشاهده‌ای است که جامعه آماری آن شامل کلیه کودکان بزرگ‌تر از ۱ ماه، بستری در یک مرکز آموزشی درمانی در اصفهان بودند که در زمان اجرای پژوهش (اردیبهشت تا آذر ۱۳۹۶)، حداقل به مدت ۷۲ ساعت، تحت درمان با و نکومایسین با استفاده از کاتتر ورید محیطی قرار داشتند. معیارهای خروج از مطالعه شامل اعلام عدم رضایت والدین به همکاری، ایجاد شرایط حاد و اورژانسی در کودک، عدم موافقیت در رگ‌گیری عروق محیطی و نیاز به وصل کاتتر مرکزی و ترخیص یا فوت کودک قبل از اتمام ۷۲ ساعت بود. همچنین خروج کاتتر به دلایلی به جز فلیبت و یا قطع افزویون و نکومایسین قبل از اتمام دوره پژوهش،

Peripheral az Kather and Venous Catheter: PIVC استفاده از کاتتر ورید محیطی (Intravenous Catheter)، یک رویه متدائل و تهاجمی جهت مایع درمانی و افزویون داروها در کودکان بستری است (۱)، که مانند هر روش درمانی دیگر، علاوه بر مزیت‌های خود، عوارضی نیز به همراه دارد. فلیبت یکی از شایع‌ترین عوارض قابل پیشگیری کاتترهای ورید محیطی و علت اصلی خارج کردن کاتترها قبل از زمان پیش‌بینی شده است (۲). به طور کل شیوع فلیبت در کودکان بستری ۱/۵ تا ۷/۷٪ تخمین زده شده (۳) که این عارضه در ایران ۱۸ تا ۸۹٪ است (۴)، در حالی که انجمن پرستاران آمریکا (American Nurses Association : ANA) شیوع قابل قبول فلیبت را ۵ درصد یا کمتر ذکر می‌کند (۵). ارزیابی مکرر محل کاتتر ورید محیطی توسط پرستار، یک اقدام پیشگیرانه در جهت تشخیص زودهنگام فلیبت و جلوگیری از عوارض خطرناک قلبی ریوی آن شامل ترومبوفیلت، آمبولی و گاهی قطع اندام به خصوص در نوزادان به حساب می‌آید (۶). علائم و نشانه‌هایی همچون: درد، حساسیت، گرمی، تورم، قرمزی، طنابی شدن مسیر ورید و کاهش سرعت جریان محلول علامت‌های بروز فلیبت بوده که به دنبال آن لازم است کاتتر سریعاً خارج شده و به منظور ادامه درمان دارویی، کاتتر جدید در محل دیگر تعییه شود (۵). رگ‌گیری مکرر علاوه بر افزایش طول مدت بستری، تحمیل هزینه‌های اقتصادی، افزایش احتمال ابتلا به عفونت، عدم آسایش، ایجاد درد و خاطره نامطلوب برای کودک بیمار؛ سبب سخت‌تر شدن دستیابی به عروق جدید و افزایش احتمال استفاده از روش‌های تهاجمی دیگر نظری جایگذاری کاتترهای ورید مرکزی یا کاتدان می‌شود که به مراتب دارای عوارض بیشتری می‌باشند (۷ و ۸). همچنین نیاز به رگ‌گیری مکرر، نگرانی والدین، استرس و فشار روحی برای پرستاران، اتلاف وقت

کارتی قرار می‌گرفت که مشخص کننده تحت پژوهش بودن بیمار بود. پژوهشگر در شروع مطالعه توضیحات لازم را در خصوص کلیات طرح برای کارکنان بخش‌های هدف ارائه داد و همکاری آن‌ها را جلب نمود. روش کار به این صورت بود که بعد از تعیین شرکت کنندگان، توضیحات لازم در مورد هدف کار و شیوه اجرا به والدین کودکان ارائه شده و پس از جلب موافقت و کسب رضایت‌نامه کتبی از آن‌ها، محل کاتتر ورید محیطی کودک در زمان رگ-گیری و ۴۸، ۲۴ و ۷۲ ساعت بعد از تعییه کاتتر مشاهده و علائم فلیبت بررسی می‌شد و در صورت مشاهده فلیبت در هر زمان از مطالعه، محل کاتتر سریعاً تعویض شده و مطالعه این کودک به اتمام می‌رسید. شرکت کنندگان اجازه داشتند که در هر مرحله از پژوهش و در صورت عدم تمایل، از ادامه همکاری انصراف داده و سایر اقدامات درمانی طبق روئین برای آن‌ها انجام گیرد. داده‌های حاصل از مطالعه توسط نرم‌افزار SPSS نسخه ۱۸ (version 18.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA). آماری توصیفی، کای‌اسکوئر و رگرسیون لجستیک چندگانه، در سطح معناداری 0.05 تجزیه و تحلیل شد.

ما فتھا

از معیارهای خروج از مطالعه بود. حجم نمونه در سطح اطمینان ۹۵٪ و با میزان دقت حداقل $d=0.175$ و احتمال ۱۰٪ ریزش، ۱۴۵ برآورد گردید که به روش در دسترس انتخاب شدند.

ابزار گردآوری داده‌ها شامل چک لیست اطلاعات مربوط به متغیرهای مورد بررسی و مقیاس استاندارد فلیت بود که با توجه به اهداف و نمونه‌های مورد بررسی انتخاب شد. مقیاس استاندارد فلیت بر اساس وجود علائم فلیت شامل درد، گرمی، طنابی شدن، قرمزی و تورم و به صورت مشاهده‌ای تکمیل می‌گردد. در این مقیاس به وجود علائم درد، گرمی و طنابی شدن محل کاتر نمره ۱ و به عدم وجود آن‌ها نمره صفر داده می‌شود. در مورد علامت قرمزی به عدم وجود، نمره صفر؛ قرمزی خفیف، نمره ۱ و قرمزی شدید نمره ۲ تعلق می‌گیرد. در رابطه با تورم، عدم وجود، نمره صفر؛ تورم کمتر از ۴ سانتی‌متر، نمره ۱ و تورم بیشتر از ۴ سانتی‌متر، نمره ۲ دریافت می‌کند. سپس نمره نهایی محاسبه و کسب حداقل ۲ نمره برای تشخیص فلیت کافی است. روایی مقیاس با استفاده از روش اعتبار محتوی و پایایی آن از طریق پایایی مشاهده‌ها و با ضریب همبستگی کرامر و فی برای مجموع نمرات در دو مشاهده‌گر $(p=0.04)$ توسط کلاهدوزی پور و همکارانش مورد تائید قرار گرفته است.^(۸)

به منظور عدم سوگیری و اجتناب از تورش، دو دانشجوی پرستاری در مرحله نمونه‌گیری و جمع‌آوری داده‌ها همکاری کردند. یک نفر به طور ثابت انتخاب نمونه‌ها و تکمیل چکلیست متغیرها را بر عهده داشت و نفر دوم، مسئول تکمیل مقیاس فلیت بود. قبل از شروع کار، شرایط ورود به مطالعه، روش نمونه‌گیری، کسب رضایت آگاهانه و شیوه گردآوری اطلاعات برای آن‌ها توضیح داده شد. همچنین بر روی کاردکس هریک از بیماران مورد پژوهش

جدول ۱: فراوانی متغیرهای مورد نظر در کودکان تحت درمان با ونکومایسین

متغیر	تعداد (درصد)	متغیر	تعداد (درصد)	متغیر
شیرخوار (۱۲ تا ۱۲ ماه)	۵۹(۴۰/۶۸)	غلظت نهایی	≤۵ (mg/ml)	۶۵(۴۴/۸۲)
نوپا (۱۳ تا ۳۶ ماه)	۳۴(۲۳/۴۴)	ونکومایسین	>۵ (mg/ml)	۸۰(۵۵/۱۷)
خردسال (۳۷ تا ۷۲ ماه)	۳۷(۲۵/۵۱)	مدت زمان انفوژیون	<۳۰ min	۹۶(۶۶/۲۰)
سن مدرسه (۷۳ تا ۱۴۴ ماه)	۱۵(۱۰/۳۴)	ونکومایسین	۳۰-۶۰ min	۴۹(۳۳/۷۹)
پسر	۶۲(۴۲/۷۵)		>۶۰ min	۰(۰)
جنس				
دختر	۸۳(۵۷/۲۴)			
دارد	۸۳(۵۷/۲۴)			
علائم کم آبی	۶۲(۴۲/۷۵)			
ندارد	۶۲(۴۲/۷۵)			
محل نصب کاتر	۴۴(۳۰/۳۴)			
اندام فرقانی	۱۰۱(۶۹/۶۵)			
وریدی	۶۸(۴۶/۸۹)			
شماره کاتر	۷۷(۵۳/۱۰)			
آتل	۱۳۶(۹۳/۷۹)			
ندارد	۹(۶/۲۰)			
محلول	۹۶(۶۶/۲۰)			
ضد عفونی کننده	۳۷(۲۵/۵۱)			
بندادین٪	۱۲(۸/۲۷)			
نوع پاسمنان کاتر	۷۹(۵۴/۴۸)			
وریدی	۵۰(۳۴/۴۸)			
چسب شفاف	۱۶(۱۱/۰۴)			

جنس کودک، وجود کم آبی، غلظت نهایی و مدت زمان انفوژیون ونکومایسین، نوع محلول ضد عفونی کننده و پاسمنان در محل کاتر، استفاده از آتل و انفوژیون سایر داروها یافت نشد (جدول ۲).

نتایج آزمون کای اسکوئر، ارتباط معناداری را بین بروز فلبیت و محل تعییه و شماره کاتر و شستشوی کاتر با نرمال سالین، قبل و بعد از انفوژیون ونکومایسین نشان داد ($P < 0.05$)؛ اما ارتباط معناداری بین بروز فلبیت و سن و

جدول ۲: ارتباط بین بروز عارضه فلبیت و متغیرها، در کودکان تحت درمان با ونکومایسین

متغیرها	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	تعداد (درصد)	متغیرها
سن	۲۶(۴۴/۱)	۱۹(۳۲/۲)	۱۴(۲۳/۷)	شیرخوار
	۱۳(۳۸/۲)	۱۳(۳۸/۲)	۸(۲۳/۵)	نوپا
	۲۰(۵۴/۱)	۱۰(۲۷/۰)	۷(۱۸/۹)	خردسال
	۵(۳۳/۳)	۴(۲۶/۷)	۶(۴۰/۰)	سن مدرسه
جنس	۳۲(۵۱/۶)	۲۰(۳۲/۳)	۱۰(۱۶/۱)	پسر
	۳۲(۳۸/۶)	۲۶(۳۱/۳)	۲۵(۳۰/۱)	دختر
کم آبی	۳۴(۴۸/۴)	۲۷(۳۲/۵)	۲۲(۲۶/۵)	دارد
	۳۰(۴۱/۰)	۱۹(۳۰/۶)	۱۳(۲۱/۰)	ندارد
محل کاتر	۲۲/۱۰۸	۷(۱۵/۹)	۱۸(۴۰/۹)	اندام فرقانی
	۰/۰۰۰			

		۵۶(۵۶/۰)	۲۸(۲۸/۰)	۱۶(۱۶/۰)	اندام تحتانی
۰/۰۵	۵/۹۸	۲۳(۳۴/۸)	۲۱(۳۱/۸)	۲۲(۳۳/۳)	(زرد) ۲۴
		۳۹(۵۰/۶)	۲۵(۳۲/۵)	۱۳(۱۶/۹)	(آبی) ۲۲
۰/۲۶	۲/۹۹۱	۶۲(۴۵/۶)	۴۳(۳۱/۶)	۳۱(۲۲/۸)	دارد
		۲(۲۲/۲)	۳(۳۳/۳)	۴(۴۴/۴)	ندارد
		۴۳(۴۴/۸)	۳۲(۳۳/۳)	۲۱(۲۱/۹)	کلرهاگریدین
۰/۸۸	۲/۳۹۱	۱۵(۴۰/۵)	۱۲(۳۲/۴)	۱۰(۲۷/۰)	الكل
		۶(۵۰/۰)	۲(۱۶/۶۶)	۴(۳۳/۳۳)	بتادین
		۳۶(۴۵/۶)	۲۵(۳۱/۶)	۱۸(۲۲/۸)	لکوپلاست
۰/۹۳۶	۱/۸۱۲	۱۱(۴۰/۷)	۹(۳۳/۳)	۷(۲۵/۹)	چسب برانول
		۱۷(۴۳/۵۸)	۱۲(۳۰/۷۶)	۱۰(۲۵/۶۴)	چسب شفاف
۰/۳۲۶	۲/۲۴	۳۳(۵۰/۸)	۱۹(۲۹/۲)	۱۳(۲۰/۰)	غاظط
		۳۱(۲۷/۵)	۲۷(۳۳/۸)	۲۲(۳۸/۸)	ونکومایسین
		۴۲(۴۳/۸)	۳۲(۳۳/۳)	۲۲(۲۲/۹)	مدت زمان
۰/۸۱۲	۰/۴۱۷	۲۲(۴۴/۹)	۱۴(۲۸/۶)	۱۳(۲۶/۵)	انفوزیون
					ونکومایسین
۰/۰۰۰	۱۸/۶۰۵	۴۳(۶۰/۶)	۲۰(۲۸/۲)	۸(۱۱/۳)	دارد
		۲۱(۲۸/۴)	۲۶(۳۵/۱)	۲۷(۳۶/۵)	ندارد
					شستشو با نرمال
۰/۰۸۵	۴/۹۳۲	۷(۲۸/۰)	۸(۳۲/۰)	۱۰(۴۰/۰)	دارد
		۵۷(۴۷/۵)	۳۸(۳۱/۷)	۲۵(۲۰/۸)	ندارد
۰/۶۶۶	۰/۸۱۲	۳۳(۴۶/۵)	۲۰(۳۵/۱)	۱۸(۲۵/۴)	دارد
		۳۱(۴۱/۹)	۲۶(۲۸/۲)	۱۷(۲۳/۰)	ندارد
۰/۳۴۸	۲/۱۰۹	۷(۵۳/۸)	۵(۳۸/۵)	۱(۷/۷)	دارد
		۵۷(۴۳/۲)	۴۱(۳۱/۱)	۳۴(۲۵/۸)	ندارد
۰/۹۰۱	۰/۲۰۹	۲۳(۴۵/۱)	۱۵(۲۹/۴)	۱۳(۲۵/۵)	دارد
		۴۱(۴۳/۶)	۳۱(۳۳/۰)	۲۲(۲۳/۴)	ندارد
۰/۰۷۸	۵/۰۹۸	۴(۵۰/۰)	۰()	۴(۵۰/۰)	دارد
		۶۰(۴۳/۸)	۴۶(۳۳/۶)	۳۱(۲۲/۶)	ندارد
۰/۹۲۹	۰/۱۴۸	۴۴(۴۳/۰)	۲۵(۳۱/۶)	۲۰(۲۵/۳)	دارد
		۳۰(۴۵/۵)	۲۱(۳۱/۸)	۱۵(۲۲/۷)	ندارد
					آپوتل

کای اسکوئر معناداری مدل بروزی و مقدار احتمال کمتر از ۰/۰۵ محاسبه شد (جدول ۳).

به منظور بررسی عوامل مرتبط با احتمال بروز فلیبت و با توجه به سه حالت بودن متغیر وابسته (فلیبت)، از رگرسیون آنتی اسیدها لجستیک چندگانه استفاده شد. در ابتدا با استفاده از آزمون

جدول ۳: ارزیابی برآذش مدل رگرسیون لوجستیک

آزمون های نسبت بخت		معیار برآذش مدل	مدل
p	df	χ^2	عرض از مبدأ
<۰/۰۰۱	۵۰	۱۰۴/۶۲۵	۳۰۱/۹۹۶
			کل ۱۹۷/۳۷۲

ساعت بعد است. در مجموع این مدل ۶۸/۸ درصد موارد متغیر وابسته را به درستی پیش‌بینی می‌کند (جدول ۴).

میزان دقت پیش‌بینی مدل نیز در جدول ۴ نشان داده شده است. طبق یافته‌ها، کمترین دقت مربوط به بروز فلیت، ۴۸ ساعت بعد از تعییه کاتتر و بیشترین دقت مربوط به ۷۲ ساعت بعد از تعییه کاتتر و بیشترین دقت مربوط به

جدول ۴: میزان دقت پیش‌بینی مدل

پیش‌بینی	مشاهده شده			
	بعد از نصب کاتتر 24hr	بعد از نصب کاتتر 48hr	بعد از نصب کاتتر 72hr	بعد از نصب کاتتر ۲۴hr
۷۳٪/۵	۴	۵	۲۵	۷۳٪/۵
۵۴٪/۳	۱۵	۲۵	۶	۵۴٪/۳
۷۷٪/۰	۴۷	۱۰	۴	۷۷٪/۰
۶۸٪/۸	۴۶٪/۸	۲۸٪/۴	۲۴٪/۸	نسبت کلی

هر متغیر مستقل، ثابت در نظر گرفته شد. طبق نتایج جدول ۵، سن ($p=0.009$)، کاتتر شماره ۲۴ (۲۴)، غلظت $5mg/ml$ <ونکومایسین ($p=0.05$)، شستشو کاتتر با نرمال سالین (۰.۰۳۶) ($p=0.034$) و دریافت سفالوسپورین‌ها (۰.۰۱۷) ($p=0.0017$)، به طور معناداری بر روی احتمال بروز فلیت، ۴۸ ساعت بعد از تعییه کاتتر نسبت به ۲۴ ساعت بعد تأثیرگذار بودند.

برای بررسی تأثیر هر متغیر مستقل، سطح اول یعنی بروز فلیت ۲۴ ساعت بعد از تعییه کاتتر به عنوان رفرنس در نظر گرفته شد و دو سطح بعد یعنی بروز فلیت ۴۸ ساعت و ۷۲ ساعت بعد از تعییه کاتتر بر اساس آن محاسبه شد که به ترتیب در جدول ۵ و ۶ نشان داده شده اند. آماره آزمون والک، معنی داری متغیرها را نشان می‌دهد. آخرین رسته در

جدول ۵: برآورد ضریب مدل رگرسیون لجستیک چندگانه برای نسبت بروز فلیت، ۴۸ ساعت بعد از تعییه کاتتر*

متغیرها	پارامتر	استاندارد	خطای standar	مقدار χ^2 والد	df	p	بخت ها	برآورد نسبت	حدپایین	فاصله اطمینان ۹۵٪	حدبالا
عرض از مبدأ	-21/505	۳/۵۲۱	۳۷/۳۱۱	۰/۰۰۰	۱	-	-	-	-	-	-
شیرخوار	۴/۹۶۴	۱/۸۹۹	۶/۸۳۷	۰/۰۰۹	۱	۰/۰۰۹	۱۴۳/۲۳۱	۳/۴۶۷	۵۹۱۷/۰۷۸	۰/۰۰۹	۰/۰۰۹
نوبتا	۴/۳۶۳	۱/۸۴۱	۵/۶۱۴	۰/۰۱۸	۱	۰/۰۱۸	۷۸/۴۵۴	۲/۱۲۵	۲۸۹۵/۸۸۶	۰/۰۱۸	۰/۰۱۸
سن	۳/۶۰۳	۱/۶۲۴	۴/۹۲۳	۰/۰۲۶	۱	۰/۰۲۶	۳۶/۶۹۳	۱/۵۲۲	۸۸۴/۳۶۸	۰/۰۲۶	۰/۰۲۶
خردسال	۰ ^b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سن مدرسه	۱/۲۵۷	۰/۷۳۲	۲/۹۵۵	۰/۰۸۶	۱	۰/۰۸۶	۳/۵۱۶	۰/۸۳۸	۱۴/۷۴۹	۰/۰۸۶	۰/۰۸۶
پسر	۰ ^b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جنسیت	۰/۷۰۹	۰/۷۵۱	۰/۸۹۲	۰/۳۴۵	۱	۰/۰۳۴۵	۲/۰۳۳	۰/۴۶۶	۸/۸۶۱	۰/۰۳۴۵	۰/۰۳۴۵
کم آبی	۰ ^b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
محل کاتتر	-۰/۲۱۵	۰/۷۴۰	۰/۰۸۴	۰/۰۷۷۱	۱	۰/۰۷۷۱	۰/۸۰۷	۰/۱۸۹	۳/۴۳۸	۰/۰۷۷۱	۰/۰۷۷۱
اندام تھانایی	۰ ^b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شماره کاتتر	-۱/۴۹۲	۰/۷۷۷	۴/۲۰۹	۰/۰۴۰	۱	۰/۰۴۰	۰/۲۲۵	۰/۰۵۴	۰/۹۳۵	۰/۰۴۰	۰/۰۴۰
(آبی)	۰ ^b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
آتل	۲/۰۲۲	۱/۷۳۷	۱/۳۵۵	۰/۲۴۴	۱	۰/۰۲۴۴	۷/۵۵۷	۰/۲۵۱	۲۲۷/۶۲۰	۰/۰۲۴۴	۰/۰۲۴۴

-	-	-	-	*	-	-	0 ^b	دارد	
۳/۳۵۰	۰/۱۴۸	۰/۷۰۳	۰/۶۵۹	۱	۰/۱۹۵	۰/۷۹۶	-۰/۳۵۲	کلرهگریدین	ضد عفونی
-	-	-	-	*	-	-	0 ^b	الكل	کتنده
۱۳۷/۰۴۶	۰/۰۱۷	۱/۵۰۹	۰/۸۵۸	۱	۰/۰۳۲	۲/۳۰۰	۰/۴۱۲	لکوپلاست	پاسمان
۵۳/۶۵۸	۰/۰۰۸	۰/۶۶۴	۰/۸۵۵	۱	۰/۰۳۳	۲/۲۴۱	-۰/۴۰۹	چسب برانول	کاتتر
-	-	-	-	*	-	-	0 ^b	چسب شفاف	
۶۹/۴۶۲	۰/۹۹۴	۸/۳۰۹	۰/۰۵۰	۱	۳/۸۲۰	۱/۰۸۳	۲/۱۱۷	≤ 5 (mg/ml)	غله
-	-	-	-	*	-	-	0 ^b	> 5 (mg/ml)	ونکومایسین
۶۱/۱۶۹	۰/۷۰۵	۶/۵۶۶	۰/۰۹۸	۱	۲/۷۳۲	۱/۱۳۹	۱/۸۸۲	< 30 min	انفروزیون
-	-	-	-	*	-	-	0 ^b	$30-60$ min	ونکومایسین
۰/۸۶۷	۰/۰۲۹	۰/۱۵۷	۰/۰۳۴	۱	۴/۵۰۸	۰/۸۷۱	-۱/۸۴۹	ندارد	شیستشو با
-	-	-	-	*	-	-	0 ^b	دارد	نرمال سالین
تزریق سایر داروها از کاتتر									
۱۶/۰۴۲	۰/۷۸۶	۳/۵۵۰	۰/۱۰۰	۱	۲/۷۱۱	۰/۷۶۹	۱/۲۶۷	ندارد	تغذیه کامل
-	-	-	-	*	-	-	0 ^b	دارد	وریدی
۶/۱۹۲	۰/۳۳۶	۱/۴۴۱	۰/۶۲۳	۱	۰/۲۴۲	۰/۷۴۴	۰/۳۶۶	ندارد	سایر آنتی بیوتیک ها
-	-	-	-	*	-	-	0 ^b	دارد	
۰/۵۰۷	۰/۰۰۱	۰/۰۲۱	۰/۰۱۷	۱	۶/۶۵۰	۱/۶۳۰	-۳/۸۷۵	ندارد	سفالوسپورین ها
-	-	-	-	*	-	-	0 ^b	دارد	
۴/۷۱۲	۰/۲۶۲	۱/۱۱۱	۰/۸۸۷	۱	۰/۰۲۰	۰/۷۳۷	۰/۱۰۵	ندارد	آنتی اسیدها
-	-	-	-	*	-	-	0 ^b	دارد	
۲۲۰۳۱۳۱۷۱/۹۹۱	۲۲۰۳۱۳۱۷۱/۹۹۱	۲۲۰۳۱۳۱۷۱/۹۹۱	-	۱	-	۰/۰۰۰	۱۹/۲۵۵	ندارد	کورتیکوستروئیدها
-	-	-	-	*	-	-	0 ^b	دارد	
۲/۲۷۶	۰/۱۳۹	۰/۵۶۲	۰/۴۱۹	۱	۰/۶۵۲	۰/۷۱۴	-۰/۵۷۶	ندارد	آپوتل
-	-	-	-	*	-	-	0 ^b	دارد	

*The reference category: 24hr after peripheral intravenous catheter (PIV) insertion

χ^2 : Chi-Square test

df: degree of freedom

p: p value

همچنین نتایج جدول ۶ حاکی از تأثیر معنادار سن (p=۰/۰۰۹)، دریافت تغذیه کامل وریدی (p=۰/۰۰۴) و سفالوسپورین ها (p=۰/۰۲۵) بر روی احتمال بروز فلیت، ۷۲ ساعت بعد از تعییه کاتتر نسبت به ۲۴ ساعت بعد است.

همچنین نتایج جدول ۶ حاکی از تأثیر معنادار سن (p=۰/۰۰۹)، جنس مذکر (p=۰/۰۰۹)، قرارگیری کاتتر در اندام فوقانی (p=۰/۰۰۵)، شیستشوی کاتتر با نرمال سالین ونکومایسین (> 5 mg/ml) (p<۰/۰۰۱)، غله

جدول ۶: برآور د ضریب مدل رگرسیون لجستیک چندگانه برای نسبت بروز فلیبت، ۷۲ ساعت بعد از تعییه کاتتر*

فاصله اطمینان٪ ۹۵	برآورد		مقدار			متغیرها		
	نسبت	بخت	p	Df	χ²	خطای استاندارد		
	حد بالا	حد پایین	ها	والد				
-	-	-	۰/۴۳۵	۱	۰/۶۱۰	۳/۸۲۷	-۲/۹۸۸	عرض از مبدأ
۱۴۶۶/۱۹۹	۲/۸۷۳	۶۴/۹۰۲	۰/۰۰۹	۱	۶/۸۸۲	۱/۵۹۱	۴/۱۷۳	شیرخوار
۲۶۹۷/۰۳۱	۲/۲۵۲	۷۷/۹۳۷	۰/۰۱۶	۱	۵/۸۰۳	۱/۸۰۸	۴/۳۵۶	نوپا
۲۱۵۹/۹۴۸	۱/۳۹۱	۵۴/۸۲۱	۰/۰۳۳	۱	۴/۵۶۳	۱/۸۷۴	۴/۰۰۴	خردسال
-	-	-	-	*	-	-	۰ ^b	سن مدرسه
۳۲/۹۳۷	۱/۶۴۷	۷/۳۶۶	۰/۰۰۹	۱	۶/۸۲۸	۰/۷۶۴	۱/۹۹۷	پسر
-	-	-	-	*	-	-	۰ ^b	دختر
۱۳/۰۴۱	۰/۵۴۲	۲/۶۵۸	۰/۲۲۸	۱	۱/۴۵۱	۰/۸۱۱	۰/۹۷۸	ندارد
-	-	-	-	*	-	-	۰ ^b	دارد
۰/۴۶۶	۰/۰۱۲	۰/۰۷۶	۰/۰۰۵	۱	۷/۷۵۸	۰/۹۲۵	-۲/۵۷۶	اندام فوقانی
-	-	-	-	*	-	-	۰ ^b	اندام تحتانی
۱/۳۴۸	۰/۰۶۴	۰/۲۹۴	۰/۱۱۵	۱	۲/۴۸۲	۰/۷۷۷	-۱/۲۲۴	(زرد) ۲۴
-	-	-	-	*	-	-	۰ ^b	(آبی) ۲۲
۲۱۱/۷۶۰	۰/۱۷۱	۶/۰۱۹	۰/۳۲۳	۱	۰/۹۷۶	۱/۸۱۷	۱/۷۹۵	ندارد
-	-	-	-	*	-	-	۰ ^b	دارد
۹/۰۱۵	۰/۰۹۱	۰/۹۰۵	۰/۹۳۲	۱	۰/۰۰۷	۱/۱۷۳	-۰/۰۹۹	کلرهگزیدین
-	-	-	-	*	-	-	۰ ^b	الكل
۲۸۶/۵۹۷	۰/۰۱۳	۱/۹۰۳	۰/۸۰۱	۱	۰/۰۶۳	۲/۵۵۹	۰/۶۴۳	لکوبلاست
۱۴۱/۷۹۹	۰/۰۱۰	۱/۱۶۷	۰/۹۵۰	۱	۰/۰۰۴	۲/۴۴۹	۰/۱۵۵	چسب برانول
-	-	-	-	*	-	-	۰ ^b	چسب شفاف
۲۸۴/۶۴۰	۲/۹۸۱	۲۹/۱۲۹	۰/۰۰۴	۱	۸/۴۰۵	۱/۱۶۳	۳/۳۷۲	≤۵ (mg/ml)
-	-	-	-	*	-	-	۰ ^b	>۵ (mg/ml)
۳۲/۰۲۱	۰/۳۴۴	۳/۳۲۱	۰/۲۹۹	۱	۱/۰۷۷	۱/۱۵۶	۱/۲۰۰	<۳۰ min
-	-	-	-	*	-	-	۰ ^b	۳۰-۶۰ min
۰/۱۲۰	۰/۰۰۲	۰/۰۱۶	۰/۰۰۰	۱	۱۶/۲۰۲	۱/۰۲۸	-۴/۱۳۷	ندارد
-	-	-	-	*	-	-	۰ ^b	دارد
تریک سایر داروها از کاتتر								
۵۳/۱۸۳	۱/۳۱۷	۸/۳۶۹	۰/۰۲۴	۱	۵/۰۷۰	۰/۹۴۴	۲/۱۲۴	ندارد
-	-	-	-	*	-	-	۰ ^b	دارد
۴/۵۰۰	۰/۱۹۴	۰/۹۳۴	۰/۹۳۲	۱	۰/۰۰۷	۰/۸۰۲	-۰/۰۶۸	سایر آنتی بیوتیک ها

									دارد	دارد	
۰/۶۲۱	۰/۰۰۱	۰/۰۲۳	۰/۰۲۵	۱	۵/۰۳۴	۱/۶۷۸	-۳/۷۶۴	دارد	دارد	سفالوسپورین‌ها	
-	-	-	-	۰	-	-	۰ ^b	دارد	دارد		
۳/۵۰۲	۰/۱۵۰	۰/۷۲۵	۰/۶۸۹	۱	۰/۱۶۰	۰/۸۰۳	-۰/۳۲۱	دارد	دارد	آنٹی اسیدها	
-	-	-	-	۰	-	-	۰ ^b	دارد	دارد		
۱۱۸/۸۶۳	۰/۳۲۱	۶/۱۷۳	۰/۲۲۸	۱	۱/۴۵۵	۱/۵۰۹	۱/۸۲۰	دارد	دارد	کورتیکوستروئیدها	
-	-	-	-	۰	-	-	۰ ^b	دارد	دارد		
۶/۶۹۷	۰/۳۲۱	۱/۴۶۶	۰/۶۲۲	۱	۰/۲۴۳	۰/۷۷۵	۰/۳۸۲	دارد	دارد	آپرتوں	
-	-	-	-	۰	-	-	۰ ^b	دارد	دارد		

*The reference category: 24hr after peripheral intravenous catheter (PIV) insertion

χ^۲: Chi-Square test

df: degree of freedom

p: p value

اندام دارای کاتتر و کاهش سرعت جریان محلول برای اطمینان از فلیت کفايت کرده و لازم است هرچه سریع تر کاتتر مربوطه خارج شود. همچنین شناخت عوامل مستعد کننده فلیت و پیشگیری از آن برای افزایش کیفیت مراقبت و ارائه مراقبت ایمن ضروری است (۶، ۱۴، ۲۰). در این مطالعه آزمون کای اسکوئر رابطه معناداری بین سن و بروز فلیت نشان نداد؛ اما بر اساس نتایج آزمون رگرسیون لجستیک چندگانه، در گروه‌های مختلف سنی احتمال بروز فلیت ۴۸ ساعت و ۷۲ ساعت بعد از تعییه کاتتر به طور معناداری بیشتر از ۲۴ ساعت بعد است که این احتمال در نوزادان قوی‌تر بوده است. شاید بتوان نتایج مطالعه را هم راستا با برخی مطالعات دانست که سن کمتر را از عوامل کمک کننده در بروز علائم فلیت می‌دانند (۲، ۲۰). مطالعات گذشته بیشترین میزان عارضه فلیت را در کودکان زیر ۳ سال به خصوص شیرخواران زیر یکسال بیان کرده اند (۲). از آنجا که عواقب بروز فلیت در این شیرخواران خطرناک‌تر است؛ بنابراین حساسیت بیشتر پرستاران را نیز می‌طلبند. یافته دیگر این مطالعه افزایش معنادار احتمال بروز فلیت در جنس مذکور، ۷۲ ساعت بعد از تعییه کاتتر بوده است؛ اما از آنجاکه نتایج مطالعات پیشین در این رابطه ضد و نقیض

بحث

در ایران، میانگین ساعت ماندگاری کاتترورید محیطی حدود ۴۳ تا ۴۵ ساعت برآورد شده (۱، ۱۲) و شواهدی مبنی بر ماندگاری کاتتر بعد از ۷۲ یا ۹۶ ساعت یافت نشد. مطالعات مختلف نشان داده‌اند که هرچه از زمان تعییه کاتتر بگذرد، احتمال بروز فلیت بیشتر می‌شود (۱۷). در مطالعه حاضر بیشترین میزان بروز فلیت با ۴۴٪ مربوط به ۷۲ ساعت بعد از تعییه کاتتر بوده است. در نوامبر ۱۹۹۶، مرکز کنترل بیماری‌ها، زمان ماندگاری کاتترهای وریدی محیطی در بزرگسالان را ۷۲-۹۶ ساعت اعلام کرد؛ اما اکنون این روتین تغییر کرده و تا زمانی که کاتتر قابل استفاده داشته باشد، تعویض نمی‌شود (۱۸، ۱۹). در کودکان نیز تا زمان عدم بروز عارضه، نیازی به تعویض کاتتر نیست و می‌توان تا ۱۴۴ ساعت از کاتتر استفاده کرد؛ اما کنترل مکرر کاتتر امری ضروری است؛ زیرا عدم تشخیص زودهنگام فلیت می‌تواند عواقب غیرقابل جبرانی همچون ترومبوفیلیت، قطع اندام و آمبولی ریه را در پی داشته باشد. مسئولیت مدیریت کاتتر بر عهده پرستاران است. پرستاران باید هوشیار باشند که تنها وجود یک علامت از قبیل درد، حساسیت، گرمی، تورم، قرمزی، طنابی شدن مسیر ورید، سرد بودن انتهای

مطالعه Urbanetto و همکارانش همخوانی دارد (۲۳). احتمالاً عدم ثابت کردن مناسب کاتر و یا طول ورید استفاده شده دلیل این نتیجه است؛ اما آنچه حائز اهمیت است، ارجحیت استفاده از اندام فوقانی نسبت به اندام تحتانی در تعییه کاتر وریدی در کودکان است.

زمانی که ارتباط بین بروز فلیت با شماره کاتر بررسی شد، ارتباط معناداری به دست آمد؛ به طوری که بروز فلیت در کاترهای ۲۴ (زرد رنگ) نسبت به کاترهای ۲۲ (آبی رنگ) کمتر بود. همچنین احتمال بروز فلیت ۴۸ ساعت بعد از تعییه کاتر در کاتر زرد به طور معنادار کمتر گزارش شد که مشابه با برخی مطالعات پیشین است (۲۴). البته برخی مطالعات یافته متفاوتی را گزارش کرده‌اند (۲۰، ۲۱). هرچند در رابطه با تأثیر شماره کاتر بر فلیت اختلاف نظر وجود دارد؛ اما بر اساس قانون پوآزی (Poiseuille's Law)، نسبت بالاتر کاتر/ورید و درنتیجه ایجاد گرفتگی در جریان عروق، عاملی به نفع ایجاد فلیت است (۲۴)؛ به طوریکه هرچه سن کمتر و عروق بیمار باریک‌تر باشند؛ جهت برقراری جریان بهتر خون و پیشگیری از آسیب، لازم است از کاترهای باریک‌تر استفاده شود. البته انتخاب کاتر مناسب علاوه بر سن بیمار و قطر رگ انتخاب شده، به هدف دارودرمانی نیز بستگی دارد (۲۵).

رعایت نکات آسپتیک هنگام تعییه کاتر وریدی برای کاهش خطر عفونت و فلیت لازم است (۱۱)؛ اما هنوز در مورد محلول ضد عفونی کننده مؤثر اختلاف نظر وجود دارد. در این مطالعه برای آماده‌سازی پوست قبل از تعییه کاتر، ۶۶٪ از کلرهگزیدین، ۲۵٪ از الکل و ۲۷٪ از بتادین استفاده شده است. کلاهدوزی‌پور و همکاران، تفاوت معناداری را بین محلول کلرهگزیدین و الکل در پیشگیری از فلیت گزارش کردند (۸)؛ اما در مطالعه حاضر، رابطه معناداری بین نوع محلول ضد عفونی کننده و بروز فلیت یافت نشد که با برخی مطالعات پیشین همخوانی دارد (۱۰، ۱۸، ۲۶).

با این اساس نمی‌توان جنسیت را عامل افزایشی برای بروز فلیت دانست.

بر اساس نتایج مطالعه حاضر، ارتباط معناداری بین وجود کم‌آبی در کودک و بروز فلیت یافت نشد. اگرچه تجربیات پژوهشگران نشان داده بود که کودکان مبتلا به کم‌آبی، عارضه فلیت را سریع‌تر نشان می‌دهند. علاوه بر این، مروری بر متون نیز تأکید می‌کند که کم‌آبی اختلال شایعی در کودکان است که منجر به کاهش حجم مایع داخل عروقی شده و عامل مستعد کننده بروز فلیت به حساب می‌آید (۶، ۲۱)؛ بنابراین به نظر می‌رسد انجام مطالعات بیشتر در این زمینه و با حجم نمونه بالاتر ضروری باشد.

به منظور پیشگیری از تحرک، التهاب، فلیت و خروج کاتر، پرستاران باید وریدی را برای تعییه کاتر انتخاب کنند تا علاوه بر اندازه و طول مناسب؛ در دسترس بوده و قابلیت ثابت کردن صحیح را دارا باشد و در عین حال برای کودک کمترین محدودیت را ایجاد کند (۲۲). اندام فوقانی به خصوص پشت دست و ساعد، برای تعییه کاتر ورید محیطی ارجحیت دارد (۲۳). طبق مطالعات گذشته، مناسب‌ترین محل برای تعییه کاتر در نوزادان، پشت دست به خصوص ورید سفالیک است که میزان فلیت در آن به صورت معناداری کمتر از ناحیه ساعد بوده است و در کودکان بزرگتر به دلیل تحرک بیشتر، استفاده از وریدهای ساعد پیشنهاد شده است. البته به دلیل بالا بودن معنادار بروز فلیت در وریدهای ناحیه گودی آرنج و ایجاد محدودیت حرکتی برای کودک، استفاده از این ناحیه برای تعییه کاتر توصیه نمی‌شود (۶). در کودکان کمتر از یک سال که هنوز به سن تکاملی جهت راه رفتمن نرسیده‌اند، رگ‌گیری از اندام تحتانی نیز مرسوم است. در مطالعه حاضر ۶۹٪ رگ‌گیری‌ها در اندام تحتانی بوده که شاید بتوان دلیل آن را با سن نمونه‌ها در ارتباط دانست. همچنین طبق نتایج آزمون رگرسیون، احتمال بروز فلیت ۷۲ ساعت بعد از تعییه کاتر در اندام فوقانی به طور معناداری کمتر بوده است که با

قرارگیری کاتتر در محل دارای فلکسیون، از آتل استفاده شود (۲۸). نکته مهم در استفاده از آتل، رعایت پوزیشن مناسب عضو و جلوگیری از بیحرکتی طولانی مدت اندام است (۱). بر این اساس پیشنهاد می‌شود استفاده از آتل تنها به مواردی که به دلیل محل ورید و یا عدم همکاری کودک ضروری است، محدود شود (۲۲).

بر اساس مطالعات پیشین میزان فلیبت در انفوزیون داروها، ۲ برابر مابع درمانی است (۲۰، ۲). در حال حاضر ونکومایسین به طور گسترده، جهت درمان عفونت‌های استافیلوکوکی و به میزان mg/kg/dose ۱۰-۱۵ هر ۶ ساعت در کودکان تجویز می‌شود (۲۹). طبق استانداردها، تزریق دارو یا محلول‌هایی با PH کمتر از ۵ یا بیشتر از ۹ باید از طریق کاتتر ورید مرکزی انجام شود؛ همچنین استانداردهای تزریقات داخل وریدی پرستاری توصیه می‌کند برای تزریق ونکومایسین با غلظت بیشتر از ۵mg/ml نیز از کاتتر ورید مرکزی استفاده شود (۳۰)؛ در حال حاضر به صورت روتین، ونکومایسین با $\text{PH}=3/9$ در یک دوره ۳-۵ روزه از طریق کاتتر ورید محیطی انفوزیون می‌شود (۳۱) که دقت و حساسیت پرستار را می‌طلبد. در مطالعه حاضر در ۱۷٪ حفاظت پرستار را می‌طلبید. در مطالعه حاضر در ۵۵٪ موارد، غلظت نهایی ونکومایسین بیشتر از ۵ mg/ml بوده که از طریق کاتتر ورید محیطی تزریق شده است. همچنین مدت زمان انفوزیون ونکومایسین در ۶۶٪ کمتر از ۳۰ دقیقه و در ۳۳٪ موارد، ۳۰-۶۰ دقیقه بوده است؛ که در ۴۸٪ آن‌ها، شستشوی کاتتر با نرم‌السالین، قبل و بعد از انفوزیون ونکومایسین نیز انجام شده است. مدل رگرسیون لجستیک افزایش معنادار بروز فلیبت در عدم شستشوی کاتتر و انفوزیون ونکومایسین در غلظت بیشتر از ۵mg/ml نشان داد؛ اما رابطه‌ای بین بروز فلیبت با مدت زمان انفوزیون ونکومایسین یافت نشد. مطالعات نشان داده‌اند تزریق متناسب ونکومایسین با غلظت ۵mg/ml در مدت زمان بیش از یک ساعت می‌تواند بروز فلیبت را تا ۱۸٪ کاهش دهد (۳۰)؛ اما بر اساس تجربه، طولانی شدن زمان انفوزیون

باکتریایی در نتیجه مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها و تغییر فلور طبیعی پوست و محیط بیمارستان در ارتباط داشت. هرچند اینمنی کلرهگزیدین در شیرخواران کمتر از ۲ ماه مورد بحث است؛ اما بر اساس دستورالعمل‌های تعیه کاتتر وریدی، جهت آماده‌سازی پوست بهتر است از کلرهگزیدین با غلظت بیشتر از ۵٪ استفاده شود و در صورت عدم موجودیت می‌توان یدفور و یا الکل ۷۰٪ را جایگزین نمود (۲۲). همچنین تأثیر مثبت استعمال خارجی نیتروگلیسیرین، کلوبتاژول، روغن کنجد و هواجویه در مسیر ورید، در جهت کاهش بروز فلیبت گزارش شده است (۷، ۱۱، ۱۳، ۱۴).

پانسمان محل کاتتر نقش مهمی در پیشگیری از عفونت کاتتر دارد (۱۷)؛ اما هنوز تأثیر نوع پانسمان بر پیشگیری از فلیبت مورد بحث است و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها شواهدی مبنی بر حمایت از تأثیر مثبت نوع پانسمان در پیشگیری از فلیبت ارائه نداده است (۲۵). طبق دستورالعمل‌ها برای پوشاندن محل کاتترهای وریدی می‌توان از گاز استریل یا پانسمان استریل شفاف نیمه نفوذپذیر استفاده کرد (۱۸). در این مطالعه رابطه معناداری بین نوع پانسمان کاتتر و بروز فلیبت یافت نشد. عموماً معیار اصلی انتخاب نوع پانسمان محل کاتتر، هزینه آن است (۲۰) و به دلیل گران بودن پانسمان شفاف، جایگزین کردن سایر پانسمان‌های کاتتر وریدی با پانسمان شفاف در اولویت نیست؛ پس آنچه اهمیت دارد رعایت نکات آسپتیک حین رگ‌گیری و ثابت کردن مناسب کاتتر است؛ زیرا یکی از علل احتمالی بروز فلیبت عدم ثابت کردن صحیح کاتتر است (۲۲). هرچند در مطالعات پیشین عدم تأثیر مثبت استفاده از آتل در کاهش فلیبت گزارش شده (۲۷، ۱)؛ اما هم‌اکنون در بخش کودکان، استفاده از آتل مرسوم است. در مطالعه حاضر در ۹۳٪ از کودکان، از آتل استفاده شده؛ اما رابطه معناداری بین استفاده از آتل و بروز فلیبت یافت نشد. *Hugil* توسعه می‌کند تنها در نوزادان و یا زمان

نتیجه‌گیری

فلبیت شایع ترین عارضه قابل پیشگیری کاتتر ورید محیطی است که شیوع آن در کودکان ایرانی، با مقدار قابل قبول ذکر شده توسط انجمن پرستاری امریکا اختلاف قابل ملاحظه ای دارد؛ اما پرستاران می‌توانند با درنظرگرفتن نسبت کاتتر به رگ و انتخاب کاتتر مناسب به همراه شستشوی کاتتر با نرمال سالین، قبل و بعد از تزریق و نکومایسین این میزان را کاهش دهند. همچنین لازم است سرعت انفوژیون و نکومایسین از $5-10\text{ mg/min}$ تجاوز نکند. این موارد به خصوص زمانی که در کاردکس کودک به جز و نکومایسین، محلول‌های تغذیه وریدی و سفالوسپورین‌ها مشاهده می‌شود، اهمیت دوچندان می‌یابد. همچنین در زمان رگ‌گیری تاحدام‌کان استفاده از اندام فوقانی ارجحیت دارد. امید که رعایت این نکات و ارزیابی مکرر کاتتر به خصوص در کودکان زیر یک سال بتواند از بروز فلبیت و عوارض آن پیشگیری کند.

تشکر و قدردانی

این مطالعه با کد ۳۹۶۰۱۸ توسط کمیته اخلاق پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصویب شده است. بدین‌وسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مسئولین بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان و مادران و کودکانی که در اجرای پژوهش همکاری داشته‌اند، سپاسگزاری می‌نماییم.

متناوب در کودکان، به خصوص کودکان یکسال به بالا سبب کاهش همکاری کودک و افزایش احتمال جابجایی کاتتر می‌شود. طبق دستورالعمل‌ها، حداقل سرعت انفوژیون ایمن داروها $5-10\text{ mg/min}$ است (۳۲)؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود به منظور پیشگیری از فلبیت به جای حساس بودن بر روی مدت زمان انفوژیون، به سرعت انفوژیون و نکومایسین دقت شود و شستشوی کاتتر قبل و بعد از تزریق و نکومایسین فراموش نشود. طبق مطالعات پیشین، هیچ تأثیری بر افزایش ماندگاری کاتتر ندارد؛ اما سالین لاک می‌تواند تا ۱۰ برابر، بروز فلبیت را کاهش دهد (۳۳، ۱۵). یافته دیگر مطالعه، ارتباط معنادار بین بروز فلبیت با تزریق سفالوسپورین‌ها و تغذیه کامل وریدی (آمینواسید و ایترالیپید) از کاتتر مورد بررسی بود که تأثیر افزایشی این آنتی‌بیوتیک‌ها بر بروز فلبیت در مطالعات پیشین نیز ذکر شده است (۲۰، ۲۲)؛ بنابراین کودکانی که به جز و نکومایسین این دو دسته دارو را نیز دریافت می‌کنند، نیاز به کنترل بیشتری دارند.

مطالعه حاضر محدودیت‌هایی نیز داشت که شامل تعداد نمونه‌ها و عدم بررسی شدت فلبیت بود. همچنین به دلیل بررسی کاتتر و تکمیل پرسشنامه‌ها در نوبت صبح یا عصر، بسیاری از نمونه‌ها که در نوبت شب به هر دلیلی نیاز به تعویض کاتتر داشتند، از مطالعه خارج و با نمونه‌های دیگر جایگزین می‌شدند و بدین ترتیب مدت زمان نمونه‌گیری و جمع‌آوری داده‌ها طولانی شد.

References

- Kalantari N, Mojdeh S, Marofi M. Comparison of methods to support the survival of peripheral vein catheter in selected hospitals in Isfahan in 2017. MJMS. 2017; 60(2): 493-500. [Persian]
- Suliman M, Saleh W, Al-shiekh H, Taan W, AlBashtawy M. The incidence of peripheral intravenous catheter phlebitis and risk factors among pediatric patients. JPN. 2020; 50: 89-93.
- Bitencourt ES, Leal C, Boostel R, Mazza VA, Felix VC, Pedrolo E. Prevalence of phlebitis related to the use of peripheral intravenous devices in children. Cogitare Enferm. 2018; (23)1: e49361.

- 4.Kalani Z, Pourmovahed Z, Vaezi AA, Vaziri SF. Assessing the risk factors of phlebitis incidence related to peripheral catheter: Av Analytical Study. JHOSP. 2015; 14(3): 93-99. [Persian]
- 5.Ray-Barruel G, Grad Cert BA, Polit DF, Murfield JE, Rickard CM. Infusion phlebitis assessment measures: a systematic review. J Eval Clin Pract. 2014; 20:191-202.
- 6.Bolcato M, Russo M, Donadello D, Rodriguez D, Aprile A. Disabling outcomes after peripheral vascular catheter insertion in a newborn patient: A case of Medical Liability. Am J Case Rep. 2017; 18: 1126-1129.
- 7.VaraeiSh, GhafourzadehToomtari B, Kamalinejad M, Yekaninejad MS, Kazemi FS, Khadem E. Effect of Arnebia Euchroma poultice on the prevention pf peripheral intravenous catheter-related phlebitis: A randomized clinical trial. Hayat. 2018; 24(1): 59-70. [Persian]
- 8.Kolahdozipour J, Abdollahzadeh F, Zamanzadeh V, Vahedi A, Lotfi M, Heidarizadeh M. The comparison of the effect of chlorhexidine gluconate 2% and alcohol ethylic 70% in prevention of phlebitis. J Tabriz Univ Med Sci. 2008; 30(3): 55-60. [Persian]
- 9.Enes S, Opitz AR. Phlebitis associated with peripheral intravenous catheters in adults admitted to hospital in the Western Brazilian Amazon. Revista da Escola de Enfermagem da USP. 2016; 50(2): 263-271.
- 10.Poormohamadi M, Farsi Z, Rajai N. The effects of 2%chlorhexidine gluconate solution on prevention of phlebitis related to peripheral venous catheter in patients hospitalized in cardiac care units of a military hospital. Military Caring Sci. 2017; 4(1): 19-29. [Persian]
- 11.Bagheri-Nesami M, Khodadadian-Miri J, Yazdani-Cherati J, Tabiban S, Ala Sh. The comparison of 2%Nitroglycerin ointment and 2%Chlorhexidine solution effect in preventing catheter-related phlebitis. J Babol Univ Med Sci. 2014; 16(6):7-15. [Persian]
- 12.Amouei Foumani S, Paryad E, Ghanbari Khanghah A, Kazemnezhad Leili E. Complications of peripheral intravenous catheters during 72 hours after Insertion. J Holist Nurs Midwifery. 2019; 29(3): 137-144.
- 13.Mohseni M, Akbari H, Hekmat po. D, Anbari KH. Comparison of the effect of Clobetasol ointment and sterile gauze dressing on prevention of phlebitis caused by peripheral venous catheter in patients admitted to a surgery ward. MCS. 2018; 5(1): 72-79. [Persian]
- 14.Mosayebi N, Sharifpour SZ, Asgari F, Atrkarroushan Z, Pasdaran A. The efficacy and safety of Sesame oil in prevention of chemotherapy-induced phlebitis in children with acute lymphoblastic leukemia. Iran J Ped Hematol Oncol. 2017; 7(4): 198-206.
- 15.Eghbali-Babadi M, Ghadirayan R, Hosseini SM. The effect of saline lock on phlebitis rates of patients in cardiac care units. Iran J Nurs Midwifery Res. 2015; 20(4): 496-501.
- 16.Kliegman RM, Stanton BF, St Geme JW, Schor NF, Behrman RE. Nelson Text book of pediatrics. 20th ed. New York: Elsevier, 2016: 617, 1023.
- 17.Ben Abdelaziz R, Hafsi H, Hajji H, Boudabous H, Ben Chehida A, Marbet A, et al. Peripheral venous catheter complications in children: predisposing factors in a multicenter prospective cohort study. BMC Pediatrics. 2017; 17: 208.
- 18.O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, Dellinger EP, Garland J, Heard SO, et al. Summary of recommendations: guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. Clin Infect Dis. 2011; 52: 1087e1099.
- 19.Xu L, Hu Y, Huang X, Fu J, Zhang J. Clinically indicated replacement versus routine replacement of peripheral venous catheters in adults: A nonblinded, cluster-randomized trial in China. Int J Nurs Pract. 2017; 23(6): e12595.
- 20.Abusafia BMR, Boztepe H. Evaluation of peripheral intravenous catheter-induced local complication in pediatrics. J Clin Nurs. 2017; doi: 10.1111/jocn. 13730.

- 21.Awasthi Sh. Improving management of dehydration in children younger than 5 years in low-and-middle-income countries. Lancet Glob Health. 2016; 4(10): e674-e675.
- 22.Malyon L, Ullman AJ, Phillips N, Young J, Kleidon T, Murfield J, et al. Peripheral intravenous catheter duration and failure in paediatric acute care: A prospective cohort study. EMA. 2014; 26: 602-608.
- 23.Urbanetto JS, Peixoto CG, May TA. Incidence of phlebitis associated with the use of peripheral IV catheter and following catheter removal. RLAE. 2016; 24: e2746.
- 24.Menendez JJ, Verdu C, Calderon B, Gomez-Zamora A, Schuffelmann C, de la Cruz JJ, et al. Incidence and risk factors of superficial and deep vein thrombosis associated with peripherally inserted central catheters in children. J Thromb Haemost. 2016; 14: 2158-68.
- 25.Li XF, Liu W, Qin Y. Nurse's perception of risk factors for infusion phlebitis: A cross-sectional survey. Chin Nurs Res. 2016; 3: 37-40.
- 26.Goudet V, Timsit JF, Lucet JC, Lepape A, Balayn D, Seguin S, et al. Comparison of four skin preparation strategies to prevent catheter-related infection in intensive care unit (CLEAN trial): a study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2013; 14:114.
- 27.Marsh N, Webster J, Mihala G, Rickard CM. Devices and dressing to secure peripheral venous catheters to prevent complications. Cochrane Database Syst Rev. 2015; 12(6): CD011070. doi:10.1002/14651858.CD011070.pub2.
- 28.Hugil K. Is there an optimal way of securing peripheral IV catheters in children? BJN. 2016; 25(19): S20-1.
- 29.Hwang D, Chiu N-Ch, Chang L, Peng Ch-Ch, Huang DT-N, Huang F-Y, et al. Vancomycin dosing and target attainment in children. JMII. 2017; 50(4): 494-9.
- 30.Drouet M, Chai F, Barthelemy Ch, Lebuffe G, Debaene B, Decaudin B, et al. Endothelial cell toxicity of vancomycin infusion combined with other antibiotics. AAC. 2015; 59(8): 4901-6.
- 31.Caparas JV, Hu JP. Safe administration of vancomycin through a novel midline catheter: a randomized, prospective clinical trial. J Vasc Access. 2014; 15(4): 251-6.
- 32.Bruniera FR, Ferreira FM, Saviolli LR, Bacci MR, Feder D, da Luz Goncalves Pedreira M, et al. The use of vancomycin with its therapeutic and adverse effects: a review. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015; 19(4):694-700.
- 33.Kumar M, Vandermeer B, Bassler D, Mansoor N. Low-dose heparin for prolonging the patency of peripheral intravenous catheters in adults- a systematic review and meta-analysis. Int J Med. 2014; 2(1): 13-21.