

Antibacterial effects of essential oil of Bene tree fruit on Clostridium perfringens in laboratory environment and on meat product

Soltan Dallal MM., PhD¹, Faraji M., MSc², Mirahmadi F., MSc³

1. Professor, Food Microbiology Research Center/ Division of Microbiology, Department of Pathobiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran,. Tel: 021- 88992971,Email: msoltandallal@gmail.com

2. Student in Food Microbiology,Division of Food Microbiology, Department of Pathobiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

3. instructor the department of Food industrial, Azad University, Branch of Sanandaj, Sanandaj,Iran.

ABSTRACT

Background and Aim: essential oil of P.*atlantica*Subsp. *Kurdica* fruit or wild pistachios have been recognized as an anti- microbial compound against most of microorganisms. The purpose of this study was to determine the anti-microbial activity of the essential oil of P.*atlantica*Subsp. *Kurdica* fruit on Clostridium perfringens in laboratory environment and meat products.

Material and Method: The anti-microbial effects of the essential oil of P.*atlantica*Subsp. *Kurdica* fruit on Clostridium perfringens was evaluated by determination of minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC).Then MBC of the essential oil was added to the processed foods (hot dog and kielbasa) in order to reduce anaerobic microbes especially Clostridium. Using SAS software, data were analyzed by chi-square test. $p<0/05$ was considered significant.

Results: The results showed that MIC for Clostridium bacteria was 250 milligrams per liter. MBC of P.*atlantica*Subsp. *Kurdica* essential oil for Clostridium bacteria was 500 milligrams per liter. Use of 500 milligrams per liter of P.*atlantica*Subsp. *Kurdica* essential oil in the food products such as hot dogs had bactericidal effect on Clostridium bacteria.

Conclusions: The essential oil of P.*atlantica*Subsp. *Kurdica* in the food product such as hot dogs had inhibitory and anti-bacterial effects on Clostridium. This essential oil had no positive effect on the taste of food product. This problem can be solved by purification and decolorization. It can be used as a drug or remedy for the treatment of Clostridium infection or poisoning.

Keywords: P.*atlantica*Subsp. *Kurdica* fruit essential oil , Clostridium perfringens, Minimum inhibitory concentration (MIC), Hot dogs and sausages, Organoleptic properties

Received: Sep 17, 2018

Accepted: Feb 20, 2019

بررسی اثرات ضدبacterیایی اسانس میوه درخت بنه بر روی باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس در محیط آزمایشگاهی و سوسيس

محمد مهدی سلطان دلال^۱، محمد فرجی^۲، فردین میر احمدی^۳

۱. استاد مرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی / بخش میکروب شناسی غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران، تلفن ثابت: ۰۲۱-۸۸۹۹۲۹۷۱

Email: msoltandalla@gmail.com

۲. دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران

۳. مری گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنتندج، سنتندج، ایران

چکیده

زمینه و هدف: اسانس میوه درخت بنه یا پسته وحشی به عنوان ترکیب ضد میکروبی در مقابل اکثر میکرووارگانیسم ها شناخته شده است. هدف از این تحقیق تعیین فعالیت ضد میکروبی اسانس میوه درخت بنه بر روی باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس در محیط آزمایشگاهی و فراورده های گوشتی میباشد.

روش بررسی: در این تحقیق اثرات ضد میکروبی اسانس میوه درخت بنه بر روی کلستریدیوم پرفرنجنس، به روش تعیین غلظت ممانعت کشندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) مورد ارزیابی قرار گرفت. در مرحله بعد بررسی استفاده از حداقل غلظت کشندگی از اسانس به عنوان ترکیب ضد باکتری به فرآورده غذایی (سوسيس) برای کاهش میکروب های بی هوایی به خصوص کلستریدیوم انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کای اسکوئر و نرم افزار SPSS استفاده شده و موارد p<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) برای باکتری کلستریدیوم برابر ۲۵۰ میلی گرم بر لیتر است. حداقل غلظت کشندگی (MBC) در اسانس بنه برای باکتری کلستریدیوم برابر ۵۰۰ میلی گرم در لیتر بود. در غلظت ۵۰۰ میلی گرم بر لیتر اسانس میوه بنه بر روی باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس در نمونه های سوسيس تولیدی اثر کشندگی داشت.

نتیجه گیری: اسانس میوه درخت بنه بر روی باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس دارای خاصیت باز دارندگی در محیط آزمایشگاهی و در سوسيس های تولیدی داشته، ولی بر روی طعم آن اثر مشتبی نداشته که این مسئله را می توان با خالص سازی و رنگ بری حل کرد، و یا از آن می توان به عنوان دارو و درمان عفونت یا مسمومیت ناشی از این باکتری استفاده کرد.

واژگان کلیدی: اسانس میوه درخت بنه، کلستریدیوم پرفرنجنس، حداقل غلظت بازدارندگی (MIC)، سوسيس، خصوصیات ارگانولپتیک

وصول مقاله: ۹۷/۶/۲۶: اصلاحیه نهایی: ۹۷/۹/۲۶: پذیرش: ۹۷/۱۲/۱

مقدمه

کردستان مطرح می باشد^(۴). نتایج بررسی ها نشان می دهد که رزین گونه های پیستاسیا^۱ بر روی باکتری های مختلفی از گرم مثبت و منفی حتی کپک و مخمر اثر کشنده‌گی دارد^(۵).

اگرچه داروهای شیمیایی به طور سریع اثر بخشند، ولی اکثر آنها عوارض جانبی نامطلوبی بر بدن انسان بر جای می گذارند. در حالی که مواد دارویی حاصل از گیاهان با آن که به تدریج تأثیرگذار می باشند، دارای اثرات مفیدی بوده و چندان اثرات جانبی ندارد. مواد مؤثره گیاهان، به خصوص عطریات و اسانس‌ها، موارد استفاده متعدد و متفاوتی در صنایع لوازم آرایش، صنایع مواد شیمیایی خانگی دارند، به طوری که بدون حضور مواد مؤثره مذکور، ساخت و تهیه بسیاری از محصولات امکان‌پذیر نخواهد بود^(۶).

در حال حاضر در ایران بیش از پنج هزار واحد عطاری فعالیت دارند و حدود صد تا دویست گونه گیاهی موجود در ایران نیز به عنوان داروی گیاهی برجسته شناخته شده و توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تهیه و تولید گیاهان دارویی معرفی شده است^(۷).

مدل های مختلفی در مطالعات گوناگون به منظور بررسی اثرات ضد باکتریایی و نگهدارندگی اسانس های گیاهی استفاده شده است. در برخی از این روش ها از مدل های آزمایشگاهی مثل محیط کشت و در برخی دیگر از مدل های غذایی برای بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس ها استفاده شده است^(۸-۱۱).

در واقع قرن ها است که مواد مؤثره استخراج شده از گیاهان و ادویه ها توسط مصریان باستان و کشورهای آسیایی مانند چین و هند استفاده می شوند، اما در طول سال های اخیر کاربردهای دارویی این ترکیبات نسبت به ایجاد طعم و بو

گیاهان دارویی^۱ به گیاهانی گفته می شود که دارای مواد مؤثره^۲ مشخصی باشند و در درمان بیماری یا پیشگیری از بروز آن در انسان یا دام مورد استفاده قرار گیرند و هم چنین نام آنها در یکی از فارماکوپههای^۳ معتبر بین المللی ذکر شده باشند^(۱).

از زمانهای قدیم تاکنون گیاهان دارویی به دلیل داشتن انسس، نقش مهمی در سلامتی انسان داشته اند. گیاهان دارویی از منابع مهمی هستند که از گذشته های دور مورد توجه انسان بوده اند و با افزایش آگاهی ها و پیشرفت علوم، اطلاعات پیرامون گیاهان دارویی افزایش یافته است. تحقیقات امروزی نشان داده است که ترکیبات مختلف با اثرات متفاوتی در گیاهان وجود دارد و در اکثر موارد اثرات درمانی گیاه مربوط به این ترکیبات می باشد^(۲). تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که مواد صناعی با تمام کارایی-های مورد توجه، اثرات نامطلوب و ناخواسته بسیاری به همراه دارند و به همین دلیل توجه محققان به تحقیقات و آزمایشات بر روی گیاهان برای جایگزین کردن آنها معطوف گشته است. گیاهان دارویی به علت وجود مواد مؤثره طبیعی و همراه بودن این مواد مؤثره با مواد دیگر تعادل بیولوژیک ایجاد کرده و از انشائش شدن مواد دارویی در بدن جلوگیری می کنند. عوارض جانبی کم و یا فقدان عوارض جانبی داروهای با منشاء گیاهی در دهه های اخیر، توجه جهانیان و محققان به این داروها را به خود جلب کرده است^(۳).

درخت بنه به عنوان منع تولید رزین (صمغ) یکی از گونه های رستنی در سلسله جبال زاگرس و بویزه استان

¹ Medicinal plants

² Active substances

³ Pharmacopoeia

محیط کشت رین فورست کلستریدیوم براث^۷ (RCB) ۳۸ گرم از پودر این محیط کشت را در ۱۰۰ میلی لیتر آب مقطر حل گردید و سپس ظرف به خوبی تکان داده شد تا زمانی که پودر به طور کامل حل گردید. سپس سر ارلن را با پنبه و فویل الومینیومی پوشانده و روی حرارت گذارده تا بجوشد و کاملاً یک نواخت شود. سپس محلول اتوکلاو شد.

فعال سازی سوش باکتری:

سوش باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس با کد PTCC ۱۷۶۵ و ۱۳۱۲۴ ATCC و با تاریخ تولید ۹۴/۸/۲۵ از مرکز منطقه ای کلکسیون قارچ ها و باکتری های صنعتی ایران خریداری شد و با توجه به دستورالعمل ارسالی توسط خود سازمان تامین کننده سوش باکتری در محیط کشت تعیین شده توسط سازمان (RCB) ۵۷ فعال و کشت داده شد. بدین صورت که ابتدا آمپول حاوی میکرووارگانیسم مورد نظر با احتیاط کامل در شرایط استریل و در زیر هود لامینار فلو شکسته شد. سپس با استفاده از سمپلر حدود نیم میلی لیتر از محیط کشت مایع استریل مناسب (رین فورست کلستریدیوم براث) به آن اضافه شد تا سوسپانسیون باکتری حاصل شود. سپس بخش اعظم سوسپانسیون حاصل شده از باکتری، به محیط کشت رین فورست کلستریدیوم براث منتقل گردید و مقدار کمی از سوسپانسیون نیز به محیط رین فورست کلستریدیوم آگار که توسط سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران در مورد این سویه پیشنهاد شده بود، منتقل شد. سپس به جاربی هوایی همراه با گازپک مربوط در دمای ۳۷ درجه سیلیسیوس به مدت ۴۸ ساعت گرم خانه گذاری شد.

از کلنجی های تشکیل شده با روش های کشت خطی و با بکار گیری محیط کشت اختصاصی کشت تهیه گردید و سپس جهت اطمینان بیشتر از باکتری رنگ آمیزی گرم

توسط آنها در درجه دوم اهمیت قرار گرفته است، با این وجود در حال حاضر همچنان در هند برخی از ادویه ها مانند میخک، دارچین، خردل، سیر، زنجیل و نعنای عناوی نسخه های سلامتی استفاده می شوند (۱۲). با توجه به عدم مطالعه انسان شیره به بر روی کلستریدیوم پرفرنجنس در محصولات گوشتی، این مطالعه با هدف بررسی اثرات ضدباکتریایی انسان میوه درخت به بر روی باکتری کلستریدیوم پرفرنجنس^۵ در محیط آزمایشگاهی و سوسپس انجام شده است.

روش بررسی

این مطالعه از نوع تجربی و آزمایشگاهی و برای تعیین خاصیت ضد باکتریایی انسان میوه درخت به از روش filter paper disc diffusion Method قطر هاله رشد و برای تعیین فاکتور MIC و MBC از روش Liquid broth culture استفاده گردید.

جمع آوری و خشک کردن گیاه:

ابتدا میوه درخت از ارتفاعات کردستان درماه اردیبهشت جمع آوری و به هر باریوم مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان انتقال داده شدند، تا از نظر گیاه شناسی تایید شوند. سپس نمونه های به روش خشک کردن طبیعی به مدت ۲ - ۳ هفته در سایه و هوای آزاد خشک شدند.

انسانس گیری:

انسانس گیری با استفاده از روش تقطیر با آب^۶ با استفاده از دستگاه کلونجر (British Pharmacopea) انجام شد.

محیط های کشت

آماده سازی محیط کشت بر طبق دستورالعمل تجاری نوشته شده بر روی بسته صورت گرفت. به عنوان مثال جهت تهیه

⁵ Clostridium perfringens

⁶ Hydrodistillation

کیلوگرم ادویه و مقداری یخ نیز به گوشت اضافه کرده و پس از مخلوط شدن در کاتر، ۱۵ کیلوگرم آرد و ۴ کیلوگرم گلوتون همراه مقدار دیگری یخ به مخلوط درون کاتر اضافه شد. پس از اینکه خمیر درون کاتر به خوبی مخلوط و یکدست شد، ۲۰ گرم پودر اسید آسکوربیک را در مقداری کمی آب حل کرده و به امولسیون تشکیل شده در کاتر اضافه شد. امولسیون حاصل خمیری یک دست و روان بوده و دمای آن در پایان کار حداقل ۱۲ درجه سیلیسیوس بود. مخلوط فارش سوسیس در کارخانه بیستون کرمانشاه تهیه و به آزمایشگاه انتقال یافت. از فارش سوسیس بدون نیترات مقدار ۳۰۰ گرم با ۳۰ میلی لیتر سوپانسیون حاوی کلستریدیوم پرفرنجنس باکتری مخلوط و بر روی محیط پلیت کانت آگار کشت داده شد. از مخلوط آلوده فوق نیز به منظور کنترل غلظت کلستریدیوم پرفرنجنس در محیط کشت سولفیت پلی میکسین سولفادیازین آگار^{۱۰} کشت به عمل آمد. در مرحله بعد تحت شرایط استریل، ۹۰ گرم از مخلوط فارش آلوده، تزریق و به آن ۸۰PPM نیترات سدیم به عنوان شاهد اضافه و به طور کامل مخلوط شد. سپس ۹۰ گرم از مخلوط فارش آلوده توزین و به آن ۹ گرم پودر اسانس بنه اضافه و به طور کامل مخلوط شد. تمامی نمونه ها در اندازه های ۱۰ گرمی در ظروف مورد نظر پر و به یخچال ۶ درجه سیلیسیوس انتقال داده شدند. در در دوره های زمانی صفر (روز اول انجام کار و پس از تلفیق)، ۱۰، ۱۵، ۲۰ از هر تیمار ۳ نمونه گرفته شده و به منظور اندازگیری رشد کلستریدیوم پرفرنجنس و شمارش کلی، محیط کشت سولفیت پلی میکسین سولفادیازین آگار و محیط پلیت کانت آگار کشت مخلوط انجام شد، و سپس به مدت ۴۸ ساعت و ۷۲ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتی گراد و ۳۰ درجه سانتی گراد گرمخانه گذاری شدند. به منظور شمارش و شناسایی میکرووارگانیسم از کلنی کانتر مدل FunkeGerbe استفاده شد.

^{۱۰} Sulfite Polymyxin Sulfadiazine Agar (SPS agar)

صورت گرفت و در زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت محیط کشت های مادر و ذخیره به منظور استفاده های بعدی در یخچال نگهداری شدند. تعیین حداقل غلظت مهاری (MIC)^۸ و حداقل غلظت کشنیدگی (MBC)^۹

جهت انجام آزمایشات کمی برای تعیین MIC و MBC از انسانس ها رقت های مورد استفاده در روش ۱۳ لوله ای که دارای سه لوله کنترل و ۱۰ لوله رقت اسانس در محیط مولر هیتنون براث و یا محیط براث پیشنهادی توسط مرکز کلکسیون قارچ و باکتری که سوش خالص از آنها خریداری شده بود، تهیه گردید. سپس به هر کدام از رقتها به ازای هر میلی لیتر محیط مایع 1×10^9 CFU/ml باکتری فعال اضافه گردید. در کنار لوله ها از کنترل مثبت (محیط کشت حاوی باکتری بدون اسانس) و کنترل منفی (محیط کشت بدون باکتری) استفاده گردید. در نهایت لوله ها به مدت ۲۴ ساعت در ۳۷ درجه سانتیگراد انکوبه و سپس نتایج قرائت گردید. برای هر کدام از اسانس ها آخرین رقتی که در آن هیچگونه کدورتی مشاهده نگردید (نشان دهنده عدم رشد) به عنوان MIC در نظر گرفته شد و از تمام لوله های بدون کدورت بر روی محیط مولر- هیتنون آگار کشت داده شدند. پس از گذشت ۲۴ ساعت انکوباسیون در ۳۷ درجه سانتیگراد آخرین رقتی از اسانس ها که قادر به مرگ ۹۹٪ درصد از باکتریهای زنده اولیه بود به عنوان MBC در نظر گرفته شد (۹).

روش تهیه فارش سوسیس

برای تهیه یک فارش ۱۰۰ کیلو گرمی ۴۰ گیلو گرم گوشت قرمز چرخ کرده و ۱۰ گرم نیتریت سدیم که در مقدار کمی آب حل شده بود در کاتر مخلوط شد. پس از آن مقداری یخ پولکی به مخلوط درون کاتر اضافه و در مرحله بعد ۱ کیلو نمک طعام را با ۴۰ گرم پودر پری فسفات سدیم مخلوط کرده و به گوشت اضافه شد. سپس ۱

⁸ Minimal Inhibitory Concentration

⁹ Minimal Bactericidal Concentration

OD₆₀₀ قدرت کشندگی در شرایط فرآیند در طول دوران نگهداری مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت سوسيس های تولیدی در اختیار گروه پانيلیست برای بررسی خواص حسی قرارداده شد.

نتایج ارزیابی فعالیت ضد میکروبی اسانس بنه بر باکتری کلستریل یوم پرفرنجنس

حداقل غلظت مهارکننده رشد (MIC) وحداقل غلظت کشندگی (MBC)

نتایج بررسی حداقل غلظت بازدارنده اسانس بنه بر روی باکتری کلستریل یوم پرفرنجنس مورد مطالعه نشان داد که حداقل غلظت بازدارنده باکتری کلستریل یوم پرفرنجنس ۲۵۰ میلی گرم بر لیتر و حداقل غلظت کشندگی، ۵۰۰ میلی - گرم بر لیتر بود (جدول ۱). این نتایج نشان می دهد که اسانس استخراج شده از این گیاه دارای خاصیت ضد میکروبی روی باکتری نامبرده بوده و توانایی استفاده به صورت تجاری و دارویی را دارا می باشد

جدول ۱: تعیین میزان MIC و MBC باکتری کلستریل یوم پرفرنجنس در حضور اسانس گیاه بنه (نتایج برگرفته از سه تکرار می باشد)

Tube	میلی گرم بر لیتر	MIC	MBC
۱	2000	-	-
۲	1000	-	-
۳	۵۰۰	-	-
۴	۲۵۰	-	+
۵	۱۲۵	*+	+
۶	۶۲,۵	+	+
۷	۳۱,۲۵	+	+
۸	۱۵,۶۲۵	+	+
۹	۷,۸۱۲۵	+	+
۱۰	۳,۹۰۶۳	+	+
کنترل میکروب		+	+
کنترل محیط کشت		-	-
کنترل اسانس میکروبی		-	-

* نشان دهنده مشاهده ممانعت میکروبی در حد کمتر از ۵۰ درصد (یک تکرار از سه تکرار) می باشد ($P < 0.05$).

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

بر روی همه نمونه ها در چهار زمان نگهداری آزمون های میکروبی انجام شد (علاوه بر روز صفر)، ۱۵، ۱۰، ۵ و ۲۰ روز. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کای اسکوئر و نرم افزار SPSS استفاده شده و موارد $p < 0.05$ معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

این مطالعه در سه مرحله انجام گرفت در مرحله اول اسانس گیری از میوه گیاه بنه به منظور تعیین کارایی ضد میکروبی به خصوص ضد کلستریل یوم پرفرنجنس انجام گرفت. در مرحله دوم تعیین حداقل غلظت ممانعت کشندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) بود. در مرحله بعد افرودن اسانس ها در غلظت حداقل غلظت کشندگی به نمونه های سوسيس حاوی میکرووارگانیسم کلستریل یوم پرفرنجنس در غلظت نیم مک فارلن بدبست آمده با روش

اثر متقابل تیمارهای اصلی انواع نمونه و مدت زمان نگهداری از لحاظ ویژگی لگاریتم تعداد کلستریل یوم پرفرنجنس باقی مانده معنی دار نمی باشد و بین تیمار اصلی مدت زمان نگهداری از لحاظ ویژگی لگاریتم تعداد کلستریل یوم پرفرنجنس باقی مانده در سطح ۱ درصد ($P < 0.01$) اختلاف معنی دار وجود دارد.

برای تولید سوسیس ها به همه نمونه ها بر اساس ODS ۶۰۰ بدست آمده به میزان نیم مک فارلند به سوسیس ها میکرو ارگانیسم کلستریل یوم پرفرنجنس افزوده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهنده که مدل انتخابی و تیمار اصلی انواع نمونه برای تحلیل داده های بدست آمده از لحاظ ویژگی تعداد کلستریل یوم پرفرنجنس باقی مانده مورد بررسی در سطح ۵ درصد ($P < 0.05$) معنی دار می باشند و

جدول ۲: مقایسه میانگین تیمار مدت زمان نگهداری از لحاظ ویژگی های تحت بررسی در سوسیس های تولیدی

نوع تیمار سوسیس	میانگین ویژگی های تحت بررسی	تعداد کلستریل یوم پرفرنجنس باقی مانده
روز صفر	$543,333 \pm 248,407^C$	
روز پنجم	$606,667 \pm 89,766^{BC}$	
روز دهم	$693,333 \pm 60,711^{BC}$	
روز پانزدهم	$739,167 \pm 98,717^{AB}$	
روز بیستم	$860,833 \pm 119,067^A$	

آزمایشگاهی ۱۰ نفر پانلیست سوسیس های تولیدی به همراه نمونه شاهد مصرف نمودند. لازم به ذکر است که امتیازات طوری داده شد که مطلوبت ترین امتیاز ۵ در یک سیستم ۵ نقطه ای و بدترین امتیاز ۱ را اخذ کرد.

نتایج جدول ۲ نشان می دهد که بین روزهای مختلف نگهداری از لحاظ کلیه ویژگی های تحت بررسی اختلاف معنی دار در سطح ۵ درصد ($P < 0.05$) وجود دارد.

برای بررسی خواص حسی انواع سوسیس های فرموله شده باسانس میوه درخت بنه و انطباق این نتایج با نتایج

جدول ۳: مقایسه مجموع امتیازات داده شده خصوصیات حسی سوسیس های تحت تیمار

انواع سوسیس فرموله تولیدی	زنگ	بو	طعم	مجموع امتیازات داده شده	برش پذیری
شاهد(نمونه رایج)	۱۶.۵	۱۶.۵	۱۸.۵	۱۶	
حاوی اسانس بدون نیتریت	۱۳.۵	۱۳.۵	۱۱.۵	۱۴	

و نمونه سوسیس حاوی اسانس بدون نیتریت از نوع بدترین میباشد. پس این عدم مطلوبیت طعمی نسبت به نمونه رایج با توجه با خواص مطلوب ضد میکروبی باستی با خالص سازی و زنگ بری بر طرف گردد.

نتایج موجود در جدول ۳ نشان می دهد که بین نمونه های سوسیس تولیدی از لحاظ خواص حسی تحت بررسی زنگ و بو و برش پذیری دارای اختلاف معنی دار نمی باشد ولی از لحاظ طعم کاملاً تفاوت معنی دار وجود دارد ($P < 0.05$). نمونه سوسیس شاهد بهترین نمونه از لحاظ تمامی فاکتورها

فرجي و همكاران در تحقيقى نشان دادند که با افزایش مدت زمان نگهداری کشك ميزان pH کاهش قابل توجهی داشته است. همچنین جمعيت استافيلوكوكوس اورئوس در مقايسه با كلستيريد يوم بوتولينوم با سرعت بيشتری از بين ميرود، در پايان روز بيست و يكم نگهداري، جمعيت استافيلوكوكوس اورئوس به صفر رسيده است. در نتيجه عصاره حاوي يك درصد موسير هم به لحاظ کاهش رشد ميكروبی و هم به لحاظ خصوصيات حسى و رنگ به عنوان مناسبترین نمونه انتخاب شد(۱۴).

بر اساس نتایج حنفي و همكاران، فعالیت ضد ميكروبی، قطر هاله عدم رشد ميكرووار گانیزم های استافيلوكوكوس اورئوس ، اشریشیاکلی (در غلظت mg/ml ۵۰) و كلستيريد يوم اسپوروژنس در غلظت mg/ml ۱۲۰ ترتیب $۰/۳۲ \pm ۱۳/۴$ ، $۰/۴ \pm ۱۱/۶$ و $۰/۳ \pm ۸/۸$ تعیین شد، که استافيلوكوكوس اورئوس، بيشترین حساسیت و كلستيريد يوم اسپوروژنس بيشترین مقاومت را به اسانس شیره بنه نشان داد(۱۵).

همشه از گياهان و خواص درمانی آن ها برای در مان يماری ها و يا به نوعی غله بر ميكروب ها استفاده شده است. در تحقیقات متعددی که تو سط دانشمندان مختلف انجام شده است این امر با بکارگیری گياهان گوناگون برای نابودی ميكرووار گانیزم های مختلف به اثبات رسیده است. با توجه به تحقیقات انجام شده می توان از مواد ضد ميكروبی که در گياهان به خصوص در گياهان معطر وجود دارد بر عليه با كتری ها در مواد غذایی استفاده کرد. از آنجایی که گیاه بنه دارای قسمت های مختلفی مانند برگ ، ریشه، ساقه و میوه است تحقیقات جداگانه ای بر روی هر يك از اجزای و نیز خواص ضد ميكروبی هر يك از آنها انجام شده است. بر همین اساس در تحقیق پيش رو از اسانس میوه بنه برای اثر بر روی كلستيريد يوم پرفرنژنس استفاده شد که کل گیاه بنه مانند سایر قسمت های آن اثر ضد ميكروبی داشت و باعث کنترل رشد ميكروب مورد نظر و سایر ميكرووار گانیزم های باكتريایي شد.

بحث

نتایج بدست آمده نشان می دهد که حداقل غلظت بازدارندگی اسانس بنه بر باكتري کلسستيريد يوم پرفرنژنس مورد مطالعه برابر با ۲۵۰ ميلي گرم بر ليتر می باشد. جوان جبلی و همكاران (۱۳۹۳) در تحقیق خود به اين نتيجه رسیدند حداقل غلظت بازدارندگی برای باكتري های گرم مثبت کمتر از باكتري های گرم منفی است. به عبارت ديگر گرم مثبت ها نسبت به عمل آنتى باكتريال اسانس ها حساس - ترند. علت حساسیت کمتر گرم منفی ها احتمالا به علت وجود غشا خارجی در باكتري های گرم منفی است که سبب محدود شدن انتشار اجزا هیدروفوبیک اسانس به لایه ليپو پلی ساکاریدی می شود(۱۳).

در مطالعه ديگري والرو و همكارانش اثر ۱۱ اسانس گياهی را بر روی باكتري اسپوردار باسیلوس سرئوس در کاروت براث در دمای زير ۱۶ درجه سانتي گراد بررسی کرددند و در مورد اثرات دارچين بيان شده است که اضافه کردن ۵ ميكروليتر اسانس برای هر صد ملي ليتر کاروت براث در دمای کمتر از ۸ درجه سانتي گراد شرایطی را يجاد می کند که به مدت 60 روز باكتري قادر به رشد نمی باشد(۱۱).

بررسی اثر اسانس های گياهی این مواد بر روی پاتوژنهای مهم منتقله از راه مواد غذایي نظير سالمونلا انتریتیکيس ، اشریشیا کلی ، گونه های شیگلا ، باسیلوس سرئوس ، استافيلوكوكوس اورئوس و لیستریا مونو سیتوئنر نشان دهنده تلاش محققان برای جایگزین کردن نگهدارنده های طبیعی مشتق از منابع گياهی ، حیوانی و ميكروبی به جای نگهدارنده های شیمیایی می باشد (۱۱,۹,۵).

حداقل غلظت کشنده (MBC) در اسانس بنه برای باكتري کلسستيريد يوم برابر ۵۰۰ ميلي گرم در ليتر بود. اگرچه بروز فعالیت ضد ميكروبی بسيار روشن است، ولی مکانیسم عملاً به طور کامل در ک نشده است.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق انسس بنه به عنوان نگهدارنده طبیعی که دارای اثر بازدارندگی مناسبی بر روی باکتری کلستریدیوم پرفروجنس در شرایط آزمایشگاهی و فرآورده های گوشتی می باشدند، ولی بر روی طعم آن اثر مشتبی نداشته که این مسئله را می توان با خالص سازی ورنگ بری حل کرد. این نتایج نشان می دهد که انسس استخراج شده از این گیاه دارای خاصیت ضد میکروبی روی باکتری نامبرده بوده و توانایی استفاده به صورت تجاری و دارویی را دارا می باشد. با توجه به نتایج فوق می توان این انسس را به عنوان یک ترکیب طبیعی ضد میکروب در محصولات غذایی و دارویی استفاده نمود.

تشکر و قدردانی

این مقاله نتیجه بخشی از طرح تحقیقاتی مصوب مرکز تحقیقات میکروب شناسی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران به شماره قرارداد ۳۱۶۴۹ می باشد. بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران که حامی مالی این طرح تحقیقاتی می باشدند، کمال سپاسگزاری و تشکر را داریم.

References

1. Hammer KA, Carson CF, Riley TV. Antimicrobial activity of essential oils and other plant extracts. J Appl Microbiol 1999;86:985–990.
2. Gutierrez J, Barry-Ryan C, Bourke P. Antimicrobial activity of plant essential oils using food model media: Efficacy, synergistic potential and interactions with food components. Food Microbiol 2009;26:142–150.
3. Alvarez R, Encina A, Pérez Hidalgo N. PistaciaTerebinthus L. leaflets: an anatomical study. Plant Systematics and Evolution 2008; 272:107-118.
4. Del Campo J, Amiot MJ, Nguyen C. Antibacterial effect of rosemary extracts. J Food Prot 2000;63:1359-1368.
5. Ravanshad SH, Basiri E, Dastgheib B. Shirazi thyme essential oil concentration on antimicrobial activity of different bacteria, *Enterococcus faecalis*. Shiraz Univ Dent J 2007;8:28-36.
6. Amiri Aghdæi SF, Zareh Zardini H. Investigating the Factors Affecting the Improvement and Development of Medicinal Plants in Iran (Case Study: Esfahan City). J New Market Res.2012;1(12):195-214.
7. Chamber of Commerce: Status of medicinal plants in the pharmaceutical industry. A Chamber of Commerce: 1376, Issue 12, pp :32-31.

این تحقیقات نشان داد این انسس می تواند از رشد میکروارگانیزم های فوق ممانعت کنند. با توجه به تحقیق بالا بی اثر بودن عصاره ابی در این تحقیق تا حدودی قابل توجیه است که عصاره آبی قادر تر کیبات موثر ضد باکتری می باشد. در واقع از گیاه بنه و گیاهان مشابه می توان برای تهیه غذاهای ارگانیک سود برد و به این وسیله از مواد نگهدارنده شیمیایی و مواد آنتی باکتریال که اثر سو بر سلامت دارند کمتر استفاده کرد. سوسیس یکی از انواع غذاها فرآورده های گوشتی هست که اگر به جای نیتریت از عصاره گیاهان استفاده شود، می تواند به عنوان غذاهای ارگانیک به بازار عرضه شوند، و یا به عنوان یک نگهدارنده طبیعی در مواد غذایی و یا به عنوان یک ترکیب ضد میکروبی برای عفونت های ناشی از این باکتری استفاده شود.

در این تحقیق ماده غذایی سوسیس بوده که حاوی روغن و ادویه های مختلف بوده است و در واقع محیط مورد استفاده چرب بوده است، در نتیجه عصاره که ترکیب روغنی می باشد به راحتی در آن حل شده و در کل بسته بندی به طور یکنواخت پخش شده، همچنین سوسیس در درجه حرارت یخچال ۴ درجه سانتیگراد نگهداری شد.

8. Kout Soumanis K, Lambropoulon K, Nychas G JE. A predictive model for the nonthermal inactivation of *Salmonella enteritidis* in a food model system supplemented with a natural antimicrobial. Int J Food Microbiol 1999;49:63-74.
9. Soltan Dallal M M, Bayat M, Yazdi M H, Aghaamiri S, Ghorbanzadeh Meshkani M, Abedi Mohtasab T P et al . Antimicrobial effect of Zataria multiflora on antibiotic-resistant *Staphylococcus aureus* strains isolated from food. SJKU. 2012; 17 (2) :21-29.
10. Tassou C , Nychas G-JE. Antimicrobial activity of essential oil of mastic gum (Pistacia lentiscus var. Chia) on gram positive and gram negative bacteria in broth and in model food system. Int Biodet Biodeg 1995;36:411-420.
11. Valero M , Salmeron Mc. Antibacterial activity of 11 essential oils against *Bacillus cereus* in tyndallized carrot broth. Int J Food Microbiol 2003;85:73-81.
12. Serajoldini MF. Plant protection and medicine in ancient Iran. Medical History: 2010; 2 (2): 11 - 33.
13. Javan Jebelli A, M, Hamedani Ahmadi A, Bayan M, Keykhosravy K, Abdollahi Z, Kanani M. Antioxidant and antimicrobial effect of different mints ,the most widely used in Caspian sea areas, Iran. J Vet Res Lab.2014;6:93-102.
14. Farajii M , Roozbeh Nasiraei L , Farhoodi M. Antibacterial Effect of Ethanolic Extract Shallot (Allium Hirtifolium) on the *Clostridium botulinum* & *Staphylococcus aureus* and Organooleptic Propertise of Liquid Curd. Iranian J Nutri Sci Food Tech 2018; 82: 73-82.
15. Hanafi Q.M, Darvishi Sh, Dervishi N, Sayedin Ardebili S.M, Mirahamdi f. Antibacterial Properties of Embryonic Salt Essences on *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*. SJKU 2011;17: 1-11.