

## مقایسه اندازه سونوگرافیک طول مری شکمی در کودکان زیر 2 سال مبتلا به ریفلاکس

### گاستروازوفازیال با کودکان سالم

فرهاد نعلینی<sup>1</sup>، صغری پرمهر<sup>2</sup>، جمال حسینی<sup>3</sup>

1. استادیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
2. دستیار رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. (مولف مسوول) تلفن ثابت: 0831-4265139. drsoghrapormehr@gmail.com
3. کارشناسی ارشد آمارزیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

#### چکیده

**هدف:** ریفلاکس گاستروازوفازیال (GER)<sup>1</sup> عبارت است از برگشت بدون کوشش محتویات معده به داخل مری یا اروفاژنکس که از مسائل شایع در شیرخواران می باشد. سونوگرافی به عنوان یک روش حساس و دقیق برای بررسی ریفلاکس معرفی شده است. هدف از این مطالعه مقایسه طول مری شکمی در کودکان زیر 2 سال مبتلا به ریفلاکس گاستروازوفازیال با کودکان فاقد ریفلاکس گاستروازوفازیال است.

**روش کار:** این مطالعه از نوع مورد-شاهدی است و در کودکان زیر 2 سال انجام گرفت. تعداد 50 کودک به عنوان گروه شاهد، فاقد علائم بالینی و سونوگرافیک GER بودند و تعداد 50 کودک به عنوان گروه مورد، واجد GER اثبات شده، با سونوگرافی و یا آزمون بلع باریم تحت فلوروسکوپی بودند. در این دو گروه طول مری شکمی طبق پروتوکل اندازه گیری شد و داده ها با استفاده از آزمون های آماری t تست و من و تینی U و نرم افزار SPSS ویرایش 21 تجزیه و تحلیل گردید.

**نتایج:** میانگین طول مری شکمی در گروه مبتلا به GER،  $19/46 \pm 4/54$  میلی متر و در گروه غیر مبتلا به GER،  $26/23 \pm 5/01$  میلی متر بود و تفاوت معناداری بین طول مری شکمی دو گروه وجود داشت ( $P < 0/05$ ).

**نتیجه گیری:** بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد، اندازه طول مری شکمی در کودکان زیر 2 سال مبتلا به ریفلاکس گاستروازوفازیال نسبت به کودکان غیرمبتلا به ریفلاکس گاستروازوفازیال کوتاهتر است و لذا بهره گیری از پارامتر اندازه طول مری شکمی در سونوگرافی می تواند مثمرتر باشد.

**کلید واژه ها:** ریفلاکس گاستروازوفازیال، طول مری شکمی، کودکان زیر 2 سال، سونوگرافی.

وصول مقاله: 92/10/17 اصلاحیه نهایی: 93/3/7 پذیرش: 93/3/20

<sup>1</sup> Gastroesophageal Reflux

## مقدمه

ریفلاکس گاستروازفاژیال عبارت است از برگشت بدون کوشش محتویات معده به داخل مری یا اروفازنکس که از مسائل شایع در شیرخواران می باشد. ریفلاکس در شیرخواران زیر 12-8 ماه می تواند طبیعی قلمداد گردد. به شرطی که شیرخوار دچار عوارض تنفسی یا گوارشی نگردد (1,2). ریفلاکس گاستروازفاژیال پاتولوژیک بعد از 18 ماهگی و یا در صورت ایجاد عوارضی چون ازوفاژیت، نشانه های تنفسی یا نقص رشد در کودکان کوچکتر، تشخیص داده می شود که نیازمند درمان دارویی و در مواردی درمان جراحی می باشد (3). ریفلاکس می تواند باعث سوزش سر دل، سرفه، دیسفاژی (ناراحتی در بلع)، ویزینگ، پنومونی آسپیراسیون، خشونت صدا، نقص رشد و اوتیت میانی مکرر یا سینوزیت شود (4).

روشهای مختلفی برای تشخیص GER استفاده شده اند. ستنی گرافی هسته ای و PH متری، بیشترین حساسیت را در تشخیص ریفلاکس دارند (5,6). قابل اعتمادترین روشهای تشخیصی GER مونیتورینگ 24 ساعته PH مری است، ولی این روشها تهاجمی، وقت گیر و گران است (5و4). سری های upper GI به اندازه دو روش دیگر حساس نیستند اما هنوز در تشخیص موارد معنادار (Significant) استفاده می شوند (5). سونوگرافی به عنوان یک روش حساس و دقیق برای بررسی ریفلاکس معرفی شده است (7). مزیت سونوگرافی بر اندازه گیری PH مری این است که اطلاعات آناتومیکی نیز بدست می دهد. اما محدودیت هایی نیز، مانند عدم توانایی بررسی مری توراسیک دارد (8-11).

اگرچه کوتاه بودن طول مری و از جمله مری داخل شکمی به عنوان عامل مؤثر در ایجاد ریفلاکس فرض می شود، اندازه گیری سونوگرافیک طول مری داخل شکمی، به عنوان روشی برای تشخیص ریفلاکس کم بررسی شده است و نیز در برخی از مطالعات تفاوت مختصری از نظر

آناتومیکی در مری شکمی کودکان با و بدون ریفلاکس پیدا شده است. در ضمن اندازه گیری این بخش مری برای تشخیص ریفلاکس به طور روتین نه از سوی پزشکان بالینی درخواست می گردد و نه توسط رادیولوژیست انجام می شود. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه اندازه طول مری شکمی در کودکان زیر 2 سال با ریفلاکس گاستروازفاژیال و بدون ریفلاکس گاستروازفاژیال (کودکان سالم) می باشد.

## روش بررسی

این مطالعه از نوع مورد-شاهدی است. جامعه مورد مطالعه شامل کودکان زیر 2 سال در دو گروه با علائم بالینی به عنوان گروه مورد و بدون علائم بالینی به عنوان گروه شاهد بود. روش نمونه گیری بر اساس روش نمونه گیری در دسترس (آسان) می باشد. در این مطالعه هدف مقایسه دو گروه مورد و شاهد بود. پس میزان حجم نمونه با استفاده از مطالعه و متغیر اصلی طول مری محاسبه گردیده و مقدار 50 برای هر گروه مورد و شاهد به دست آمد. بنابراین مقدار کل نمونه برابر 100 نفر بود (6). در این مطالعه تمامی کودکان زیر 2 سال با علائم بالینی پیشنهاد کننده ی ریفلاکس توسط متخصص کودکان جهت تشخیص ریفلاکس ارجاع داده شدند و بعد از اثبات ریفلاکس با سونوگرافی 10 دقیقه ای مری یا سوالوی باریم، طبق درخواست پزشک اطفال، طول مری شکمی طبق پروتوکل اندازه گیری شد. همچنین کودکان زیر 2 سال بدون علائم پیشنهاد کننده که به علت دیگری برای سونوگرافی مراجعه کرده بودند با کسب رضایت نامه وارد طرح شدند و با سونوگرافی 10 دقیقه ای مری عدم وجود ریفلاکس در آنها اثبات شد و طول مری شکمی طبق پروتوکل در آنها اندازه گیری گردید. در نهایت طول مری شکمی در این دو گروه مقایسه شده و نتایج از نظر آماری تحلیل شد. ابزار مورد استفاده دستگاه us مارک G50 و G60 siemens با پروب سطحی 4MHz بود. جمع آوری داده ها مطابق با

گاستروازوفازيالى در جدول 2 خلاصه شده است. بر اساس نتايج جدول 2، ميانگين اندازه طول مري شكمى در كودكان زير 2 سال گروه با ريفلاكس گاستروازوفازيالى كوتاهتر از گروه بدون ريفلاكس گاستروازوفازيالى است. لذا، تفاوت معنادارى بين اندازه طول مري شكمى كودكان زير 2 سال با ريفلاكس گاستروازوفازيالى و بدون ريفلاكس گاستروازوفازيالى وجود دارد ( $P < 0/05$ ) (نمودار 1). بررسى مدل رگرسيون لجستيك پيش بينى كننده گروه ريفلاكس گاستروازوفازيالى و بدون ريفلاكس گاستروازوفازيالى بر اساس متغيرهاى سن، جنسيت، وزن و اندازه طول مري شكمى در جدول 3 خلاصه شده است. بنابراين، تنها متغير اندازه طول مري شكمى پيش بينى كننده گروه ريفلاكس گاستروازوفازيالى و بدون ريفلاكس گاستروازوفازيالى است ( $P < 0/05$ ). ويژگيهاى توصيفى اندازه طول مري شكمى و مقايسه اندازه طول مري شكمى در كودكان زير يكسال و بين يكسال تا 2 سال با ريفلاكس گاستروازوفازيالى و بدون ريفلاكس گاستروازوفازيالى بر حسب سن در جدول 4 خلاصه شده است. لذا، تفاوت معنادارى بين اندازه طول مري شكمى كودكان زير يكسال و بين يكسال تا 2 سال با ريفلاكس گاستروازوفازيالى و بدون ريفلاكس گاستروازوفازيالى وجود دارد ( $P < 0/05$ ). ويژگيهاى توصيفى اندازه طول مري شكمى و مقايسه اندازه طول مري شكمى در كودكان زير 2 سال با ريفلاكس گاستروازوفازيالى و بدون ريفلاكس گاستروازوفازيالى بر حسب جنسيت در جدول 5 خلاصه شده است. بنابراين، تفاوت معنادارى بين اندازه طول مري شكمى كودكان با ريفلاكس گاستروازوفازيالى و بدون ريفلاكس گاستروازوفازيالى بر حسب جنسيت وجود دارد ( $P < 0/05$ ).

روش كار صورت گرفته و در فرمى شماره كد به افراد داده شده و اطلاعات مربوط به هر بيمار نظير سن، جنس، وزن، وجود يا عدم وجود ريفلاكس و اندازه طول مري شكمى در آن درج شد. داده‌ها پس از جمع آورى وارد نرم افزار آمارى SPSS ويرايش 21 شده و براى خلاصه سازى نتايج از جداول يك بعدى و دو بعدى و شاخص هاى عددى مثل ميانگين و انحراف معيار و ... استفاده شد. براى تحليل داده‌هاى كمى از آزمون لون،  $t$  مستقل و  $U$  - من ويتنى استفاده شد. براى آناليز متغيرهاى كيفى از آزمون هاى مجذور كاي و آزمون دقيق فيشر استفاده گرديد. حداكثر خطاى مورد پذيرش معادل 0/05 به عنوان سطح معنادارى در نظر گرفته شد.

#### يافته ها


سن كودكان بين 1 تا 24 ماه با ميانگين برابر  $10/12 \pm 7/15$  ماه بود. جنسيت 45 نفر (45 درصد) مذكر و 55 نفر (55 درصد) مونث بود. وزن كودكان بين 2/6 تا 18 كيلوگرم با ميانگين برابر  $9/23 \pm 4/32$  كيلوگرم بود. طول مري كودكان بر اساس نتايج سونوگرافى بين 13 تا 37 ميلى متر با ميانگين برابر  $21/1 \pm 5/72$  ميلى متر بود. 50 نفر از كودكان مبتلا به ريفلاكس گاستروازوفازيالى (گروه مورد) و 50 نفر ديگر بدون ابتلا ريفلاكس گاستروازوفازيالى (گروه شاهد) بودند. ويژگيهاى توصيفى و مقايسه سن، جنسيت و وزن كودكان به تفكيك گروه مورد مطالعه در جدول 1 خلاصه شده است. بر اساس نتايج جدول 1، بين سن، جنسيت و وزن كودكان زير 2 سال با ريفلاكس گاستروازوفازيالى و بدون ريفلاكس گاستروازوفازيالى تفاوت معنادارى وجود ندارد ( $P > 0/05$ ). ويژگيهاى توصيفى اندازه طول مري شكمى و مقايسه اندازه طول مري شكمى در كودكان زير 2 سال با ريفلاكس گاستروازوفازيالى و بدون ريفلاكس

جدول 1- ویژگیهای توصیفی و مقایسه سن، جنسیت و وزن در کودکان زیر 2 سال با ریفلاکس گاستروازوفازیتال و بدون ریفلاکس گاستروازوفازیتال

P_Value	بدون ریفلاکس گاستروازوفازیتال	با ریفلاکس گاستروازوفازیتال	متغیر
0/77	10/33 ± 7/06	9/91 ± 7/31	سن (ماه) انحراف معیار ± میانگین
0/31	(44/4)20 (54/5)30	(55/6) 25 (45/5) 25	جنس مذکر مونث
0/6	9/45 ± 4/58	9 ± 4/06	وزن (کیلوگرم) انحراف معیار ± میانگین

جدول 2- ویژگیهای اندازه طول مری شکمی و مقایسه اندازه طول مری شکمی در کودکان زیر 2 سال با ریفلاکس گاستروازوفازیتال و بدون ریفلاکس گاستروازوفازیتال

P_Value	آماره t	انحراف معیار ± میانگین (میلیمتر)	گروه
<0/001	7/06	19/46 ± 4/54 26/23 ± 5/01	با ریفلاکس گاستروازوفازیتال بدون ریفلاکس گاستروازوفازیتال



### CI: Confidence Interval

نمودار 1- نمودار فاصله اطمینان 95 درصد میانگین اندازه طول مری شکمی در کودکان زیر 2 سال با ریفلاکس گاستروازوفازیتال و بدون ریفلاکس گاستروازوفازیتال

جدول 3- مقدار ضرایب رگرسیونی و مدل رگرسیونی لجستیک پیش بینی کننده گروه ریفلاکس گاستروازوفازیتال و بدون ریفلاکس گاستروازوفازیتال بر اساس متغیرهای سن، جنسیت، وزن و اندازه طول مری شکمی

P_Value	ضریب رگرسیونی	متغیر
0/627	-0/007	سن
0/725	-0/007	وزن
0/139	0/125	جنس
<0/001	0/055	طول مری شکمی

جدول 4- ویژگیهای اندازه طول مری شکمی و مقایسه اندازه طول مری شکمی در کودکان زیر یکسال و بین یکسال تا 2 سال با ریفلاکس گاستروازوفازیال و بدون ریفلاکس گاستروازوفازیال

سن	گروه	انحراف معیار ± میانگین (میلیمتر)	آماره t	P_Value
زیر یکسال	با ریفلاکس گاستروازوفازیال	18/08 ± 4/36	4/16	<0/001
	بدون ریفلاکس گاستروازوفازیال	24/26 ± 5/98		
بین یکسال تا 2 سال	با ریفلاکس گاستروازوفازیال	20/84 ± 4/38	7/11	<0/001
	بدون ریفلاکس گاستروازوفازیال	28/2 ± 2/73		

جدول 5- ویژگیهای اندازه طول مری شکمی و مقایسه اندازه طول مری شکمی در کودکان با ریفلاکس گاستروازوفازیال و بدون ریفلاکس گاستروازوفازیال بر حسب جنسیت

جنس	گروه	انحراف معیار ± میانگین (میلیمتر)	آماره t	P_Value
مذکر	با ریفلاکس گاستروازوفازیال	20/16 ± 4/71	4/58	<0/001
	بدون ریفلاکس گاستروازوفازیال	27/22 ± 5/62		
مونث	با ریفلاکس گاستروازوفازیال	18/76 ± 4/36	5/62	<0/001
	بدون ریفلاکس گاستروازوفازیال	25/56 ± 4/55		

### بحث

هدف از انجام این مطالعه، مقایسه اندازه طول مری شکمی در کودکان زیر 2 سال با ریفلاکس گاستروازوفازیال و بدون ریفلاکس گاستروازوفازیال می باشد. ریفلاکس معده به مری (GER) شایع ترین اختلال گوارشی در تمام سنین می باشد و آن عبارت است از برگشت محتویات معده به مری که معمولاً به صورت حملات کوتاه مدت بوده و باعث ایجاد علائم و آسیب مری نمی شود. اما بیماری ریفلاکس معده به مری (GERD) شکل پاتولوژیک و تشدید یافته این مشکل است که توأم با علائم و نشانه ها و عوارض می باشد. ریفلاکس فیزیولوژیک شایع ترین علت استفراغ های غیر صفراوی در دوره شیرخوارگی می باشد (12-15). در بالغین ریفلاکس گاستروازوفازیال پرهزینه ترین بیماری گوارشی است و یافته های موجود در اطفال نیز دال بر شیوع هزینه های بالا می باشد (16 و 17). در این مطالعه از لحاظ سنی، در گروه کودکان با ریفلاکس گاستروازوفازیال و گروه بدون ریفلاکس گاستروازوفازیال تفاوت معناداری وجود نداشت که شاید علت این امر، امکان ابتلا به ریفلاکس گاستروازوفازیال در تمام سنین

کودکان زیر 2 سال باشد. این با نتایج مطالعه دهدشتی و همکاران در سال 2009 در تهران مشابَهت دارد (18). اما، در مطالعه کریمی و همکاران در سال 1391 در تنکابن بین سن کودکان مبتلا و غیر مبتلا به ریفلاکس تفاوت معناداری وجود داشت. البته، در مطالعه کریمی و همکاران اکثریت کودکان در سن زیر 6 ماه قرار دارند (19).

بنابر نتایج این مطالعه، بین وزن کودکان با اندازه طول مری شکمی ارتباط مستقیم وجود داشت. پس با افزایش وزن، اندازه طول مری شکمی نیز زیاد می شود. بر اساس نتایج این مطالعه، میانگین اندازه طول مری شکمی در کودکان زیر 2 سال در گروه با ریفلاکس گاستروازوفازیال  $19/46 \pm 4/54$  میلیمتر و در گروه بدون ریفلاکس گاستروازوفازیال  $26/23 \pm 5/01$  میلیمتر می باشد که تفاوت معناداری بین اندازه طول مری شکمی دو گروه وجود دارد ( $P < 0/05$ ). بنابراین نتایج این مطالعه حاکی از آن است که اندازه طول مری شکمی در کودکان زیر 2 سال در گروه با ریفلاکس گاستروازوفازیال کوتاهتر از گروه بدون ریفلاکس گاستروازوفازیال است. همچنین، بر اساس مدل رگرسیونی نیز به این نتیجه رسیدیم اندازه طول مری شکمی می تواند

مری و فونوس معده) می باشد. یک ارتباط قوی بین ول مری شکمی و کاهش ریک GER وجود دارد. به طوریکه، طول 3 تا 4/5 سانتی متر افراد با فار داخل شکم نرمال کفایت عملکرد مناسب (LES) را فراهم می کند. طول 3 سانتی متر به نظر می رسد در نیمی از افراد برای جلوگیری از GER مناسب است. در حالیکه طول کمتر از یک سانتی متر در اغلب افراد به ریفلاکس منجر می شود (23).

### نتیجه گیری

بهره گیری از پارامتر اندازه طول مری شکمی در سونوگرافی ریفلاکس گاستروازوفازیال در تشخیص و درمان کودکان مبتلا به ریفلاکس گاستروازوفازیال می تواند مثرتر باشد. لذا به همکاران پیشنهاد می شود که بهره گیری از پارامتر اندازه طول مری شکمی در سونوگرافی به منظور بهبود تشخیص و درمان موفقیت آمیزتر کودکان مبتلا به ریفلاکس گاستروازوفازیال به عنوان جزیی از پروتکل درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

### تشکر و قدردانی

این تحقیق برگرفته از پایان نامه دستیاری بوده که بدینوسیله از کلیه پرسنل زحمتکش بخش رادیولوژی بیمارستان امام رضا (ع) که صمیمانه در انجام این تحقیق ما را یاری نمودند کمال تشکر را داریم.

پیش بینی کننده ریفلاکس گاستروازوفازیال باشد و در این مطالعه به این نتیجه رسیدیم که اندازه طول مری شکمی در کودکان زیر 1 سال در گروه با ریفلاکس گاستروازوفازیال کوتاهتر از گروه بدون ریفلاکس گاستروازوفازیال است و در کودکان بین 1 تا 2 سال نیز در گروه با ریفلاکس گاستروازوفازیال کوتاهتر از گروه بدون ریفلاکس گاستروازوفازیال است.

علاوه بر این، به این نتیجه نیز رسیدیم که در کودکان مذکر زیر 2 سال در گروه با ریفلاکس گاستروازوفازیال کوتاهتر از گروه بدون ریفلاکس گاستروازوفازیال است و در کودکان مونث زیر 2 سال نیز در گروه با ریفلاکس گاستروازوفازیال کوتاهتر از گروه بدون ریفلاکس گاستروازوفازیال است. مری کوتاه یک پدیده شناخته شده در بیماران ریفلاکس گاستروازوفازیال می باشد (20 و 17) و در نتایج مطالعه ما نیز با استفاده از تکنیک سونوگرافی این مسئله تأیید می شود و با نتایج مطالعات O'Sullivan و همکاران در سال 1982 در آمریکا، Gomes و همکاران در سال 1992 در آمریکا، Koumanidou و همکاران در سال 2004 در یونان، دهدشتی و همکاران و کریمی و همکاران در سال 1391 در تنکابن مشابه است (22 و 21 و 18 و 8).

دو فاکتور مهم آناتومیک ممانعت کننده از ریفلاکس گاستروازوفازیال طول مری شکمی و زاویه HIS (زاویه بین

### References

1. Baeza Herrera C. Gastroesophageal reflux in an infant. *Gac Med Mex* 1996; 132: 561.
2. Faubion WA Jr, Zein NN. Gastroesophageal reflux in infants and children. *Mayo Clin Proc* 1998; 73: 166-173.
3. Rudolph CD, Mazur LJ. Guidelines for evaluation and treatment of gastroesophageal reflux in infant and children. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2001; 32: S1-S31.
4. Marcadante KJ, Kleigman RM, Jenson HB, Behram RE. *Nelson Essentials of Pediatrics*. 6th ed. Philadelphia: Merritt & Cicalese. 2011 p.477.
5. Swischuk LE. *Imaging of the Newborn, Infant, and Young Child*. 5th ed. Philadelphia: Baze & Cook, 2003 P.345.

6. Barbolini G, Muratori G, Bertolani MF, Forese S, Vagnarelli F, Venuta A, and et al. Contribution of echography in the diagnosis of gastroesophageal reflux in children. *Pediatr Med Chir* 1992; 14: 619-622.
7. Koumanidou C, Vakaki M, Pitsoulakis G, Anagnostara A, Mirilas P. Sonographic measurement of the abdominal esophagus length in infancy: a diagnostic tool for gastroesophageal reflux. *Am J Roentgenol* 2004; 183:801-807.
8. Koumanidou C, Vakaki M, Pitsonlakis G , Anagnostara A , Mirilas p. Sonographic measurement of abdominal esophagus length in infancy: A diagnostic tool for gastresophageal reflux. *AJR* 2004; 183: 801–806.
9. Lazzari R, Collina A, Pession A, Corvaglia L, Tani G, Sciutti R. The diagnosis of gastroesophageal reflux in childhood: a comparison between echography and pH measurement. *Pediatr Med Chir* 1991; 13: 617-619.
10. Tani G, Sciutti R, Teglia F, Balzi F, Bernardi F, Zappulla F, Lazzari R. Diagnosis of gastro-esophageal reflux in children. *Ultrasonography versus pH monitoring. Radiol Med* 1993; 86: 626-629.
11. Milocco C, Salvatore CM, Torre G, Guastalla P, Ventura A. Sonography versus continuous 24 hours oesophageal pH-monitoring in the diagnosis of infant gastroesophageal reflux. *Pediatr Med Chir* 1997; 19: 245-246.
12. Tomita T, Iijima H, Kim Y, Oshima T, Hori K, Nishiguchi S, and et al. Abdominal ultrasonography as a new modality for the diagnosis of gastroesophageal reflux disease. *Jonrnal of Gastroentroy and Hepatology* 2010; 25: 45-48.
13. Orenstein SR, Khan S. Gastroesophageal reflux. In: Walker WA, editor. *Pediatric gastrointestinal disease*. 4th ed. Philadelphia: Saunders; 2004.p. 385-96.
14. Vandenplas Y. Gstroesophageal reflux. In: Hyams WR, editor. *Pediatric gastrointestinal and liver disease*. 3th ed. Philadelphia: Saunders; 2006.p. 306-25.
15. Sretenovic A, Perisic V, Simic A, Zivanovic D, Vujovic D, Kostic M, and et al. Gastroesophageal reflux in infants and children. *Acta Chir Jugosl* 2008; 55: 47-53.
16. Yalçın S, Ciftci AO, Senocak ME, Tanyel FC. Clinical presentation and management of gastroesophageal reflux disease in a referral center in Turkey. *Eur J Pediatr Surg* 2008; 18: 180-4.
17. Rudolph CD, Mazur LJ. Guidelines for evaluation and treatment of gstroesophageal reflux in infant and children. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2001; 32: S1-31.
18. Dehdashti H, Dehdashtian M, Rahim Fakher, Payvasteh M. Sonographic measurement of abdominal esophagus length as a diagnostic tool in gastroesophageal reflux . *SGA* 2010; 17: 53-57.
19. Karimi K, Jannat Alipour Z, Hakim F, Farahi Rostami R, Jassemi Zergani F, Fotokian Z. Assessment of gastroesophageal reflux in children(2-12 month) based on clinical findings and ultrasonography. *JSSU* 2012; 20: 295-305.
20. Martin CJ, Cox MR, Cade RJ. Collis-Nissen gastropasty fundoplication for complicated gastro-oesophageal reflux disease. *Aust N Z J Surg.* 1992; 62: 126-9.
21. Gomes H, Lallemand P. Infant apnea and gastroesophageal reflux. *Pediatr Radiol* 1992; 22: 8-11.
22. O’Sullivan GC, DeMeester TR, Joelsson BE, Smith RB, Blough RR, Johnson LF. Interaction of lower esophageal sphincter pressure and length of sphincter in the abdomen as determinants of gastroesophageal competence. *Am J Surg* 1982; 143: 40-6.
23. O’Neill J, Grosfeld J, Fonkalsrud E. *Principles of pediatric surgery*. 2 nd ed. Philadelphia: Mosbey, 2004.p.409-16.