

Effect of education based on health belief model with relaxation on anxiety of nulliparous women

Fakhri A., MD¹, Morshedi H., PhD², Mohammadi Zeidi I., PhD³

1. Assistant Professor, Department of Psychiatry, Medicine School, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
 2. Assistant Professor, Department of Public Health, Health School, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
 3. Associate Professor, Department of Public Health, Health School, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran, (Corresponding Author), Tel:+98-28-33357328, easamohammadizeidi@gmail.com

ABSTRACT

Background and Aim: Scientific literature has emphasized the role of education and non-pharmacological methods such as relaxation techniques as the priority treatment for anxiety in pregnancy. This study aimed to determine the effect of education, based on the health belief model (HBM) associated with relaxation on anxiety of nulliparous women.

Materials and Methods: In an experimental study, 120 nulliparous women referring to health centers in Qazvin City were assigned randomly to experimental and control groups by means of multi-stage sampling. Intervention course included 3 sessions of group education and a relaxation training session in addition to an educational CD and theory-based training booklet. The data collection tools included demographic questions, 58 item Pregnancy Related Anxiety Questionnaire (PRAQ), Knowledge scale and HBM related questions which were filled out by the participants in a self –reported manner before and after the intervention. Using SPSS 20.0, data were analyzed by analytical tests such as T-test, chi-square, Mann-Whitney U and ANOVA.

Results: The mean scores of knowledge, perceived sensitivity and severity, perceived barriers & benefits, self efficacy and cue to action constructs improved significantly in the experimental group after the intervention ($P<0.001$). Results revealed a significant decrease in the total anxiety score (from 241.9 ± 42.3 to 164.1 ± 40.4 , $P< 0.01$) and its dimensions in the experimental group after the intervention.

Conclusion: Regarding the effect of theory based relaxations training on reduction of anxiety in nulliparous women, use of these interventions to improve the health of women during pregnancy is recommended.

Key words: Pregnancy, Anxiety, Attitude, Behavior Modification, Relaxation.

Received: Aug 11, 2016 **Accepted:** Mar 13, 2017

تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی به همراه آرام سازی بر اضطراب زنان باردار نخست زا

احمد فخری^۱، هادی مرشدی^۲، عیسی محمدی زیدی^۳

۱. استادیار گروه اعصاب و روان، دانشکده علوم پزشکی اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

۲. استادیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

۳. دانشیار گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران (مؤلف مسؤول)، تلفن ثابت: ۰۲۸-۳۳۳۵۷۳۲۸
easamohammadizeidi@gmail.com

چکیده

زمینه و مقدمه: مطالعات بر نقش آموزش و روش های غیردارویی مانند تکنیک های آرام سازی عنوان اولویت درمان اضطراب بارداری تاکید می کنند. هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر آموزش بر مبنای الگوی اعتقاد بهداشتی به همراه تکنیک آرام سازی بر اضطراب زنان باردار نخست زا بود.

روش بررسی: در یک مطالعه تجربی، با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای ۱۲۰ نفر از زنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر قزوین به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تخصیص یافتند. مداخله آموزشی شامل ۳ جلسه آموزش گروهی و یک جلسه آموزش آرام سازی به همراه لوح فشرده و کتابچه آموزشی بود. ابزار گردآوری داده ها شامل سوالات دموگرافیک، پرسشنامه ۵۸ سوالی اضطراب بارداری، مقیاس آگاهی و سوالات الگوی اعتقاد بهداشتی بود که قبل و بعد از مداخله توسط مشارکت کنندگان به طور خودگزارشی تکمیل شد. داده ها با نرم افزار 20 SPSS و با استفاده از آزمون های تی، کای اسکوئر، من ویتنی یو و آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج: میانگین نمره آگاهی، حساسیت و شدت درک شده، موانع و منافع درک شده، خودکارآمدی و راهنمایی برای عمل در گروه تجربی بعد از مداخله به طور معنی دار بهبود یافت ($P < 0.001$). یافته ها نشان دهنده کاهش معنی دار میزان اضطراب کلی (از $241/9 \pm 42/3$ به $164/1 \pm 40/4$) و بعد آن بعد از مداخله بود.

نتیجه گیری: با توجه به تاثیر آموزش تئوری محور تکنیک آرام سازی بر کاهش اضطراب زنان باردار نخست زا، استفاده از مداخلات مذکور به منظور ارتقای سلامت زنان در دوره بارداری توصیه می شود.

کلمات کلیدی: بارداری، اضطراب، نگرش، تغییر رفتار، آرام سازی.

وصول مقاله: ۹۵/۵/۲۰؛ اصلاحیه نهایی: ۹۵/۱۲/۲۲؛ پذیرش: ۹۵/۱۲/۲۲

مقدمه

است و کاربرد روش های روان درمانی شناختی - رفتاری و شیوه های جایگزین مانند تصویرسازی ذهنی، آرام سازی، موسیقی درمانی و ماساژ پیشنهاد می شود (۸). تکنیک های آرام سازی ترکیبی از مداخلات روانی- جسمی و شناختی- رفتاری هستند که به منظور ایجاد تعادل بین عملکرد روانی و عاطفی ارائه می شوند (۱۱). مزایای تکنیک های آرام سازی عبارتند از: سادگی و قابلیت اجرا، عدم نیاز به تجهیزات خاص، بی ضرر بودن در دوران بارداری، کاهش ضربان قلب و فشار خون زن باردار، کاهش دردهای بعد از زایمان، کاهش ترس از زایمان (۱۰ و ۱۱).

مروری بر مطالعات اثربخشی این تکنیک ها را در کنترل اضطراب بارداری نشان داده است. به طور مثال، یافته های پژوهش Rouhe و همکاران نشانگر کاهش ترس شدید و بهبود شرایط روانی زنان باردار پس از اجرای آموزش گروهی و آرام سازی بود (۱۲). همچنین، ادغام آرام سازی پیشرونده عضلانی و تکنیک های تنفسی در مطالعه باستانی و همکاران منجر به کاهش میزان استرس در ک شده زنان باردار شد (۱۳).

سازمان جهانی بهداشت بر نقش آموزش بعنوان یک مولفه کلیدی در مراقبت های دوران بارداری تاکید می کند (۱۴). طراحی مداخلات اثربخش منوط به فهم موشکافانه رفتار بهداشتی است. در ک عوامل تاثیرگذار بر رفتار بهداشتی اگر بر اساس الگوهای کارآمد و آزمون شده باشد، معقول و باصره است. بنابراین، الگوهای تغییر رفتار می توانند در فهم تعیین کننده های رفتار سودمند باشند (۱۵).

الگوی اعتقاد بهداشتی (Health belief model): یکی از الگوهای اثربخش است که در تدوین برنامه های آموزشی در موضوعات مختلف استفاده شده است (۲۱-۲۱). بر اساس این الگو، تصمیم و انگیزه فرد برای اتخاذ یک رفتار منوط به این عوامل است: حساسیت در ک شده (ادراک فرد از میزان در معرض خطر بودن)، شدت در ک شده (ادراک فرد از وحامت پیامدهای ناشی از خطر مذکور)، منافع در ک شده (اعتقاد فرد به سودمندی روش

بارداری دوره ای بحرانی در فرآیند تکامل طبیعی زنان محسوب می شود که مستلزم سازگاری مجده با عوامل متنوع بیومدیکال، روانشناسی و اجتماعی- اقتصادی است و طبعاً سطوح مختلف اضطراب جزء جانشدنی آن است (۱). مطالعات نشان می دهد که از هر چهار زن باردار حداقل یک نفر علائم افسردگی، اضطراب و یا استرس را تجربه می کنند (۲). میزان اضطراب آشکار در زنان باردار نسبتاً بالا است. به طوری که میانگین شیوع اضطراب توسط Ferreira و همکاران ۵۸/۵ درصد (۳) و از سوی Gourounti و همکاران ۴۴/۴ درصد گزارش شده است (۴). در حالی که میزان شیوع آن در پژوهش صادقی و همکاران و علیپور و همکاران به ترتیب ۴۲/۶ درصد و ۶۳/۲ درصد ییان شده است (۵). مسائل روان شناختی خاص مربوط به بارداری اول مانند مسئولیت پذیری و قبول نقش مادری، تغییر در تصویر ذهنی از بدن، تغییر روابط جنسی و غیره باعث می گردد زنان نخست زا در مقایسه با سایرین اضطراب بیشتری را تجربه نمایند (۶ و ۷). همچنین، در صورت عدم درمان، این اضطراب در ۴۸ درصد زنان پس از زایمان تداوم خواهد یافت و حتی به فرزندان در سال های اول زندگی منتقل خواهد شد (۸ و ۷). تهدید سلامت مادر و کودک نتیجه اضطراب بارداری است که به اشکال مختلف ممکن است بروز نماید مانند: تولد نوزاد زودرس و کم وزن، ناهنجاری در رشد مغزی، اختلالات عاطفی، تنگی تنفسی دوران نوزادی، بدخواهی نوزاد و غیره (۲ و ۱). با وجود شیوع بالا و پیامدهای جدی، تقریباً دو سوم زنان مبتلا به دلایلی مانند فقدان دانش پرستیل و عدم آگاهی مادران، ترس از تجویز دارو و سایر علل شناسایی نمی شوند (۹).

با توجه به ارتباط قوی بین سلامت جسم و روان مخصوصاً در بارداری، و ریشه داشتن مشکلات بزرگسالی در دوران کودکی، کاربرد راهبردهای کنترل اضطراب و ارتقاء سلامت زنان در بارداری ضروری است. اما غالباً استفاده از روش های دارویی برای کنترل اضطراب بارداری ممنوع

خرداد سال ۹۴ به منظور دریافت خدمات و مراقبت‌های دوران بارداری به مراکز بهداشتی و پایگاه‌های بهداشتی شهر قزوین مراجعه کرده بودند. مبنای محاسبه حجم نمونه در مطالعه کنونی مقدار واریانس اضطراب کل با تکیه بر پژوهش‌های قبلی (۱۳)، حداقل اختلاف میانگین ۰/۶، مقدار خطای نوع اول برابر ۵٪ و توان آزمون ۸۰٪، برابر با ۱۰۸ نفر برآورد شد که با در نظر گرفتن ریزش ۱۰ درصدی نمونه‌ها در نهایت ۱۲۰ نفر برای شرکت در پژوهش تعیین شد.

در راستای نمونه‌گیری، ابتدا با توجه به تفاوت‌های موجود در خصوصیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق مختلف، از بین مراکز موجود در ۴ منطقه، ۸ مرکز به منظور انتخاب نمونه‌ها تعیین شدند. مجلداً از بین دو مرکز منتخب در هر منطقه، با استفاده از روش تصادفی ساده، یکی به گروه تجربی و دیگری به گروه کنترل تخصیص یافت. سپس به منظور انتخاب نمونه‌ها، تیم پژوهش با مراجعت روزانه – به استثنای روزهای تعطیل – پس از توضیح اهداف پژوهش از زنان باردار نخست زا حایز شرایط شرکت در مطالعه به مدت دو هفته ثبت نام بعمل می‌آوردند. در ادامه با توجه به تعداد زیاد نمونه‌ها، با استفاده از شیوه نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک تعداد ۱۵ نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. بدیهی است تمامی نمونه‌ها پس از هماهنگی‌های اولیه و توضیح اهداف پژوهش و فرایند اجرای مطالعه، در صورت علاقه‌مندی و اعلام آمادگی، با اخذ رضایت نامه آگاهانه وارد مطالعه شدند. همچنین، در صورت عدم موافقت فرد انتخاب شده، فرد دیگری به صورت تصادفی انتخاب و جایگزین می‌شد.

زنان بارداری با دامنه سنی ۳۵-۲۰ سال که نخستین حاملگی خود را تجربه می‌کردند با معیارهای ورود زیر برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند: سن بارداری ۱۶ الی ۲۰ هفته (بر اساس تاریخ دقیق اولین روز آخرین قاعدگی)، عدم ابتلا به بیماری‌های سیستمیک و نازایی، سواد خواندن و نوشتن، ابلاطی به اضطراب (نمونه‌هایی که نمره اضطراب ۲۱ تا ۶۰ را

های توصیه شده برای کاهش خطر)، موانع در کشیده (هزینه‌هایی مانند زمان، پول و غیره که بخاطر عمل به رفتار توصیه شده تصور می‌شود که فرد باید پرداخت کند)، عوامل تسهیل کننده و میانجی (متغیرهای دموگرافیک و روانی- اجتماعی و دانش فرد)، خودکارآمدی (باور فرد به انجام موفق یک رفتار علی رغم موانع مختلف) و در نهایت، راهنمای برای عمل (رسانه‌های جمعی، کادر پزشکی و درمانی، علایم درونی، ...). این مدل عموماً بر تغییر عقاید افراد متمرکر است و فرض می‌کند که تغییر در باورها منجر به تغییر رفتار می‌شود (۱۶). شهنازی و همکاران با ارزیابی نتایج مداخله آموزشی طراحی شده بر اساس HBM نشان دادند که ضمن بهبود پیش‌آیندهای روان شناختی ایجاد اضطراب، به طور معنی داری رفتارهای کنترل کننده اضطراب در زنان باردار نیز افزایش یافت (۲۲). مروری اجمالی بر تمامی مطالعات مرتبط نشان می‌دهد که اغلب این دسته از مداخلات یا از الگوهای تغییر رفتار استفاده نکرده اند یا به جای اندازه گیری مستقیم میزان اضطراب به ارزیابی رفتارهای غلبه بر اضطراب پرداخته اند.

بنابراین، با توجه به شیوع نسبتاً بالای اضطراب در دوران بارداری (۲-۶)، پیامدهای جدی آن بر سلامت مادر و کودک (۱۵ و ۲۳) و اثربخشی تکنیک آرام‌سازی به همراه تفکیک ناپذیر بودن آموزش (۲۴)، خصوصاً آموزش تئوری محور، بعنوان جزء کلیدی برنامه‌های ارتقاء سلامت (۲۴)، هدف مطالعه کنونی تعیین اثربخشی آرام‌سازی و مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی بر اضطراب زنان باردار نخست زا شهر قزوین بود.

روش بورسی

پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی بود که در دو گروه تجربی و کنترل در فاصله زمانی ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳ تا انتهای بهمن ماه همان سال در شهر قزوین انجام شد. جامعه آماری شامل تمام زنانی بودند که در انتظار تولد نخستین فرزند خود بوده و از ابتدای اردیبهشت تا انتهای

هر یک از آیتم ها و بین ۰ تا هفت است. بنابراین، نمره نهایی اضطراب می تواند بین صفر تا ۴۰۶ متغیر باشد (۲۵). مطالعات مختلف ویژگی های روانسنجی پرسشنامه اضطراب بارداری را تایید کردند (۲۷ و ۲۶ و ۸). به طور مثال در پژوهش هایزنک و همکاران (۲۰۰۴) ضریب آلفای کرونباخ همه خرده مقیاس های پرسشنامه در سراسر دوره بارداری به طور میانگین ۰/۷۶، گزارش شد و همبستگی آن با پرسشنامه اضطراب حالت-رگه اسپیلبرگر قابل قبول بود (۲۷). همچنین، یافته های مطالعه بابانظری و کافی (۲۰۰۸) به همراه پژوهش کارآموزیان و همکاران تایید کننده روایی و پایایی پرسشنامه مذکور بود (۶ و ۲۸). در مطالعه کتونی نیز ضرایب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های ترس از زایمان ۰/۷۹، ترس از تولد کودک معلوم (۰/۸۵)، ترس از تغییر در روابط زناشویی (۰/۸۰)، ترس از تغییر در خلق و خو و پیامدهای آن بر کودک (۰/۸۲)، ترس از تغییر در زندگی شخصی مادر (۰/۸۰) و کل پرسشنامه برابر با ۰/۷۷ بდست آمد. همچنین، ضریب آزمون بازآزمون با اجرای پرسشنامه در فاصله زمانی ۱۵ روزه در گروه ۱۵ نفری از مادران، که در مطالعه نهایی شرکت نداشتند، به طور میانگین ۰/۸۴ بود.

ج) سوالات الگوی اعتقاد بهداشتی: شامل ۱۶ سوال برای ارزیابی آگاهی زنان باردار در خصوص علل، علایم و روش های کنترل اضطراب در دوران بارداری بود که نمونه ها با استفاده از گزینه های بله (نمره ۲)، خیر (نمره ۱) و نمی دانم (نمره صفر) به آنها پاسخ دادند. دامنه نمرات این بخش بین ۰-۳۲ بود. همچنین، نمونه ها به هر یک از سازه های حساسیت (۶ سوال؛ = ۰/۸۸) و شدت در کشش (۶ سوال؛ = ۰/۸۴)، منافع (۸ سوال؛ = ۰/۸۳) و موانع در کشش (۶ سوال؛ = ۰/۷۹)، خودکارآمدی (۶ سوال؛ = ۰/۹۲) و راهنمایی برای عمل (۵ سوال) با استفاده از طیف لیکرتی ۵ نقطه ای از کاملاً مخالفم (۱) تا کاملاً موافقم (۵) پاسخ دادند. سوالات این بخش با تکیه بر مطالعات داخلی طراحی شده است (۲۲ و ۲۱ و ۱۳). به منظور اطمینان از روایی صوری پرسشنامه مذکور، از یک گروه ۱۰ نفری از زنان بارداری

کسب کرده بودند)، عدم مصرف داروهای ضد اضطراب، عدم سابقه فشار خون، عدم مصرف سیگار، عدم انجام تمرينات تن آرامی یا سابقه آموزش و شرکت در دوره های مرتبط در یک سال گذشته. همچنین، ابتلا به اختلالات و بیماری های روانی (من جمله اسکیزوفرنی، افسردگی و پارانویا)، و جسمی مزمن (مانند دیابت و بیماری های قلبی و غیره) نیازمند دارو یا مراقبت های ویژه، غیبت بیش از یک جلسه از برنامه آموزشی گروه تجربی، زنان چندزاء، سابقه سقط منجر به حذف از مطالعه می شد. لازم به ذکر است معیارهای مذکور با توجه به پرونده های پزشکی زنان باردار و تایید آنها از سوی پرسنل مرکز بهداشتی (و در صورت لزوم انجام معاينه و شرح حال دقیق) مورد کنترل قرار گرفتند. در نهایت، در این مطالعه ۲ نفر از گروه تجربی به دلیل نقل مکان و عدم تمايل برای ادامه همکاری و یک نفر از گروه کنترل به دلیل خطر سقط انصراف دادند.

داده های مطالعه کتونی در دو مقطع قبل و بلاfacسله پس از اجرای مداخلات آموزشی و تن آرامی در گروه های تجربی و کنترل گردآوری شد. ابزار گردآوری داده ها در پژوهش حاضر عبارت شامل ۳ بخش عمده بود: الف) سوالات دموگرافیک و زمینه ای شامل سن، میزان تحصیلات، شغل، میزان درآمد، مدت ازدواج، سن حاملگی، خواسته یا ناخواسته بودن بارداری، پوشش خدمات بیمه ای و سطح تحصیلات همسر بود. ب) پرسشنامه اضطراب بارداری Pregnancy Related Anxiety Questionnaire: (PRAQ)؛ هدف از کاربرد پرسشنامه مذکور سنجش ترس ها و نگرانی های مرتبط با بارداری با استفاده از ۵۸ آیتم و پنج خرده مقیاس به این شرح است: ترس از زایمان (۱۴ آیتم)، ترس از تولد کودک معلوم جسمانی یا روانی (۵ آیتم)، ترس از تغییر در روابط زناشویی (۱۳ آیتم)، ترس از تغییر در خلق و خو و پیامدهای آن بر کودک (۱۶ آیتم)، ترس از تغییر در زندگی شخصی مادر (۷ آیتم) و سه آیتم نهایی که تصویر کلی و عمومی از بارداری را ارائه می دهند. نمره نهایی پرسشنامه PRAQ ماحصل جمع کردن نمرات

و تعیین راهبردهای آموزش بر افزایش آگاهی، بهبود خودکارآمدی، شناسایی و رفع موانع، و باورهای مرتبط با شدت درک شده تمرکز بیشتری شد. بنابراین، برنامه آموزشی در نظر گرفته شده برای گروه تجربی شامل ۳ جلسه آموزش گروهی (با استفاده از روش‌های سخنرانی کوتاه ۱۰ دقیقه‌ای، بحث گروهی، پرسش و پاسخ) به مدت زمان تقریبی ۴۵-۳۰ دقیقه و یک جلسه آموزش و تمرین آرام سازی به طور انفرادی به مدت زمان ۴۵-۶۰ دقیقه بود. زنان باردار گروه تجربی در قالب گروه‌های ۸-۱۲ نفری و با هماهنگی قبلی و بر اساس زمان‌های پیشنهاد شده توسط خودشان در اتاق کنفرانس مراکز بهداشتی در دوره آموزشی شرکت کردند. خلاصه برنامه آموزشی در قالب جدول ۱ گزارش شده است. همچنین، با حضور یکی از اعضای تیم پژوهش به سوالات احتمالی نمونه‌ها در این جلسات پاسخ داده شد. به منظور اطمینان از اجرای منظم تمرینات تن آرامی در منزل به نمونه‌های گروه تجربی یک دفترچه تقویمی شکل به همراه لوح فشرده آموزش تن آرامی توسط همان کارشناس ارائه می‌شد. از نمونه‌ها درخواست شد تمرینات مذکور را به مدت ۱۵ دقیقه و در صورت امکان با موسیقی ملایم در منزل اجرا کرده و در دفترچه تقویمی ثبت نمایند.

درخواست شد تا پرسشنامه را به دقت مطالعه کنند و ایرادات و ابهامات آنرا معین کنند. پس از رفع ایرادات، همچنین، پس از جمع بندی نظرات پالل خبرگان مشکل از متخصص زنان (۲ نفر)، کارشناس ارشد مامایی (۲ نفر)، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی (۲ نفر)، روانپژوه (۱ نفر)، دکترای آموزش سلامت (۳ نفر)، در ارتباط با ضرورت و اهمیت CVI: Content، شاخص روایی محتوای (Content) و نسبت روایی محتوای (Validity Index) به ترتیب ۰/۸۲ و ۰/۸۵ بدلست. آمد که تایید کننده روایی محتوای ابزار مذکور هستند. همچنین، مدت زمان پاسخ گویی به سوالات ۶۰ دقیقه بود که در محل برگزاری کلاس‌ها و با حضور یکی از اعضا تیم تحقیق - به منظور اطمینان از دقت تکمیل پرسشنامه‌ها و پاسخ گویی به سوالات احتمالی شرکت کنندگان - انجام شد.

تیم تحقیق پس گردآوری و استخراج داده‌های اولیه، تعیین اهمیت و اولویت سازه‌های الگوی HBM چهارچوب کلی برنامه آموزشی را در ۴ هفته پایه ریزی کرد. به منظور تعیین سهم نسبی هر یک از سازه‌های الگوی HBM در راستای تدوین محتوای آموزشی به نتایج آنالیز رگرسیون و قدرت پیش‌بینی کنندگی سازه‌های HBM توجه خاص مبذول شد (جدول ۳). به همین دلیل، در طراحی محتوای آموزشی

جدول ۱: خلاصه برنامه آموزشی ارائه شده به منظور کاهش اضطراب از طریق آرام سازی	
شماره و هدف کلی جلسه	اهداف اختصاصی
روش مداخله	
سخنرانی کوتاه (۱۰ دقیقه ای)	بعد از مداخله آموزشی زنان باردار قادر باشند:
زنان باردار با بارداری و (۱) تغییرات آناتومیکی، فیزیولوژیکی و هورمونی دوران بارداری توضیح دهنند.	بحث گروهی در قالب گروه های ۸-۱۲ نفری (۳۵ دقیقه)
اضطراب	(۲) اضطراب و علل و نشانه های آنرا در دوران بارداری تعریف کنند.
بررسی و پاسخ	
پمفت آموزش با موضوع "بارداری و اضطراب"	
جلسه دوم) آشنایی با اثرات	۳) پیامدهای جسمانی و روانی اضطراب بر سلامت مادر و جنین را توضیح سخنرانی کوتاه (۱۰ دقیقه ای)
اضطراب بر سلامت مادر و	نمایش اسلاید و عکس مربوط به روش آرام سازی (۱۰ دقیقه)
جنین و آشنایی با فلسفه و	(۴) روشهای مختلف غیردارویی مقابله با اضطراب را نام ببرند.
مراحل روش آرام سازی	نمایش فیلم گام های آرام سازی به همراه توضیحات (۵) کلیات و مراحل روش آرام سازی را توضیح دهنند.
یادگیری مهارت های آرام	(۶) با ملزومات محیطی اجرای آرام سازی آشنا شوند.
سازی	(۷) آثار مثبت آرام سازی را بر سلامت جسمانی و روانی مادر و کودک توضیح پرسش و پاسخ (۱۰ دقیقه)
جلسه سوم) شناسایی منابع	۸) احساسات منفی و عوامل محیطی تنش زار اشنازی و آنالیز کنند.
اضطراب، موانع کنترل آن و	(۹) باورهای غلط درباره غیرقابل کنترل بودن اضطراب بارداری را شناسایی و
یادگیری مهارت های آرام	بارش افکار (۵ دقیقه)
سازی	(۱۰) روش های سنتی و رایج مورد استفاده برای تنش زدایی را بیان کنند.
یادگیری و بهبود مهارت آرام	(۱۱) باور کنند که کنترل اضطراب از طریق آرام سازی امکان پذیر است و قادر هستند مراحل آرام سازی را بیاموزند.
زا	(۱۲) تمرینات تنفسی و نحوه انقباض عضلات را اجرا کنند.
جلسه چهارم) تقویت	(۱۳) مراحل آرام سازی را به طور خلاصه توضیح دهنند.
یادگیری و بهبود مهارت آرام	(۱۴) در حضور مریبی بتوانند آرام سازی را به طور صحیح و دقیق اجرا کنند.
زا	
پمفت مراحل آرام سازی	
تشویق کلامی	
کتابچه آموزشی مصور آرام سازی	
لوح فشرده (۳۰ دقیقه ای)	
مشاوره فردی (۳۰ دقیقه)	
راهنمایی برای انجام آرام سازی در موقعیت های تنش زا (۱۵ دقیقه)	
پمفت مراحل آرام سازی	
تشویق کلامی	

کنونی به تایید کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین رسیده است (شناسه کمیته اخلاق: IR.QUMS.REC.1394.133).

نهایتاً، داده های گردآوری شده وارد نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ شد. پس از اطمینان از نرم افزار بودن توزیع داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف، آمار توصیفی شامل جداول فراوانی، میانگین به همراه آزمون های کای اسکوئر، تی مستقل و زوجی، من ویتنی یو، آنالیز واریانس

کلیه شرکت کنندگان به طور داوطلبانه و آگاهانه در مطالعه شرکت کردند و به آنها اطمینان داده شد که اطلاعات گردآوری شده تنها به منظور پژوهش مورد استفاده قرار خواهد گرفت و جزئیات نزد تیم پژوهش به صورت محترمانه باقی خواهد ماند. ضمناً به تمام شرکت کنندگان یادآوری شده که در هر زمان که بخواهند می توانند جلسات را ترک کنند. از تمامی نمونه ها رضایت نامه کتبی برای شرکت در مطالعه اخذ شده است. لازم به تذکر است که پژوهش

پیشگیری از اضطراب بارداری در زنان باردار شرکت کننده در دوره آموزشی (گروه تجربی) حاکی از بهبود نمره آگاهی آنها پس از اجرای مداخله است ($P < 0.001$)، در حالی که در گروه کنترل تغییرات حادث شده در متغیر مذکور از نظر آماری معنی دار نیست. همچنین، یافته های جدول ۴ حاکی از افزایش میانگین سازه های حساسیت، شدت، منافع درک شده، خودکارآمدی و راهنمایی عمل در گروه تجربی پس از مداخله هستند ($P < 0.001$). علاوه بر این، مرور جدول دلالت بر کاهش معنی دار میانگین نمره سازه مواعظ درک شده در زنان باردار گروه تجربی می کند ($P < 0.001$).

بررسی میزان اضطراب در زنان باردار گروه های تجربی و کنترل قبل از مداخله نشانگر بالا بودن میانگین اضطراب کلی در نمونه های مورد مطالعه است. نتایج آزمون تی مستقل که به مقایسه میانگین سطح اضطراب به طور کلی و ابعاد آن قبل از اجرای مداخله در گروه های تجربی و کنترل پرداخته است، نشان می دهد که بین دو گروه از حیث متغیر وابسته اصلی پژوهش تفاوت معنی دار وجود ندارد، اما یافته های مربوط به آنالیز تی زوجی پس از مداخله نشانگر کاهش معنی دار در میانگین اضطراب کلی و همچنین، تقلیل سطح اضطراب زنان گروه تجربی در پنج بعد ترس از تغییر در روابط زناشویی، ترس از زایمان، ترس از تولد کودک معلوم، ترس از تغییر خلق و خو و ترس از تغییر زندگی شخصی مادر است ($P < 0.01$) (جدول ۵).

یک طرفه به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها مورد استفاده قرار گرفت. در تمامی موارد $P < 0.05$ از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

میانگین سنی زنان شرکت کننده در پژوهش حاضر برابر با $5/7 \pm 25/6$ سال بود و اکثر نمونه ها دارای وضعیت اقتصادی متوسط بودند. همچنین، $41/7$ درصد نمونه های هر دو گروه تجربی و کنترل میزان تحصیلات خود را دبیرستان و دیپلم گزارش کردند و کمتر از یک چهارم نمونه ها به هنگام پژوهش شاغل بودند. همچنین، میزان بارداری ناخواسته در گروه های تجربی و کنترل به ترتیب $6/7$ و 5 درصد گزارش شد. سایر خصوصیات دموگرافیک زنان شرکت کننده در پژوهش در جدول ۲ معکس شده است. همچنین نتایج آزمون های تی مستقل و کای اسکوئر اختلاف معنی داری را بین دو گروه از حیث متغیرهای دموگرافیک درج شده در جدول ۲ نشان نداد.

یافته های مندرج در جدول ۳ نشان می دهد که از بین سازه های مرتبط با الگوی HBM، خودکارآمدی، آگاهی، مواعظ درک شده و شدت درک شده بر شیوع اضطراب در زنان باردار نخست زا تاثیر معنی دار دارند ($P < 0.05$).

یافته های مندرج در جدول شماره ۴ نشان دهنده وضعیت متغیرها و سازه های مرتبط با HBM در نمونه های گروه های تجربی و کنترل است که در دو مقطع زمانی قبل و پس از اجرای برنامه مداخله اندازه گیری شده است. مقایسه میانگین متغیر آگاهی نسبت به علل، پیامدها و روش های

جدول ۲: ویژگی های دموگرافیک آزمودنی های گروه های تجربی (۶۰ نفر) و کنترل (۶۰ نفر)

P	گروه تجربی (N = ۶۰)		متغیر مورد بررسی
	تعداد (%)	گروه کنترل	
۰/۱۴	(۲۸/۳) ۱۷	(۲۵) ۱۵	۲۰-۲۵ سن (سال)
	(۳۸/۳) ۲۳	(۴۰) ۲۴	۲۶-۳۰
	(۳۳/۴) ۲۰	(۳۵) ۲۱	۳۱-۳۵
۰/۳۶	(۲۳/۳) ۱۴	(۲۰) ۱۲	خوب وضعیت اقتصادی
	(۵۸/۳) ۳۵	(۶۳/۳) ۳۸	متوسط
	(۱۸/۴) ۱۱	(۱۶/۷) ۱۰	ضعیف
۰/۲۸	(۲۸/۳) ۱۷	(۲۳/۳) ۱۴	ابتدایی و راهنمایی میزان تحصیلات
	(۴۱/۷) ۲۵	(۴۱/۷) ۲۵	دیپلم و دبیرستان
	(۳۰) ۱۸	(۳۵) ۲۱	دانشگاهی
۰/۱۲	(۸۳/۳) ۵۰	(۷۸/۳) ۴۷	شغل مادر خانه دار
	(۱۶/۷) ۱۰	(۲۱/۷) ۱۳	شاغل
۰/۳۹	(۲۳/۳) ۱۴	(۲۵) ۱۵	شغل همسر کارمند
	(۷۰) ۴۲	(۶۵) ۳۹	آزاد
	(۶/۷) ۴	(۱۰) ۶	کارگر
۰/۳۳	(۲۳/۳) ۱۴	(۲۳/۳) ۱۴	ابتدایی و راهنمایی میزان تحصیلات همسر
	(۴۸/۳) ۲۹	(۴۶/۷) ۲۸	دیپلم و دبیرستان
	(۸/۳) ۱۷	(۳۰) ۱۸	دانشگاهی
۰/۱۸	(۹۰) ۵۴	(۸۸/۳) ۵۳	پوشش بیمه ای بلی
	(۱۰) ۶	(۱۱/۷) ۷	خیر
۰/۵۷	(۹۵) ۵۷	(۹۳/۳) ۵۶	نوع بارداری بارداری برنامه ریزی شده
	(۵) ۳	(۶/۷) ۴	بارداری ناخواسته

جدول ۳: یافته های مدل رگرسیونی در پیش بینی شیوع اضطراب در زنان باردار تخته زا

متغیر	خطای استاندارد			
	صریب رگرسیون ()	سطح معنی داری t	مقدار t	مقدار معنی داری
مقدار ثابت	-۰/۷۳۳	۰/۱/۸۴۳	-	۰/۰۶۱
خود کارآمدی	۱/۱۳۳	۰/۰۵۶۲	۲/۰۰۴	
آگاهی	۰/۱۱۵	۰/۰۴۱	۰/۰۶۷۵	۰/۰۰۹
موانع در ک شده	۰/۰۶۳	۰/۰۰۲۱	۳/۰۱۷	۰/۰۰۰
شدت در ک شده	-۰/۰۵۸	-۰/۰۰۴۵	-۲/۰۳۱	۰/۰۲۴

جدول ۴: مقایسه میانگین و انحراف معیار امتیاز سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در آزمودنی های گروه های کنترل و تجربی قبل و بعد از مداخله آموزشی و آرام سازی

متغیر مورد بررسی	گروه مورد بررسی	زمان ارزیابی		قبل از مداخله	بعد از مداخله	[*] P
		بعد از مداخله	قبل از مداخله			
آگاهی	گروه کنترل	۱۹/۰ ± ۳/۷	۱۸/۳ ± ۳/۵			۰/۲۳
	گروه تجربی	۲۵/۴ ± ۵/۳	۱۸/۸ ± ۳/۲			P < 0/001
	^{**P} value	P < 0/001	۰/۵۳			
حساسیت در ک شده	گروه کنترل	۱۶/۰ ± ۵/۰	۱۶/۲ ± ۴/۵			۰/۴۱
	گروه تجربی	۲۳/۸ ± ۵/۵	۱۶/۶ ± ۴/۴			P < 0/001
	P value	P < 0/001	۰/۳۳			
شدت در ک شده	گروه کنترل	۱۵/۶ ± ۳/۷	۱۵/۹ ± ۳/۴			۰/۳۵
	گروه تجربی	۲۱/۹ ± ۴/۶	۱۶/۰ ± ۳/۶			P < 0/001
	P value	P < 0/001	۰/۷۲			
موانع در ک شده	گروه کنترل	۲۴/۲ ± ۵/۲	۲۴/۲ ± ۴/۴			۰/۶۳
	گروه تجربی	۱۴/۳ ± ۴/۶	۲۳/۷ ± ۴/۹			P < 0/001
	P value	P < 0/001	۰/۲۰			
منافع در ک شده	گروه کنترل	۲۴/۱ ± ۴/۸	۲۳/۷ ± ۵/۱			۰/۲۲
	گروه تجربی	۳۲/۷ ± ۶/۲	۲۲/۵ ± ۴/۸			P < 0/001
	P value	P < 0/001	۰/۲۶			
خودکارامدی	گروه کنترل	۱۶/۳ ± ۲/۹	۱۵/۶ ± ۳/۵			۰/۱۸
	گروه تجربی	۲۲/۱ ± ۴/۴	۱۵/۴ ± ۳/۷			P < 0/001
	P value	P < 0/001	۰/۳۸			
راهنمایی عمل	گروه کنترل	۱۳/۱ ± ۴/۳	۱۲/۷ ± ۴/۲			۰/۲۶
	گروه تجربی	۱۹/۶ ± ۶/۵	۱۳/۰ ± ۴/۰			P < 0/001
	P value	P < 0/001	۰/۱۹			

نکته (° P قبل و بعد؛ ** P بین دو گروه)

جدول ۵: مقایسه میانگین و انحراف معیار اضطراب بارداری به طور کلی و بعد از اجرای مداخله آموزشی و آرام سازی

[*] P	زمان			متغیر مورد بررسی
	بعد از مداخله	قبل از مداخله	گروه مورد بررسی	
۰/۲۹	۶۶/۸ ± ۲۱/۰	۶۲/۷ ± ۱۷/۳	گروه کنترل	ترس از تغییر در روابط زناشویی
P < ۰/۰۱	۴۱/۴ ± ۱۴/۷	۵۸/۳ ± ۲۰/۵	گروه تجربی	
	P < ۰/۰۱	۰/۱۷	**P value	
۰/۳۹	۴۲/۳ ± ۱۵/۶	۴۰/۲ ± ۱۳/۵	گروه کنترل	ترس از زایمان
P < ۰/۰۱	۳۰/۷ ± ۱۴/۰	۴۳/۶ ± ۱۴/۶	گروه تجربی	
	P < ۰/۰۱	۰/۴۶	P value	
۰/۶۲	۳۳/۴ ± ۱۳/۸	۳۷/۵ ± ۱۵/۳	گروه کنترل	ترس از تولد کودک معلوم جسمی یا روانی
P < ۰/۰۱	۱۹/۷ ± ۱۰/۳	۳۳/۹ ± ۱۵/۵	گروه تجربی	
	P < ۰/۰۱	۰/۳۵	P value	
۰/۵۲	۴۴/۴ ± ۱۴/۵	۴۲/۱ ± ۱۴/۳	گروه کنترل	ترس از تغییر در خلق و خو و پیامد آن بر کودک
P < ۰/۰۱	۳۱/۵ ± ۱۳/۶	۳۹/۷ ± ۱۲/۹	گروه تجربی	
	P < ۰/۰۱	۰/۲۲	P value	
۰/۴۰	۶۳/۳ ± ۱۹/۱	۵۹/۶ ± ۲۰/۳	گروه کنترل	ترس از تغییر زندگی شخصی مادر
P < ۰/۰۱	۴۱/۷ ± ۱۳/۹	۵۵/۲ ± ۱۸/۴	گروه تجربی	
	P < ۰/۰۱	۰/۳۱	P value	
۰/۲۶	۲۴۲/۲ ± ۴۷/۶	۲۳۷/۴ ± ۴۰/۵	گروه کنترل	اضطراب کلی
P < ۰/۰۱	۱۶۴/۱ ± ۴۰/۴	۲۴۱/۹ ± ۴۲/۳	گروه تجربی	
	P < ۰/۰۱	۰/۵۴	P value	

نکته: ^{*}P قبل و بعد؛ **P بین دو گروه)

الگوی HBM با تغییر مولفه های موثر بر اضطراب منجر به بهبود سلامت روانی زنان باردار نخست زا شده است. در پژوهش کنونی آموزش های ارائه شده، بر اساس سازه های HBM و با تمرکز بر ارتقاء دانش، بهبود باورهای تشدید کننده اضطراب، شناسایی موانع و در نهایت حل مسئله با مهارت آموزشی و ارائه بازخورد به منظور بهبود خودکارآمدی، مشخصاً بر اساس نیازمنجی اولیه و منطبق با شرایط دوره بارداری، نوع افکار، ترس ها و نگرانی هایی بود که ممکن است برای زنان باردار نخست زا در این برهم حساس ایجاد شود.

میزان اضطراب زنان باردار در گروه تجربی و کنترل قبل از اجرای مداخله یکی از مهمترین یافته های پژوهش حاضر

بحث

نتایج پژوهش حاضر به طور کلی نشان دهنده این است که شرکت زنان باردار نخست زا در یک برنامه آموزشی ثئوری محور و با تمرکز بر آموزش آرام سازی منجر به بهبود پیشآیندهای روان شناختی موثر بر بروز اضطراب دوران بارداری شده و نهایتاً باعث کاهش اضطراب دوره بارداری می گردد. از جای تاثیرگذاری مداخله آموزشی بر میزان اضطراب زنان باردار، یافته های این پژوهش با نتایج مطالعات رحیمی و همکاران، دره شوری و همکاران، همچنین Yildirim و همکاران (۲۰۱۴) و Maeda و همکاران (۲۰۱۶) همسو است (۲۹-۳۲). در حقیقت، ادغام آرام سازی در قالب یک برنامه آموزشی منظم و مبتنی بر

های شناختی و نگرش های ناکارآمد یکی از عوامل مؤثر در پیدایش افسردگی، اضطراب و استرس در افراد است. تصور آسیب پذیری نوعی عامل خطر برای اضطراب بشمار می رود (۳۶ و ۳۷). در واقع، آموزش باعث شد زنان باردار معتقد شوند که اولاً اضطراب برای سلامت مادر و جنین خطرناک است و ثانیاً این خطر می تواند بسیار جدی باشد.

همچنین، نتایج پژوهش حاکی از افزایش میانگین نمره منافع درک شده و کاهش میانگین نمره مواعظ درک شده در گروه تجربی بعد از آموزش بود ($P<0.001$) که با نتایج مطالعات قبلی همسو است (۲۱ و ۲۲ و ۱۳). مواعظ درک شده مهم ترین سازه در پیش بینی رفتارهای محافظت کننده سلامت است (۳۸ و ۳۹). در پژوهش حاضر، بحث گروهی درباره مشکلات مرتبط با روش های کاهش اضطراب – مانند پیدا کردن روش کارآمد غیردارویی، عدم حمایت همسر، هزینه مشاوره و غیره – با ارائه فرست تصمیم گیری مجدد و تمرکز بر راه حل ها، منجر به کاهش مواعظ شد. ضمن آنکه افزایش میانگین نمره سازه منافع درک شده نیز می تواند حاصل بحث درباره مزایای آرام سازی و کاهش اضطراب – مانند سلامت جنین، بهبود کیفیت خواب – باشد. تغییر معنی دار در میانگین نمره سازه خودکارآمدی از دیگر یافته های مهم پژوهش حاضر بود ($P<0.001$). که با یافته های سایر پژوهش ها همخوانی دارد (۲۲ و ۱۳). افراد دارای خودکارآمدی پایین به وضوح مشارکت کمتری برای انجام رفتار دارند. چرا که با یک دید تک بعدی و سطحی مسایل را سپار ساخت تر از آن چیزی می بینند که واقعاً هست (۴۰ و ۴۱). نقطه قوت استفاده از تکنیک های مشارکتی مانند بحث گروهی تعامل بیشتر افراد و بهره مندی از نظرات تمام افراد است. در پژوهش حاضر زنان با **الگوپرداری** از اجرای تکنیک آرام سازی از سوی مری، به تکرار و تمرین آن پرداختند. ارائه بازخورد مناسب و تشویق به همراه مشاهده برگه تقویمی ثبت رفتار توسط آموزش دهنده و خود فرد، باعث تقویت خودکارآمدی شد.

بود که با یافته های مطالعاتی که نشانگر شیوع بالای اضطراب در زنان باردار نخست زا است، همسو است. تغییرات جسمانی و روانشناسی که در نخستین زایمان حالت حداکثری به خود گرفته در کنار مواردی همچون ترس از فرایند زایمان، ترس از سلامت جنین، ترس از تغییر روابط زناشویی و ترس از تغییرات ظاهری دارد، باعث می شود زنان باردار نخست زا دچار اضطراب شوند (۴۹).

یکی از یافته های پژوهش حاضر افزایش نمره آگاهی زنان باردار در گروه تجربی پس از مداخله بود (از ۱۸/۸ به ۲۵/۴ و $P<0.001$) که با نتایج مطالعات مشابه انطباق دارد (۲۲ و ۲۱ و ۱۳). آموزش های دوران بارداری با هدف آگاهی بخش به زنان و همسرانشان جزئی ضروری از مراقبت های روتین بارداری است. عدم آگاهی و اطلاعات کم درباره فرایند بارداری و زایمان بیشترین علت بروز اضطراب در بارداری خصوصاً در زنان نخست زا است (۳۳ و ۳۴). متعاقباً، مواجهه زنان باردار با مجموعه ای از توصیه های سنتی به همراه هجمه ای از اطلاعات ضد و نقیض و مبهم، ضرورت دریافت اطلاعات صحیح را از سوی منبعی مطمئن ایجاب می کند. اما موانعی مانند مشغله فراوان پیشکان و پرسنل بهداشتی به علت کثرت مراجعات، بی اعتمادی زنان به پرسنل بهداشتی، آشنا نبودن به اصول مشاوره و آموزش اثربخش در کنار دلایل دیگر مستلزم را پیچیده تر می کند (۳۵). محتوای برنامه آموزشی در مطالعه حاضر خصوصاً تاکید بر پیامدهای احتمالی اضطراب بر سلامت مادر و جنین، مانند تولد کودک کم وزن، افزایش مرگ و میر هنگام تولد، کم خونی، اختلالات خلقی و غیره، می تواند دلیل احتمالی بهبود امتیاز آگاهی زنان در گروه تجربی باشد.

علاوه بر بهبود آگاهی، یافته های پژوهش کنونی نشانگر بهبود وضعیت حساسیت و شدت درک شده در گروه تجربی بعد از مداخله بود ($P<0.001$) که مشابه سایر مطالعات بود (۲۲ و ۲۱). اهمیت تمرکز برنامه آموزشی بر ارتقاء دو این دو سازه ریشه در این حقیقت دارد که تحریف

باورهای مطلوب و تقلیل نگرش های منفی داشته باشد. ثالثاً با توجه به ظرفیت های بالقوه بحث گروهی، استفاده از آن عنوان استراتژی کارآمد در شناسایی موضع، عقاید تاثیرگذار و الگوبرداری رفتارهای مطلوب مرتبط با اضطراب در زنان نخست زامی تواند مفید باشد.

پژوهش حاضر به رغم تلاش محققان با محدودیت هایی مواجهه بود: (الف) علی رغم انتخاب گروه کنترل به طور تصادفی و عدم اختلاف معنی دار بین دو گروه، با این حال نمی توان به راحتی از تاثیر عوامل محیطی مانند تحصیلات، شرایط اقتصادی، سبک زندگی، فرهنگ و سایر عوامل بر دامنه تاثیرات آموزش آرام سازی غافل شد. (ب) مبنای قضایت تیم تحقیق در این پژوهش نسبت به متغیرهای اصلی پژوهش همچون اضطراب و عوامل روان شناختی گزارش خود فرد و موارد مشخص شده در پرسشنامه است. علی رغم قابل اطمینان بودن پرسشنامه های خود ایفا، محققان در تفسیر نتایج باید تورش پاسخ گویی را مدنظر قرار بدهند. (ج) به دلیل محدودیت های پژوهش امکان مشارکت همسران در دوره آموزشی فراهم نشد. پژوهش های آتی می توانند با مشارکت همسران زمینه اثربخشی بیشتر و بهبود کارآیی برنامه آموزشی را فراهم کنند. (د) ارزیابی قبل و بعد به همراه عدم پیگیری نمونه ها تا بعد از زایمان و تعیین تاثیر دوره آموزش بر سلامت جنین و درد و سایر متغیرهای مربوط به زایمان نیز از محدودیت های دیگر پژوهش کنونی است. علاوه بر این، مقایسه یافته ها مطالعه حاضر از حیث اثرگذاری آموزش بر اساس HBM با توجه به منابع محدود موجود در این زمینه به خوبی ممکن نبود. انجام مطالعات بیشتر با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و سایر مدل های تغییر رفتار توصیه می شود.

نتیجه گیری

یافته های پژوهش حاضر از تاثیر اجرای تکنیک آرام سازی به همراه مداخله آموزشی مبتنی بر چهار چوب الگوی اعتقاد بهداشتی بر بهبود متغیرهای روان شناختی و کاهش میزان

اما مهم ترین یافته پژوهش حاضر کاهش معنی دار در میانگین نمره اضطراب به صورت کلی (از ۲۴۱/۹ به ۱۶۴/۱، $P < 0.01$) و در ابعاد آن پس از مداخله در زنان باردار گروه تجربی بود ($P < 0.01$). کارآموزیان و همکاران در پژوهش خود نشان داد که اجرای برنامه مداخله ای شناختی رفتاری منجر به کاهش معنی دار میانگین نمره اضطراب کلی از ۲۳۳/۲ به ۱۷۱/۶ شده است (۰.۲۸). یافته های مطالعه Wilkinson و همکاران (۲۰۱۶)، Kingston و همکاران (۲۰۱۵) نیز مشابه بود (۰.۴۱ و ۰.۴۲). در حقیقت، ماحصل آموزش به شیوه گروهی تدارک شرایط مناسب و بهبود وضعیت روانی، افزایش اعتماد به نفس، و نهایتاً افزایش راندمان تکنیک آرام سازی و کاهش مشهود اضطراب است (۰.۴۲ و ۰.۴۱). آموزش با ایجاد نگرش مثبت و افزایش خود کارآمدی موجب می شوند زنان باردار مسئولیت پذیری بیشتر را برای مشارکت در دوره های تنش زدایی و اداره زایمان پذیرند (۰.۴۳). علاوه بر کاهش اضطراب کلی، اجرای مداخله توانست ترس هایی مانند ترس از تولد کودک معلوم، ترس از زایمان، و غیره را به طور معنی داری تقلیل دهد که با یافته های سایر پژوهش ها منطبق است (۰.۲۰ و ۰.۲۲). مروری بر مداخلات پیشین نشان می دهد که آموزش باعث استفاده زنان باردار از راهبردهای صحیح حل مسئله، انتخاب آگاهانه زایمان طبیعی و کوتاه تر شدن زمان زایمان می گردد (۰.۴۶-۰.۴۴). مشارکت و بحث گروهی باعث می شود تا زنان باردار تصویر واقع بینانه تر از خود بدست آورند و با کمک به دیگران نیز به ارزشمندی، مفید بودن و منحصر به فرد بودن خود پی ببرند.

نتایج مطالعه حاضر به محققان و کارشناسان حوزه سلامت مادر و کودک پیشنهاداتی را ارائه می کند. اولاً یاددهی تکنیک های آرام سازی بعنوان گام عملی غلبه بر اضطراب راهبرد موثر افزایش اعتماد به نفس در زنان باردار نخست زا است. ثانیاً تدوین محتوای آموزش مقابله با اضطراب - با تمرکز بر متغیرهای پیش بینی کننده اضطراب برگرفته از الگوی HBM - می تواند نقش حیاتی در تقویت کننده

تشکر و قدردانی

این مقاله، نتیجه طرح پژوهش مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشت درمانی فروین به شماره ۴۴/۲۹۲۶۵/د و با شناسه اخلاق شناسه اخلاق: IR.QUMS.REC.1394.133 است و با حمایت مالی آن دانشگاه انجام گرفته است. نویسنده‌گان از معاونت پژوهشی آن دانشگاه، کارکنان مراکز بهداشتی درمانی شهر فروین و کلیه مادران بارداری که بدون مساعدة و همکاری آنها انجام مطالعه ممکن نبود، تشکر می‌کنند.

اضطراب در زنان باردار نخست زا حمایت می‌کند. با توجه به پیامدهای جدی و قابل پیشگیری اضطراب دوران بارداری بر سلامت مادر و جنین، و تأکید سازمان‌های بهداشتی بر استفاده از روش‌های غیردارویی و روان‌شناختی برای کنترل اضطراب در دوران بارداری، اجرای مداخلات آموزشی و آرام‌سازی با هدف کاهش اضطراب در دوران بارداری در قالب مراقبت‌های بهداشتی در مراکز بهداشتی درمانی توصیه می‌شود.

References

1. Van Busse JC, Spitz B, Demyttenaere K. Women's mental health before, during, and after pregnancy: a population-based controlled cohort study. Birth 2006; 33: 297-302.
2. Teixeira C, Figueiredo B, Conde A, Pacheco A, Costa R. Anxiety and depression during pregnancy in women and men. J Affect Disord 2009; 119: 142-8.
3. Ferreira CR, Orsini MC, Vieira CR, do Amarante Paffaro AM, Silva RR. Prevalence of anxiety symptoms and depression in the third gestational trimester. Arch Gynecol Obstet 2015; 291:999-1003.
4. Gourounti K, Anagnostopoulos F, Lykeridou K, Griva F, Vaslamatzis G. Prevalence of women's worries, anxiety, and depression during pregnancy in a public hospital setting in Greece. Clin Exp Obstet Gynecol 2013; 40:581-3.
5. Sadeghi N, Azizi S, Molai Nezhad M. Anxiety status in pregnant mothers at third trimester of pregnancy and its related factors in referrals to Bandar Abbas hospitals in 2012. Iranian Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 2014; 17 (Issue 122): 8-15.
6. Alipour M, Feizi Z, Seyedfatemi N, Hosseini F. Correlation between maternal anxiety during pregnancy and incidence of preeclampsia in primigravid women. IJN 2006; 19:79-88. [In Persian]
7. Sabeti B. Anxiety disorder during pregnancy .Iran Journal Obstetrics and Midwives 2011; 6: 8-13.
8. Babanazari L, Kafi SM. Comparative study of anxiety in relation to different periods of pregnancy, marital satisfaction and demographic factors. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology 2008; 14: 206-13.
9. Mardanihamule M, Ebrahimi E. Mental health status of pregnant women referring to shahinshahr health care centers. Bouyeh Journal Gorgan Univ Med Sci 2010; 7: 27-33. [In Persian]
10. Akbarzade M, Toosi M, Zare N, Sharif F. Effect of relaxation and attachment behaviors training on anxiety in first-time mothers in shiraz city : A randomized clinical trial. Qom Univ Med SCI 2013; 6: 14-23. [In Persian]
11. Lau MA, Mcmain SF. Integrating mindfulness meditation with cognitive and behavioral therapies: the challenge of combining acceptance and change-based strategies. Can J Psychiatry 2005; 50: 863-74.

12. Rouhe H, Salmela-Aro K, Toivanen R, Tokola M, Halmesmäki E, Ryding EL, et al. Group psycho-education with relaxation for severe fear of childbirth improves maternal adjustment and childbirth experience--a randomized controlled trial. *J Psychosom Obstet Gynaecol* 2015; 36:1-9.
13. Bastani F, Heidarnia A, Kazemnejad A, Vafaei M, Kashanian M. A randomized controlled trial of the effects of applied relaxation training on reducing anxiety and perceived stress in pregnant women. *J Midwifery Women's Health* 2005; 50: e36-e40.
14. Bot M, Milder IE, Bemelmans WJ. Nationwide implementation of Hello World: a Dutch email-based health promotion program for pregnant women. *J Med Internet Res* 2009; 11:e24.
15. Breton E. From behavior change to the improvement of living conditions. Toward ethical and effective health education. *Sante Publique* 2013; 25:s119-23.
16. Jones CJ, Smith H, Llewellyn C. Evaluating the effectiveness of health belief model interventions in improving adherence: a systematic review. *Health Psychol Rev* 2014; 8:253-69.
17. Mulualem D, Henry CJ, Berhanu G, Whiting SJ. The effectiveness of nutrition education: Applying the health belief model in child-feeding practices to use pulses for complementary feeding in Southern Ethiopia. *Ecol Food Nutr* 2016; 55:308-23.
18. Rezapour B, Mostafavi F, Khalkhali H. Theory based health education: application of health belief model for iranian obese and overweight students about physical activity in Urmia, Iran. *Int J Prev Med* 2016; 7:115.
19. Zeighamat F, Ebadi A, Rahmati-Najarkolaei F, Ghadamgahi F. An investigation into the effect of health belief model-based education on healthcare behaviors of nursing staff in controlling nosocomial infections. *J Educ Health Promot* 2016; 5:23.
20. Zare M, Ghodsbin F, Jahanbin I, Ariafar A, Keshavarzi S, Izadi T. The effect of health belief model-based education on knowledge and prostate cancer screening behaviors: a randomized controlled trial. *Int J Community Based Nurs Midwifery* 2016; 4:57-68.
21. Hoseini H, Maleki F, Moeini M, Sharifirad GR. Investigating the effect of an education plan based on the health belief model on the physical activity of women who are at risk for hypertension. *Iran J Nurs Midwifery Res* 2014; 19:647-52.
22. Shahnazi H, Sabooteh S, Sharifirad G, Mirkarimi K, Hassanzadeh A. The impact of education intervention on the health belief model constructs regarding anxiety of nulliparous pregnant women. *J Educ Health Promot* 2015; 4: 27.
23. Prochaska JJ, Prochaska JO. A review of multiple health behavior change interventions for primary prevention. *Am J Lifestyle Med* 2011; 5:211-221.
24. Manchaiah VK. Health behavior change in hearing healthcare: a discussion paper. *Audiol Res* 2012 Jan 9; 2:e4.
25. Huizink AC, Delforterie MJ, Scheinin NM, Tolvanen M, Karlsson L, Karlsson H. Adaption of pregnancy anxiety questionnaire-revised for all pregnant women regardless of parity: PRAQ-R2. *Arch Womens Ment Health* 2016; 19: 125-132.
26. Westerneng M, de Cock P, Spelten ER, Honig A, Hutton EK. Factorial invariance of pregnancy-specific anxiety dimensions across nulliparous and parous pregnant women. *J Health Psychol* 2015; 20:164-72.
27. Huizink AC, Mulder EJ, Robles de Medina PG, Visser GH, Buitelaar JK. Is pregnancy anxiety a distinctive syndrome? *Early Hum Dev* 2004; 79: 81–91.
28. Karamoozian M, Askarizadeh GH, Darekordi A. the impact of prenatal group stress management therapy on anxiety in mothers and newborns physiological parameters. *Journal of Developmental Psychology* 2015; 11: 229-33.

- 29.Rahimi F, Ahmadi M, Rosta F, Alavi Majd H, Valiani M. Effect of relaxation training on pregnancy anxiety in high risk women. *Journal of Safety Promotion and Injury Prevention* 2014; 2: 180-188.
- 30.Dareshouri Mohammadi Z, Bosaknejad S, Sarvghad S. A survey on the effectiveness of stress management training with cognitive-behavioral group therapy approach on state/trait anxiety, pregnancy anxiety and mental health of primiparous women. *Jentashapir*. 2012; 3: 495-504. [In Persian]
31. Yildirim G, Cetin A, Aksu M, Altiparmak S, Guler N. The effects of the informed consent given for cesarean section on anxiety and knowledge. *Clin Exp Obstet Gynecol* 2014; 41:62-6.
32. Maeda E, Nakamura F, Kobayashi Y, Boivin J, Sugimori H, Murata K, Saito H. Effects of fertility education on knowledge, desires and anxiety among the reproductive-aged population: findings from a randomized controlled trial. *Hum Reprod* 2016; 31:2051-60.
- 33.Toosi M, Akbarzadeh M, Zare N, Sharif F. Effects of attachment behaviors education on anxiety and attachment of mother to baby at first pregnancy. *The Journal of Faculty of Nursing & Midwifery* 2011; 17: 69-79. [In Persian]
- 34.Ghazavi H, Ahadi M, Aghasi Yazdi Z, Behzadmehr A. Anxiety in pregnancy .*Journal of Raze Behzista* 2008;17(35):19-21. [In Persian]
- 35.Dowling T. New parenting, psychotherapy, prenatal and perinatal care. *Nutr Health* 2007; 19:81-4.
- 36.Ebrahimi A, Neshatdoost HT, Kalantari M, Molavi H, Asadollahi GH. Contributions of dysfunctional attitude scale and general health subscales to prediction and odds ratio of depression. *Shahrekord University of Medical Sciences Journal* 2008; 9: 52-58. [In Persian]
- 37.Oliver JM, Murphy SL, Ferland DR, Ross MJ. Contributions of the cognitive style Questionnaire and the dysfunctional attitude scale to measuring cognitive vulnerability to depression. *J Cognit Ther Res* 2007; 31: 51- 69.
- 38.Sayegh P, Knight BG. Cross-cultural differences in dementia: the sociocultural health belief model. *Int Psychogeriatr* 2013; 25:517-30.
- 39.Sajadi Naini H, Kiamanesh A.A comparison between self efficacy dimension and anxiety and their change process in the girls with 9-11, 12-14, 15-17 years old. *Cultural and Educational Quarterly of Women and Family* 2015; 9: 74-86.
- 40.Bandura A. Cultivate self-efficacy for personal and organizational effectiveness. In E. A. Locke (Ed.), *Handbook of principles of organization behavior*. 2nd ed. Oxford, UK: Blackwell, 2009:179-200.
- 41.Wilkinson EL, O'Mahen HA, Fearon P, Halligan S, King DX, Greenfield G, et al. Adapting and testing a brief intervention to reduce maternal anxiety during pregnancy (acorn): study protocol for a randomized controlled trial. *Trials* 2016; 17:156.
- 42.Kingston D, Janes-Kelley S, Tyrrell J, Clark L, Hamza D, Holmes P, et al. An integrated web-based mental health intervention of assessment-referral-care to reduce stress, anxiety, and depression in hospitalized pregnant women with medically high-risk pregnancies: a feasibility study protocol of hospital-based implementation. *JMIR Res Protoc* 2015 Jan 16; 4:e9.
- 43.Davis E. Heart and hands. A midwives guide to pregnancy and birth.4th ed. Toronto: Celestial Arts Press; 2007: 105-138.
- 44.Saisto T, Halmesmaki E. Fear of childbirth: a neglected dilemma. *Acta Obstet Gynecol Scand J* 2003; 82: 201-208.

-
45. Roberts G. Try hypnosis instead of an epidural. *Obstetric Interventions and Childbirth Journal* 2007; 8: 34-37.
46. Heardman H, Show M. Relaxation and Exercise for Painless Childbirth. 1st ed. Washington: Rockville. 2007; 11-16.